

**PAULI HERMANNI ...
PARADISUS BATAVUS,
INNUMERIS EXOTICIS
CURIOSIS HERBIS, &
RARIORIBUS...**

Paul Hermann



TAR. 102. V 9

PAULI HERMANNI
PARADISVS BATAVVS
SEU
DESCRIPTIO
RARIORVM PLANTARVM



LVGDVNI BATAVORVM
Apud PETRVM VANDER A.A. MDCCV.

PAULI HERMANNI, M. D.

*In Academia Lugduno-Batava nuper Medicinæ ac
Botanices Antecessoris,*

PARADISUS BATAVUS,

Innumeris Exoticis curiosis Herbis, & rariori-
bus Plantis, magno sumptu & curâ ex variis Ter-
rarum Orbis Regionibus, tam Oriente,
quam Occidente, collectis, ac-
quisitis, illustratus.

*Ingeniosissima, & dexterrima artificum manu elaboratis iconibus,
ad vivum ævi incisis.*

Eruditissimâ suâ, & magnorum in re Herbaria versatissimo-
rum Virorum, Methodicâ Descriptione,

&

CATALOGO PLANTARUM,

Nondum præ immatura morte Auctoris delineatarum,
locupletatus.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud PETRUM VAN DER Aa,

MDCCV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ILLVSTRISSIMO. REVERENDISSIMO. EMINENTISSIMO
FRATRESVI

ARTIVM LITTERARVM PERITIA. CONVLATISSIMO DOCTO.

D^O HENRICO COMPTON

LONDINENSI EPISCOPO

INVENTI. INGENII EXEMPLARI. FIDELITATIS. APICI
ECCLESIAE LUMINI ET LAMPADI. CONVSICANTI
SERENISSIMAE. POTENTISSIMAE.

ANNAE.

MAGNAE. BRITANNIAE. ETC. ETC
REGINAE CLEMENTISSIMAE.

TVTELARI DEAE

IMPERATRICI AVGVSTISSIMAE.

PROPVGNATRICI VERAE FIDELI VNICAE.

VIRTVTVM OMNIVM. COMPLEMENTO.

AB. ITINERIS. CONSILIIIS

SCILLO VNICO.

NOTANTICARVM. MVSAEVM. FAVTORI FRATRICERIO.

SVSPICIENDO. VENERANDO.

HOCCE. OPVS. ELABORATVM. AB.

INCOMPARABILI. AVCTORE. SVMMO. INQVETRIA.

ET MIRIFICA. VIGILANTIA. POST. ORITVM.

IN. AETERNITATIS. MONIMENTVM. EXCELERVNT.

QVOD. CELSISSIMAE. DIGNITATI. VESTRAE.

IN. DEBITAE. OBSERVANTIAE. ET. DEVOTISSIMO. CVLTV.

METHVSON.

SACRAT.

FRVVS. VANDELLA.

3
2
2

2
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1



LECTORI BOTANOPHILO S.



um post prematuram desideratissimi
HERMANNI mortem, Manuscripta,
quæ ipse reliquerat plurima, non sine
oculorum damno perlegissem, eaque
maxima ex parte manca mutila, nul-
loque ordine disposita invenissem, non solum pristinus
dolor, quem indies leniri & sopitum iri sperabam, re-
cruduit, verum etiam me novo vulnere perculsum, &
tantum non confectum sensi. Codices nempe, quo-
rum eximio fulgore occulta naturæ magnalia detege-
re promiserat, singulari sagacitate designatos, nec
minore studio ac arte contextos, me vana spe repe-
riendi lætaveram, quibus typis mandatis publici-
que Juris factis, nequaquam dubitavi, quin hoc,
quantum, quantum dispendium, per frequentes præ-

L E C T O R I

*li partus aliquatenus resarciri potuerit ; seu Eheu !
 nil præter prima posita fundamina , & adumbrata
 solummodò Musarum Palatia sese inspicienti obtulêre ;
 quibus extruendis & ad fastigium demùm perducen-
 dis , ingens quidem Adversariorum Botanicorum
 moles satis materiarum suppeditabat. Nequeo ta-
 men non fateri , hanc Chartarum copiam non modo
 rudem esse ac indigestam , sed & Notas & rerum
 descriptiones , quas explicandi gratia , sparsis foliis
 addiderat , obscura & discruciatrice brevitâte labo-
 rasse. Videtur enim Clariss. Auctôr plura memoriæ
 quàm Chartis credidisse , quâ eum destituyente , ad has,
 optima labilis memoriæ subsidia , extemplò fugere po-
 tuit. Verùm quod res tam inauspicatò sese habeat ,
 neque ad supremum culmen hac egregia Floræ monu-
 menta sint evecta , non industria aut sudoris defe-
 ctu , sed ob temporis angustias , & infinita negotio-
 rum genera , quæ jugitèr ipsum interpallârunt , acci-
 disse , omnes , quos sedula illius indoles non latuit ,
 facile agnoscens. Perpetuò sanè aut Libris inhæsit ,
 aut operam curiosa eruditione Pupillos instituendo
 col-*

BOTANOPHILO S.

*collocavit. Sed nolo in tam patente dicendi campo
latius expatiari iis enim, quibus docta ejus comitas
perinde ac mihi cognita, probè perspecta; quibus mi-
nus; neutiquam credenda prædicarem. Quisquis de
tanto viro vel vera loquitur, non poterit vilem
ac infamem Adulatoris notam evitare. Caterùm cum
incltyti Authoris vita, mores, munera ac scripta
jam fusè, sed Romana planè eloquentia, à Clarissimo
Bidloo celebrentur, liceat mihi saltè paucis expo-
nere, quibus in studijs desudaverit, & qualia emo-
lumenta ab antelucanis & nocturnis illius lucubra-
tionibus ut Remp. latæariam devenissent, si Deus
ipsum diutius vivere permisisset, ut inde tandem tibi
magis constet, Benevole Lector, quàm immensa cla-
des per luctuosum HERMANNI fatum Philosophicæ
genti inferatur.*

*Orat. su-
nebr. his
impress.*

*Iº. Itaque in secunda Editione Floræ Batavæ
Florum corrigenda ac exornanda horas subcissivas
posuit, cujus tertiam circiter partem revivam moriens
reliquit, & cui intra unius mensis spacium, si ita
visum fuerat Numini, ultimam manum adjecerat.*

Me-

L E C T O R I

Methodum quam hoc in libello sequutus , non ut accuratam omnibusque numeris absolutam exhibuit, sed ut Tyronibus & Discipulis suis , cujus gratia eam concinnaverat , magis accommodatam. Quapropter aliam amplioris ditionis , & naturæ magis convenientem excogitaverat , non à florendi modo nec fructificatione sola , sed & à crescendi modo totiusque Plantæ habitu desumptam. Cum enim characterem plantarum generalem , qui à flore petitur , speciebus consimilibus variare animadvertisset , [uti Tormentillâ vulgari & Pentaphyllo Cassubico Tormentillæ facie , quæ flores ferunt tetrapetalos : quinquefolium verò vulgare , pentapetalos : solanum tinctorium Barbadiense & Zeylanicum sunt tetrapetaloides , solanum verò seu Amaranthes Indicus bacifer , pentapetaloides : verbena urticæ folio , verbenâ pariter spicâ multiplici (ut plurimum) flores proferunt regulares , seu ex segmentis æqualibus constructos ; cæteræ species congeneres è contrario irregulares seu ex segmentis inæqualibus compositos. Inter Corymbiferos etiam ita natura comparatum est,

ut

BOTANOPHILO S.

ut alia ejusdem generis plantæ flores obtineant radiatos, alia nudos, alia nunc radiatos, nunc nudos, ut Chamamelo, matricaria, chrysanthemo Valentino Clusii, Jacobaea vulgari &c. accidit, cum has, inquam, ambiguas vegetabilium facies, & lascivos quasi floræ lusus animadvertisset, hanc tanquam arctam nimis & angustam methodum, minusque cum suo instituto quadrantem repudiavit.

2º. Nec Plantarum indicia à fructificatione sola capi voluit. Vix certiora & magis constantia signa, seu ut Botanici loqui amant, Notæ characteristicae, ab hac, quàm à florendi modo, duci possunt, ut in Hyperico, Papavere, Cisto & Chamacisto notissimum est. Nec minorem varietatem in Fumaria speciebus observare licet, quarum nonnullæ sunt sili culosæ, alia siliquosæ, & Fumaria Africana vesicularia scandens semper semina inflatis vesiculis inclusa producit; quam tamen Hortulanorum vulgus primo intuitu pro vera Fumaria specie acciperet, nec ab ejusdem familia plantis sejungeret.

**

3º. Ne-

LECTORI

3°. *Negabat pariter peritissimus Author aliquid certitudinis posse vel ab utroque simul sumpto derivari; sic enim sub diversis vexillis, floris & capsulæ ratione, iis militandum esset; quod citra nova exempla, re herbaria versatis, ex supra allatis instantiis facile patebit. His assidue animo revolutis, & crescendi modum & totius plantæ habitum reliquumque accidentium apparatus, non tantum ad species subalternas, sed etiam ad genera constituenda necessariò accersi debere sibi persuasissimum habuit. Quid autem hac in re præstitisset, quantisque passibus alios, qui in eodem scrutinio sese exercuerunt, superasset; ob inopinam Authoris necem conjecturâ tantum assequi conceditur.*

Nec magna hæc moliri contentus, se Plantas utriusque Indiæ indigenas in proprias Classes partituum, methodumque us congruam, quod usque aded ab orbe Botanico desideratur, ex instructissimo cognitionis suæ penu depromsurum, mihi spem non mediocre sæpius fecerat. Et quò citius hoc effectum daret, ultro me in consortium operis contuli, & Plantas,

tas, Fructus & semina, quæ ex Orientis & Occidentis regionibus sibi comparaverat, secundum affinitates & cognationes suas pro meo modulo distribuere non cessavi. Ipso verò die, quo hoc quicquid erat laboris, absolueram, Clarissimus HERMANNUS fatali morbo correptus moribundus decubuit, finemque nostris conatibus mæstissimum imposuit.

Ad Musæum Zeylanicum quod attinet (cui eliminando in Horti Academici Lugduno-Batavi principio summas ingenii vires se abhibuisse testatur) vehementer dolendum est, quod infelici Authori præ aliarum curarum mole, descriptiones Figuris annectendas perficere non licuit. Icones quadringentas & quinquaginta plus minus charta Atlantica seu Imperiali ut vocatur, in India dum ibi degeret, eleganter delineandas curaverat, quæ in hunc usque diem immenso chasmate dehiscunt, nec vacua earum intersticia, aliis rebus, quam solis Plantarum Animalium ceterisque Historiæ naturalis nominibus implentur. Sed nuda hæc sceleti membra satis pulcro orna-

L E C T O R I

tu, ex splendidissimis simul & utilissimis commentariis, quos in India exaravit, cohonestentur, si par Labori artifex inchoato operi accedat, & utrumque non inconcinno nexu jungat, & gratissimam mehercule rem orbi literato faceret quicumque hanc spartam ornare susciperet. Quippe in iis non tantum Hortum Malabaricum ad examen saepius revocat, sed notas in illum consarcinatas. aliquantillum perstringit, sed ita, ut utrique plurimum lucus impertiat. Nec hoc onus aliorum humeris Auctor imposuerat, si Serenissimus Nassavus non tam repente, cum victricibus turmis in Angliam descendisset. Sed cum flagrante bello nullum, qui imprimendi nedum exculpendi sumptus facere voluit, invenire potuerit, manum de tabula sustulit, non ignarus cum in eodem stadio cum Chalcographis & Typographis sibi currendum & certandum esset, se ante illos ad metam pervenire potuisse.

Catalogum insuper Plantarum in Promontorio Bona Spei sponte nascentium, quam ejus monitu confeceram, calci hujus opusculi subnectere statuerat,

BOTANOPHILO S.

eo nimirum consilio , ut Prodrromi Plantarum Africanarum , aliquando forsitan justo à se describendarum volumine , locum suppleret. Quem in finem non tantum Plantas Africæ indigenas sexcentas & plures nitidè siccatas , & floribus fructuque onustas illic deferendas ; sed etiam plurimas alias , quæ ob crassitiem & succorum copiam difficultè exsiccare poterant , ibidem nativis coloribus pingendas , non sine magna rei familiaris jactura procuraverat. Cum verò ex illius morte novæ Plantarum species huc ex istis regionibus adducantur , & quotannis plures expectentur , satius duxi Onomasticon illud impræsentiarum omittere , illumque notulis characteristicis & breviusculis hinc inde descriptionibus locupletatum , alia data occasione seorsim edere.

Tractatus de Materia Medica aureus iste HERMANNI liber duabus partibus comprehenditur ; quarum prima veterum Medicorum sententias exponit , & lites inde oriundas dirimit : secunda , illam Materiam exhibet & illustrat , quæ præsentis sæculi praxi accommodatur. Porro cum hoc opus brevi in

L E C T O R I

gratiam Medicinæ studiosorum proditurum sit, plura de illo dicere supervacaneum esset.

Restat denique ut de Paradiso hoc Batavo pauca præfarer; quibus scilicet rationibus inductus illius Editionem susceperim, & quid deinde in illo præstare conatus fuerim. Quod ad primum pertinet, cum communi scripturientium turba dicere sufficiat, Aliorum utilitatem me unice ad hoc pensum obeundum impulisse. Sed superest aliud incitamentum quod me acrius instigavit, Auctor siquidem ipse in Plantis depingendis, iisque ære incidendis non paulum pecuniarum insumpserat, aded ut ni inveniretur quispiam, qui hanc provinciam aggrediretur, non tantum opera (quod dici solet) sed & oleum perditum fuisset. Cum autem nullus sese obtulerit, nec aliquis reperiri potuisset, ob amicitiam & benevolentiam, quæ à pluribus annis me prolixè prosequi non dedignatus est, non potui, tot Humanitatis officiis devinctus, auxilia-trices manus non porrigere, protinus igitur memet ad laborem accinxi, totisque viribus annixus, ut impense, quas in Literatorum usum & ornamentum erog-

BOTANOPHILO S.

erogaverat, ab usdem denuò Familiae suae in integrum restituerentur. Atque hac de causa omnes (quotquot inveniri poterant) excultas Tabulas excudendas duxi. Quae enim numerum centesimum superant, una cum figuris penecillo tantum delineatis, (quorum Catalogum ad finem adjunxi) tanquam materiam futuris voluminibus componendis necessariam destinaverat. Opus enim in plures Centurias distribuere meditatus est, quibus non solum Botanices pomaria, novarum plantarum accessionibus extendisset, sed & datâ occasione, obscure & confuse descriptas illustrasset, Auctorumque de illis controversias exemisset.

Quoad secundum, non opus est, Candide Lector, ut te longo verborum circuitu morarer. Facile dignosci potest, quod sit ab Authore praestitum, & quid à me adjectum. Hoc unicum addere lubet, me proprio Marte nihil fecisse, (quamquam haec Plantae nec mihi ignotae, nec perfunctorie olim observatae) sed HERMANNI scrinia compilasse, & ex his Descriptiones quales quales consuisse. Quod vero minus concinnae sint, nec ad exquisitissimum Auctoris exemplar

LECTORI BOTANOPHILO S.

plur elaborata, non agrè à Te veniam impetrabo, cum nec Librorum copiam nec supellectilem Botanicam in itinere consulendam habuerim. Sed Icones (quæ Descriptionibus vix indigere videntur) aded aptè cum Archetypis congruunt, ut hunc defectum abundè supplere possint. Quid de me & opera, quam huic libello impendi, senseris Lector, non valdè sollicitus sum; Te tamen rogatum velim, ut mendas, quibus undique urgeor, non accuratus HERMANNI pervigiis, sed Editoris incurie & abrupto studiorum cursui attribuas. Vale.

Dabam Genevæ.

6. Kalend. Apr.

1697.

GUILIELMUS SHERARD.

Ad Bibliopegum

Portulaca Corassavica angusto longo lucidoque folio quæ notatur in iconæ p. 112. referenda est ad p. 212. & Orchidi affinis notata p. 187. ad p. 207. quæ etiam falso numeratur 187.

ACER



Clarissimo Viro

D. D. P. H E R M A N

M. D. & Botanices Prof. Pub.

Lugduni-Batavorum.

O D E.

H E R M A N N E, plectrum Threïcium
Tibi
Movere tendo; Quod simul impulit
Orpheus, feruntur insecuta
Harmoniâ, Tua cura, Sylvæ.
Grandem canenti materiem admoves,
HERMANNE, latis Nomen amabile
Plantis, & inscribi quod ultro
Corticibus petat omnis Arbor.
Quid arte possis, Indus & ultima
Natura sensit, cum sapientiam
Quærens penetrabas ad ortum
Solis ab Hesperio cubili.

Mul-

Multas ab Indâ Gente recepimus
Merces opimas; Nulla tamen raris
 Contendat illi; quæ reduxit
 In patriam Batavumque cœlum
Te dulce pondus : Te, quia conscium
Anno feraci; Te, quia nobilem
 Docere Plantas, quot recenti
 Tertia Lux patefecit Orbi.
Hoc Leyda novit, cui Tua plurima
Fecere justam dona superbiam;
 Hoc omnis in Leydâ Juventus,
 Non eadem patriâ fatetur.
Urbs, illa centum fertilis artium
Mirè sagaces percutit Hospites,
 Utcunque deducit per Hortum
 Elysio minùs invidentem.
Hâc parte surgunt (heu, celeres mori!)
Flores, & omnis copia varium,
 Felix Odoranti placere,
 Dum pariter placet Intuënti.
Hac parte, Terrâ matre remotior
Vertex decemtum tollitur Arborum,
 Quales in Adami beâtis
 Ordinibus potuere nasci :
Myrtus polita, & Pierio choro
Quæsita merces Lâurea, hec minùs
 Quæsita vitis, & perempto
 Fida comes Domino Cupressus,

Et

Et multa Sylvæ filia nobilis
 Pulchrè explicatur; Quæ mihi, quæ tibi
 Subtus recumbenti Coronam
 Exhibeat folius, & Umbram.
 Locatus illo sospes in angulo
 Cantu perenni tempora ducerem,
 Humi reclinis, inter Undas,
 Inter Aves, pariter sonoras.
 Ah, nequa Sævi intemperies poli,
 Aut sidus ullum lumine noxium,
 Felicis Horti spem virentem
 Afficiat, tenerosque foetus!
 Non sic mereris, qui tua sedulus
 Tempe frequentas, & quid opus, mones;
 Sed Phæbus intrat, seu relinquit
 Hesperium, ~~vetus hospes undam.~~
 Talis per Hortos ibat Ebraicos
 Davidis Haeres; quem neque rustica
 Arbusta mirari, nec Herbas,
 Dedecant superis propinquum:
 Hinc Ille Cedri nubibus insita
 Naturam, & apti lambere cespitem
 Hyssopi, & in campis quod usquam est,
 Egregius memoravit autor;
 Frustra: Labores non meritos mori
 Oppressit ævo dura necessitas,
 Culpâque majorum nepotes
 Ingenio Solomonis alti

*** 2

Du-

Dudum caremus; dum superest adhuc
Onustus annus turpis Anacreon,
Manentque Ranarum pudenda
Mæonio calamo Duella.
Quin Te sequetur parca benignior;
Nec si tuorum gloria transeat;
HERMANNE, Florum, Tu peractâ
Luce brevi mortis æque;
Sed quale fuscâ Marmor in Africâ
Fossum, decoræ materies domûs,
Firmatur annis, atque longâ
Duritiem trahit à Senectâ;
Tuum vigebit non aliâ vice
Volumen, Illi cuncta dies decus
Apponet, Illi semper aras
Adveniens pretium arrogabit.

E D. H A N N E S A. M.

*Ædis Christi Oxon. & eidem
Illustriss. Academiæ Pub. Pro-
fess. Chymicæ.*



ACER

Virginianum folio subtus incano, flosculis ex viridi rubentibus.



CER foliorum respectu in majus & minus dividitur. hujusce duæ tantum species ab autoribus descriptæ sunt, scil. ACER campestre & minus C. B. & ACER trifolium ejusdem illius plures traditæ sunt, præsertim à prædicto Bauhino, quæ non tam facile distingui possunt. Nobis tres innotescunt, nempe *Prima* ACER majus, multis falso, PLATANUS, J. B. passim obvium. *Secunda*, ACERIS majoris varietas ejusdem. non tantum foliorum delicatior habitu & elegantissima divisura, sed & florendi modo à superiore diversa. Flores enim non adeò muscosi, sed ex petalis flavescentibus conflati sunt, quos non in racemo, uti in vulgari, prolongatos, sed quasi in umbellâ patulâ expan-

A

fos

los profert. *Tertio*. ACER majus folio rotundiore minus laciniato, an OPALUS Italicorum? *Ray Hist.* quod olim in Sylvis in Italia juxta Viterbam cum fructu frequens observavimus. *Fructus* vero vulgari tumidiores membranisque brevioribus alatos, & ex breviori iidem pediculo pendentes profert. quas notulas adjungendas duximus, cum *J. B.* de secunda specie dubitaverit, an in flore, & fructu, à primâ aliqua fuerit diversitas: & *Doctiss. Raius* ultimæ fructum describere non meminerit. hisce tribus & *Quartam* adjungimus speciem à Virginia delatam, quam ACER virginianum foliis subtilius incanis, floriculis è viridi rubentibus nominare libet. Cæterùm hanc arborem ACERIS familiae adjungere non dubitamus, quamvis fructum tergetinum proferat, & eo nomine, notâ Characteristicâ à *Raio*, quoad semen allegatâ, abluat. cum enim non tantum crescendi modo, foliis, floribus, sed & toto plantæ habitu cum cæteris speciebus descriptis conveniat, quamvis in unâ alterâve notâ, seu accidente dicam, differat, iis omninò associandam esse statumus. Quin imo *Clariss. Plukenerius Tab. Phytogr. 3.* arborem ACER fructu tergetino vocat, quamvis folia cum Aceris foliis nullam affinitatem habeant, sed sunt planè laurina.

Cæte-

pag. 2

ACER
Virginianum.



. PARADISUS BATAVUS. ,

Cæterum *Caulice* assurgit crasso, cortice glabro cinerino obducto, & in plures ramos paucos brachiato. *Folia* adstant ex opposito, Aceris majoris folus minora, subtusque glauca, pediculis triuncialibus & longioribus appensa, odore & sapore ad folia Aceris vulgaris accedentia. ad ramorum nodos erumpunt *flosculi* pediculis sesquuncialibus, tenuibus, rubentibus insidentes, quini aut plures ex unâ quasi sede seu nodulo, veluti in ceraso, prodeunt, nodulis binis è regione oppositis. singulis pediculis insidet flos unicus, ut plurimum ex sex petalis in imo viridantibus & circa margines, præcipue vero ad apices intense rubentibus. intra florem continetur vasculum parvum triquetrum, ex tribus quasi alis constructum, à cuius apice prominent tria vel quatuor stamina intense rubentia, corniculata recurva. *Fructus* antequam ad maturitatem proveniat, decidit, Verum non dubito, quin cum *Aceris* fructu conveniat. Patriam agnoscit Virginiam, unde in Angliam primo delata fuit, ubi illam nacti sumus. frigoris parvus est, hyeme vero in hybernaculo nostris in oris oportet custodiri. Hæc est illa species *Aceris* occidentalis folio minore, subtus micans, superius virescens; quam *Acer* florens virginianum audit, & in odore est, ejus meminit *Kuhn* in *MS.* 1761. *Acer* vero vir-

ginianum odoratum H. L. B. in app. est *Styrax*
Aceris folio ejusdem. pag. 1681.

ALCEA *minor maritima tenuifolia*
procumbens. **ALCEA** *tenuifolia hu-*
milis maritima Gallo provincialis,
foliis inferioribus nonnihil ad Gera-
nium accedentibus Schol. Bot. Hort.
Reg. Par. Malva Gallo provinciæ
laciniata, seu ALCEA tenuissimis
Pulsatillæ foliis flore amplo rubente
Pluck Phytogr.

PLANTÆ MALVACEÆ vulgodiçtæ, seu quæ no-
 minibus *Malvæ, Alceæ, & Althææ* notatæ sunt,
 in duo summa genera dispesci possunt, quorum
 primum continet eas, quæ ferunt semina nuda;
 alterum quæ semina habent capsulis inclusa. Quo
 vero generico & adæquato nomine utriusque &
 imprimis postremi generis species vocandæ sint,
 herbariæ rei scriptores inter se non conveniunt.

Fratres *Baubini* & qui ante hos scripserunt plu-
 rimū utriusque generis species confuse, & permix-
 tē

cè tractarunt & nominarunt, non animadvertentes notam à natura ipsis impressam à qua species singulæ discretè & electè discernendæ & nominandæ sint.

Robertus Morison primi generis species *Malvas* & *Alceas*, posteriores vero *Althæas* appellat; *Job. Rayus* prioris generis plantas *Malvas Althæas* & *Alceas* absolute sic dictas, postremi *Alceas Indicas* vocat; minus tamen contentus postremâ hac appellatione tanquam minus congruâ inquit: *Postremi hujus generis plantæ suum & propriam genus constituent & si res foret integra, patriæ potius nomine quam Alceæ eas appellarem.*

Igitur cum postremi hujus generis species proprio & adequato nomine usque adhuc careant, visum nobis est *Morisoni* sententiam, à modernorum plurimis receptam sequi, & officinarum *Althæam* aliis *Ibiscus* aut *BisMalva* dictam priori nempe *Malvarum* generi inscribere & *Malvæ molli* & *incanæ* seu ut *Morisono* placuit *palustris* nomine appellare tùm quod à *Malvis* non differt nisi quod mollior pilosior magis incana & mucagine plenior atque adeo partibus omnibus *Malvis* similior quàm *Alceis* sit, tùm quod ab ipso præceptore *Dioscoride* *Malvæ sylvestris* species enunciatur.

Sunt autem *Malvis semina* nuda, plurima semi-

lanaria in rosula seu placentae formam circumscripta; *Calyces* quasi gemini in octo, plura vel pauciora, segmenta tanquam foliola divisi; *Flores* è quinque petalis ad unguem junctis & intermedio stylo apicibus praedito vel hujus loco numerosis petalis constructi, nunc singulati, nunc acervati nunc in spicam congesti. *Folia* simplicia alterna vel subrotunda vel oblonga, vel integra vel minus profunde lobata.

His annumeratur quaedam heteroclyta, seu degener *Malva* sylvestris *Betonica* folio *Bocconi* dicta, cujus *semina* nec semilunaria nec in rotam acta, sed subrotunda, & in capitulum *Botryos* in modum congesta sunt.

Quae *Alcea* nomine veniunt duplicis sunt generis. Prioris species partibus principibus cum *Malvis* conveniunt, *Caudex* autem, & *folia* nonnihil asperiora sunt, & in angustiores & profundiores lacinias dissecta. *Flores* nullis in medio petalis, sed apicatis stylis exornantur, & vel singulati, vel acervati è foliorum alis exiunt. Posterioris species proferunt *semina* nuda trigona quia rarius plura, vel pauciora pressè juncta, & in capitulum congesta; in superficie vel glabra; vel *Xanthia* more echinata & lappacea; *Calyces* ut praecimus quinquafidos; *Flores* pentapetalos velut in priori genere, aut minores

ALCEA minor
maritima tenui folia
procumbens

p. 7.



sortes; *Folia* vel integra in margine tantum crenata, *Carpini*, *Ulni*, aut *Mori* foliorum æmula, vel in lobos plus minusve profundos dissecta.

ALTHÆÆ. producant *semina* vel angulosa vel rotunda in vasculis quinque pluribus aut paucioribus loculis instructis, formæ & magnitudinis varæ; *Calyces* & *flores* malvaceos diverso modo dispositos; *folia* alterna nunc integra nunc lobata nunc profundius laciniata.

Pro parum dispositione & formâ variâ varias in classes distribui possunt, prout ex singularum specierum inspectione & examine facile patet.

Ad *malvaceas* plantas referunt nonnulli *Abutilum*, *Melochiam* & *Geranium*, quas, quamvis ratione florum non nihil similitudinis cum *Malvis* obtineant, tamen ob vascula seminalia malvacearum dissimulata, à malvaceis separandas & gentinis suis familiis, quarum insignia gerunt, inferendas, nempe *Abutilum* plantis multisiliquis pentapetalis, *Melochia* pentapetalis siliquosis quinque capsularibus, *Geranium* quinque capsularibus pentacoccis.

Planta quam impræsentiarum describere exordiar *Alceis* primi generis annumeranda est; *Radicem* habet albidam aliquot in longum porrectis fibris coherentem; *Cauliculos* infirmos humi jacentes
cubi-

cubitales, *Folia* ima subrotunda sunt quinquifida glabra *Geranii saxatilis Apii* aut *Coriandri* foliorum æmula, Quæ verò è cauliculis nodis exeunt ampliora & in profunda angustaque segmenta divisa sunt. *Flores* pentapetali incarnati *Alcea vulgaris* floribus minores insident *calycibus* quinquifidis, quos elapsis floribus, occupant *semina* plurima parva lunata nigricantia in rotam congesta. Solo irriguo & opaco lætius germinat quam eo, quæ à Solis radius collustratur. Utrum annua sit aut perennis mihi non satis exploratum est. Quam hæcenus in horto colui repullulavit ex seminibus deciduis, radice penitus corruptâ. Hæc fibrosa licet sit, mucagine tamen haud caret atque adeo virtute molliendi leniendique congenerebus suis non multum inferior judicatur.

Debetur hæc planta Cl. DN. *Josepho Pitton Tournefort*, Viro, ut in omni doctrinarum genere ita imprimis in herbariæ rei peritiâ exercitatissimo paratissimoque, nunc Academiæ Galliarum Regis socio dignissimo, qui primus eam in locis maritimis Gallo provinciæ reperit, & in Hortum Regium Parisiensem transtulit, è quo D. N. *Pluckenetius* ramulum quem in *Phytographiâ* exhibuit, accepit.

ALCEA

f. 2
 ALCEA ³¹ Cornifolia
 hirsuta purpurea flore
 solitis lobatis.







ALCEA Curassavica Villosa Aspera Melonis Folio Par. Bat. pr.

E Radice fibrosa pallida emergit Caulis vix pedem superans, rigidis pilis undique asper & in plures infirmos ramulos brachiatus. Folia adstant similiter hirsuta pediculis villosis appensa, Cucumeris asinini foliis minora & tenuiora. Ramulorum summitates in folia expanduntur prioribus similia minora tamen longe & angustiora, petiolis brevibus aut nullis, inter quæ fasciculatim prodeunt flores parvi pentapetali albi, pediculis itidem brevissimis, quibus succedunt semina quina nuda duplici rostro donata & in orbem disposita Alcearum secundi generis instar. Calix subjicitur quinquifidus, ex quinque scilicet foliolis acutis compositus, more congenerum.

ALCEA Curassavica hirsutissima parvo flore; Foliis lobatis. Malva Curassavica folio trilobato molli & hirsuto. Par. Bat. pr.

E Radice pluribus longis fibris capillata, exsurgit Caulis asper, subhirsutus, dicubitalis pollicem

licem crassius, in ramos brachiatos, cui adstant *folia* pediculis biuncialibus & longioribus, pilis undique rigidis obsitis appensa, trilobata & quinque lobata, dentata, lobo extremo longiori non nihil mucronato, pilis iidem utrimque aspera, tribus maioribus nervis in dorso elatis inscripta. *Folia* superiora minora sunt in tres tantum lobos divisa. *Flores* ad ramorum fastigia tres aut quatuor simul juncti, albi aut incarnati, parvi, vix perfectè sese aperientes, cum pistillo in medio pallido, apicibus rubentibus coronato. *Calyx* constat ex decem villis tenuissimis cui insidet calyx alius in quinque segmenta divisus. Antequam femina perfecerat, hyemis injuria perit.

ALSINE *Americana Nummularia foliis.*

ALSINE est Planta unicapsularis, capsulis parvis vel oblongis vel subrotundis *seminibus* multis exiguis repletis; *Floribus* vel pentapetalis vel tetrapetalis, petalis nunc bifidis nunc integris; *Caliculis* nunc quinquifidis nunc quadrifidis, ut plurimum floris in modum expansis; *Foliis* in plerisque speciebus ad singulos cauliculorum nodos conjugatis nunc binis nunc pluribus rarissime alternis seu singularibus.

Do-

ALSINE *Americana* *Mimularia* *folys.* Pa.



Doctissimus *Rajae Alsinarum* species haud inconcinno ordine in tres classes distribuit nempe I in tetrapetalas anomas. II in pentapetalas genuinas petalis bifidis & III in *Alsines* petalis integris aliasque affines incertae sedis; postremae classi inferenda est *Alsine* Nummulariae folius.

ALSINE Americana Nummulariae foliis.

Nata est Seminibus ex Sinaama delatis. Radiculae praetentibus candicantibus fibris capillantur. Coliculi teneres valde ramosi longo varoque reptatu per humum divagantur, & ad singula genicula foliolis subrotundis glabris bilare viridantibus, minori Nummulariae proximus conjugato ordine exornantur. Circa summitates ramorum haerent flosculi pusilli ex quinque petalis integris albidis constructi, quos excipiunt semina exigua fulva in vasculis parvis unicapularibus, quinquifido calyci insidentibus. Quanquam è delapsis seminibus copiose pullulet atque etiam ex singulis ramulorum geniculis, ubi terram attigerint radices agar seseque quasi sua sponte propaget; at-

tamen brumam aeremque pruinosum ferre nesciens in Hypogæis solícite custodienda est. Nullo evidenti sapore linguam imbuít. Quam CL. *Plukenetius* in *Pythographia* hoc nomine proposuit, minus perfecta & de ramulo sicco quem pridem CL. DN. *Sherardo* concessimus, expressa est.


Ad eandem classẽ quoque reducenda est

ALSINE *Alpina glabra tenuissimis foliis, floribus albis.*

Hanc inter alias rariores stirpes ex Alpibus lectam, Augustâ Vindelicorum ad nos misit *Job. Fridericus Heinrich* Stirpium Alpinarum indagator & cultor solertissimus. Radice nitatur albidâ multis capillamentis, è lignoso cespite prodeuntibus fibrata. Coliculis numerosis glabris geniculatis, longitudine palmum nonnunquam superantibus singulis annis exarescentibus & è radice repullulantibus; Foliolis angustissimis acuminatis ad singulos nodos conjugatis; Flosculis candidis pentapetalis aliquot pallidis apicularis staminibus exornatis, petalis integris (haud acuminatis uti sculptor expressit sed) obtusis, Calyculis pentaphyllis stellæ instar expansis. Conceptaculis unicapularibus
per

ALSINE *Alpina glabra*

p 12



per maturitatem quinquariam dehiscens, in quibus continentur semina exigua fusca. Multum accedit ad *Saxifragam Bavariam Parkins.* ejus iconem *Pluckenetus Tab. 75.* nomine *Alfines alpinae glabrae foliolis reflexis* proposuit. Nec Dissimilis (si non eadem), videtur *Alfina pusilla pulchro flore, folio tenuissimo sem. Saxifragae pusillae Caryophyllodes flore albo pulchella Raji Synopsis. p. 148.*

Sicut duo genera sunt *Amaranthorum*, quorum primum in vasculo mucronato seu conico per maturitatem horizontaliter dissiliente claudit semen unicum orbiculatum lucidum, alterum vero in consimili vasculo semina plurima prioriparia: Sic quæ ob horum affinitatem *Amaranthoidæ* vocantur duplicis generis sunt. Prius in pellicula tenui tanquam pusillo vasculo occultit semen unicum lucidum; Posterius verò semina plura. *Amaranthoidis polyspermi species duæ proponuntur in Hort. Malab. part. 10. nempe.*

I. BELUTTA - ADEKA - MANJEN

II. TSERIA BELUTTA - ADEKA - MANJEN

AMARANTHOIDIS monospermi species septem innotuerunt, tres nempe majores seu elauiores & quatuor minores seu humiliores.

B 3

I. AMA-

- I. **AMARANTHOIDES** *Indicum foliis*
Ocymastri capitulis purpureis. Ama-
ranthoides Indicum monospermum
foliis Ocymastri capitulis purpureis
Par. Bat. Prodr. Gnaphalio adfinis
Ocymastri folio, flore ex purpura vio-
laceo Hort. Lugd. Bat. Amaran-
tho affinis Indiae Orientalis floribus
conglomeratis Ocymoidis folio Breyn.
Cent. 1. Amarantho affinis seu A-
maranthoides major Indica Ocymoi-
dis folio & facie flore globoso pur-
pureo Breyn. Pr. 2. Wadapu Hort.
Malab part. 10. Wadambu Zeyl.
Fula Bouton Malai.

- II. **AMARANTHOIDES** *Indicum foliis* *Ocy-*
mastri capitulis albis. Amarantho affi-
nis Indiae Orientalis Ocymoidis foliis flore
conglomerato albo Breyn. Cent. 1.

III. AMA-

Amaranthoides
serrugineum.
p. 18

Amaranthoides
folius polygoni.
p. 17

Amaranthoides
graminis folio.
p. 17.



AMARANTHOIDES
Corassanicum
humile
Cepae folio.
p. 18

III. AMARANTHOIDES. *Americana capitulis parvis albis. Amarantha affinis Brasiliana glomeratis parvisque flosculis Breyn. Cent. 1.*

Species duæ priores utrique Indiæ familiares sunt. Tertia quam siccam ex *Sirmama* recepimus prioribus speciebus tenuior & gracilior est, folia teneris nonnihil angustiora pallide virentia pube nulla obsita, in longum & acutum mucronem porrecta. Capitula triplo minora sunt & foliolis ad basin omnimodo carent.

Inter humiliores species prima est.

AMARANTHOIDES humile *Corassavicum Copeæ foliis lucidis capitulis albis Par. Bat. prodr. Amarantha affinis Aizoides sive Amaranthoides minor Americana procumbens Sederetifolii foliis & facie, flore oblongo niveo Breyn. pr. 2. Perexil Læsitanis, Crithmum marinum non spinosum*

nosum Marckgr. Caaponga Ima
Brasiliensium Pison. Trifolii spica
Crithmum maritimum non spinosum
Brasiliense Raj. Hist.

Folia promit conjugata succosa crassiuscula lucida
Sedi tereusfolii seu potius *Cepeæ* folius supe-
 rioribus similia, hærentia *cauliculis* digitum lon-
 gis geniculatus media inferiori parte procumbenti-
 bus, qui mox à radice in multos ramulos sibi in-
 vicem oppositos divaricantur. Horum summita-
 res ornant *capitula* oblongo-rotunda candida ex
 numerosis rigidis foliolis quasi squamis cum inter-
 jectis flavescentibus staminulis tanquam floscu-
 lis congesta. Singulis squamis includitur *semen*
 fuscum lucidum depresso tenui pellicula velut
 vasculo tectum. *Radix* perennis est albida & fi-
 brosa, quæ cauliculis exarescentibus nova germi-
 na emittit. Asservari expetit in Hypocautis lo-
 cisve à gelu liberis. Muria velut *Crithmum ma-*
ritimum condiri, appetitum excitare urinam mo-
 vere & Viscerum deoppilationes aperire refert
Marckgravius. Altera est

AMA-

AMARANTHOIDES humile Corassavicum *foliis Polygoni. Par. Bat. Prodr. Amaranthoides minima Americana procumbens Polygoni foliis & facie, flore oblongo cinereo seu subalbido. Breyn. prodr. 2.*

Cauliculos habet teneriores & in ramos crebriores divisos; *Folia* pallide virentia minus succulenta facie *Polygoni polyspermi*; *Capitula* pallida seu cinerea molliora & graciliora tam ramulorum summitatibus quam foliorum sedibus insidentia. Cetera superiori speciei respondent. *Radix* annua videtur. Multiplicatur seminibus deciduis. Tertia dicitur.

AMARANTHOIDES humile Corassavicum *angustissimo gramineo folio. Par. Bat. pr. Amaranthoides perexiguum foliis tenuissimis longioribus Breyn. prodr. 2.*

Hic sunt *coliculi* tenuissimi *orecta*, *Folia* angustissima *Polygoni Knarzel Tragi* æmula; *Capitula* perexigua. *Postrema* vocatur

AMARANTHOIDES humile *Corassavicum ferrugineum*. *Par. Bat. prode*

A secunda specie differt colore ferrugineo atque foliis nonnihil lationibus.

ANEMONE *Virginiana tertia*
Matthioli similis, parvo flore Hort.
Lugd. Bat.

ANEMONE sylvestris, albe majori C. B. P. seu tertiae *Matthioli* perquam similis est. Ast folia ad radicem sunt ampliora in tres lobos trifariam sectos divisa acrimonia sua linguam pungentia; Flores minores in viridi pallentes, *Capitula* tenuiora horumque lanugo, in quam fatiscunt, minus candida.

ANTHIRRHINUM Lusitanicum *flore rubro elegantissimo. An*
ANTHIRRHINUM majus semper florens Grisl. Virid. Lusit.

Ex

ANEMONE
Virginiana



ANTHIRRHINUM *Lusitanicum.*

p. 18



EX seminibus Ulyssiponæ lectis nobis ortum est. *Caulibus* adstant *folia Anthrithi* majori alteri *C. B. P.* paulo breviora nunc alterno nunc conjugato ordine disposita. *Flores* ampliores sunt quam in vulgari, hilarique rubore elegantissime nitent. In Hypocaustis asservatum tota hyeme vi-
ret & viget.

Stirpes, quæ siliquas ferunt unicapsores univalves per longitudinem dehiscentes, & in his semina cum propendente promissa lanugine, imbricatum modo stylo nutritivo incumbenna, vocantur ab herbariæ rei peritis vel *Asclepiades* vel *Apocyna* vel *Neria*. Inter has autem id discriminis ponendum ducunt ut *Asclepiadibus* sint siliquæ ex singulis calycibus singulæ; *Apocynis* & *Neris* ex uno calyce geminatae. *Neria* stirpes arboreas esse succumque limpidum flavescensem fundere; *Apocyna* lacteum stillare perhibent.

His autem distinctionum notis prædictarum stirpium species invicem discerni non posse vel ex inde evincitur, quod, quæ uni soli convenire dicuntur, simul & cæteris promiscue contingant. Nam siliquarum in *Asclepiade* numerus non semperprehenditur singularis, sed sæpè pro naturæ lusu ex uno calyce geminatus; Et è contra *Apocynum*

non constanter gerit siliquas ex uno calyce geminas, sed nonnunquam solitarias. Neque solum *Nerium* arboreum flavumque succum fundit, sed & *Apocyna* quædam sunt, quæ in arborem adolescunt & limpidò flavescenteque succo turgent. Præterea *Nerium* non ex singulis partibus uniformem succum emittit, sed *Fab. Columna* & autopsiâ testibus e rano & trunco succum limpidum & flavescensem, è radice lacteum. Imò vero in *Asclepiade* & *Apocynis* quibusdam sub æstatis initio succus limpidus, circa autumnum spissus lactis instar animadvertitur.

Nonnulli *Asclepiadem* ab *Apocyno* distingui posse opinantur, florum foliorumque structura, ut & radicis graveolentia, & virtute alexipharmaca; sed cum hæc attributa simul *Apocynis* quibusdam communia sint, *Asclepiadi* propria dici nequeunt.

Si igitur *Asclepiades* *Apocyna* & *Neria* nulla constanti & perpetua nota ab invicem discerni possint, nihil profecto obstat, quin uno eodemque generico nomine *Apocyni* nempe nominentur.

Horum genus cum numerosissimum sit, herbariæ rei studiosis non inutile nec ingratum fore judicavi, si harum specierum varietatem quæ vel ab aliis vel à me ipso hætenus detectæ sunt, hac occasione subjungerem.

APO-

APOCYNUM Americanum erectum *tuberosa radice non incanum foliis rigidioribus latis subrotundis, floribus albis intus purpureis, summo caule corymbum magnum efformantibus. Fortè Apocynum erectum non ramosum latiori folio umbellis florum albicantibus. Banist. Cat. Stirp. Virg. Plucknet. phyt.*

Num sit *Apocynum Americanum arborescens foliis rigidis subrotundis amplissimis Par. Bat. Pr.* ipse cum *Plucknetio* dubito. Hoc etenim antequam flores conceperat, brumæ rigore perit. Radix lignosa quidem, sed tuberosa non erat. Folia cum *Plucknetiano* conveniebant. Conspectimus in Horto *Fageliano* e semine educatum.

APOCYNUM Americanum arborescens fructu omnium maximo *Par. Bat. Pr.*

Natum in Horto *Beverningiano* altero à satu anno antequam nihil præter caulem & folia exhibens

lens uterque est. ~~Null~~ altitudinem pedalem crassumque digitum adimpleverat. Hoc caulem acquisiverat lignolum bipedalem; Folia lacte viridia palmata ampla, subrotunda in basi cordata, conjugato ordine ex truncalibus petiolis haerentia. Semina erant depressa congenerum more lanuginosa candida celsare donata. Siliqua magnitudine ovum infernum longe superabant, constabantque cortice coriaceo crasso glabro in fusco viridante parte superiori per longitudinem huius.

APOCYNUM Portoricense frutescens foliis
crassis haste cuspidi similibus Hort.
Beaumont.

IN Paradisi Batavi Prodroso proponitur nomine Tithymali Portoricensis folio crasso haste cuspidi simili. Veris Apocynis inserendum est, ob fructus, quos cum his convenire non ita pridem intelleximus. In horto Beaumontiano stirpem exortarum feracissimo, tenui spatio caulem acquisivit sesquipedalem pollicem crassum lacte turgidum, quem absque ullo ordine cingebant folia densa, digito longiora, ex angusto principio in latum mucronem palae vel haste cuspidi similem exeuntia. Flores & semina videre nondum licuit.

Apo-

Apocynum erectum Asiaticum villosè fructu Salicis Folio lato glabro.

INsigni fibrosarum pallidarumque Radicum latè porrectarum contextu luxuriat *Apocynum* hoc orissimum. *Caule* assurgit ut plurimum unico, quatuor aut quinque cubicos alto glabro viridi, inferius non nihil purpurascēte, in multas alas diviso. Hunc adornant *Folia* salici quadamtenus accedentia, glabra, ad ambitum integra, bina ex adverso brevissimis petiolis haerentia, quae parvi caulis inferiori adstant, latitudine pollicem, longitudine digitum cum semisse superant, cætera sensim angustantur abbrevianturque. Ad quamcunque foliorum conjugationem à medio ad fastigium caulis atque exit *Pediculus* digitalis, in septenos denos pluresve radios in corymbam seu umbellam actos divisus. Singuli sustinent in caliculo parvo quinquifido *Capitulum* pentagonum futurum *Floris* rudimentum quod radius incurvescentibus deorsumque nutantibus in quinque candidissima *segmenta* ad ambitum rara lanugine pubescentia se laxat mediani occupante rigidiusculo concolore *Capitulo*, ex quinque concavis quasque bifidis costulis, melleo punicante succo turgidis, constructo, qui nisi formicis muscis apibusve absumatur sæpe
in

in subjectis solus lachrymarum instar deciduis apparet. *Floribus* marcescentibus succedunt *Folliculi* nunc in singulis radius & calycibus singuli nunc gemini in extremitate acuminati vesicæ instar inflati, ex duobus tenuibus membranis conflati quarum exterior gallinacei ovi magnitudine, mucronibus oblique sursum tendentes, longis viridantibus villis quasi inernubus aculeis præditi armati. Hi maturitatem adepti summa parte per longitudinem se aperunt ostenduntque *Semina* parva oblonga non compressa pyriformia fusa plumosa imbricata serie intermedio nutritivo stylo incumbentia, & candidissima splendenteque lanugine donata.

Apocinum erectum Africanum villoso fructu Salicis Folio lato subhirsuto.

Apocynum erectum Africanum villoso fructu Salicis Folio glabro angusto.

VTrumque præcedenti conforme est. Prius autem profert *folia* mollia leniterque hirsuta; posterius *folia* angustissima glabra atrovirentia, & *Flores* paulo minores in viridi pallentes, *Folliculos*, quoque minores villis crebrioribus & tenuioribus exasperatos.

Tri-

2/24

АРОСЫНУМ
Salicis folio
lato





APOCYNUM *Salicis* *flu. arjisy.*

27.

Triplex hoc *Apocynum* debetur DN. *Henrico Bernhardo Oldenlandio*, Viro in rerum naturalium maxime vero vegetabilium studio versatissimo, qui anno 1690. ex Promontorio Bonæ spei hujus semina ad nos transmisit. *Radix* est perennantibus brumam non multum reformidantibus. De facili propagatur tum germinibus subinde è radice pullulantibus, tum ramulis avulsis & media æstate terræ commissis, tum etiam feminibus, quæ in hybernaculis ad maturitatem perducuntur. *Lac*, quod fauciatæ partes singulæ sub nostro climate profundunt, gustant minus acre & ferme insipidum deprehenditur.

APOCYNUM erectum Africanum subhirsutum foliis undulatis.

HUJUS *Apocyni* ramulum siccum ex monte petroso vulgo *Steenberg* ad promontorium Bonæ Spei collectum transmisit idem laudatus *Oldenlandius*. Totus rara quadam lanugine pubescebat; Color erat in viridi puniceus, crassities calami anserini, longitudo cubiti; *Folia* digitum longa, ad basin pollicem lata sensim in mucronem abeuntia ad margines eleganter sinuata undulataque, bina ex adverso sita. Cacumen ornabat venusta *florum*

D


coro-

corona effigie umbellæ , singulis floribus ex quinis segmentis deorsum flexis & intermedio prominente umbone compositis , coloris , prout ex sicco exemplari conicere licuit , in viridi flavescentis. *Semina* congeneribus paria erant plana nigricantia , & ob forsan imperfectam maturitatem nonnihil corrugata. Telluri enim commissa non pullarunt.

APOCYNUM erectum Africanum *sub incanum foliis Telephii*

Acceptum debemus sæpius laudato DN. *Oldenlandio*. Secundo à satu anno adolevit in *caulem* altitudine duorum cum semisse pedum crassitie digiti teretem parte inferiori juxta radicem ubi in aliquot ramos dividebatur nodosum inæqualem incana lanugine pubescentem. Hunc conjugata , cruciataque serie cingebant *folia* subrotunda crassa densa , formâ *Telephii* , colore vero & consistentia *Apocyno Syriaco Cornutiano* nonnihil similia , carinata , è basi lata in acutam brevemque cuspidem desinentia , pallide virentia quasi incana multisque venulis insignita , quorum inferiora amplexitudinem pollicis æquabant , Superiora verò holum latitudinem & longitudinem duplo triplove
ex-

excedebant. E supremo ramorum apice & ipsorum etiam foliorum conjugationibus, medio mensis Novembris apparebant parvi florum corymbi, qui antequam se explicare & perficere poterant ob aeris rigidioris qui illo tempore ingruere solet, inclementiam, peribant. Videbantur autem florus *Telephii* vix majores ex quinque segmentis & intermedio parvo umbilico, aliquot staminibus circumdato constructi coloris expuniceo & violaceo obsolerti. Singulis subiciebatur calyx in quinque foliola veluti foret flos ipse expansus quem & magnitudine omnino adæquabat. Radix multa fibrarum pallidarum copia dense contexta numerosæ subolis ferax est. Semina è quibus Apocynum hoc enatum, erant plana depressa nitidi castanei coloris, candidissima promissa lanugine prædita, Horum folliculos Apocyno Syriaco Cornuzano haud absimiles esse ex fragmentis, quæ inter semina reperi, conijcere licuit. Succo gaudet viscoso lacteo acri amariante & nauseoso. In fictili loco calido coli desiderat.

APOCYNUM erectum incanum latifolium
 *Ægyptiacum floribus croceis. Apocynum*
Ægyptiacum lactescens siliqua Asclepiadis.
D 2 C. B.

C. B. P. *Apocynum erectum majus latifolium Ægyptiacum flore luteo spicato.* Breyni Prodr. 2. *Beidelsar Alpini* sive *Apocynum Syriacum* J. B. *Beidelossar Alpini* Offar Hon. Belli & ex ejusdem sententia *Haofer* seu *Alascer* seu *Albusar Serapionis*.

APOCYNUM erectum incanum latifolium Malabaricum floribus ex albo suave purpurascens. *Apocynum latifolium Ægyptiacum incanum erectum floribus magnis pallide violaceis* Par. Bat. Prodr. *Ericus Hort. Mal. Part. 2. VVaraghaha Zeyl.*

IN Horto Lugduno-Batavo dicitur *Apocynum latifolium Ægyptiacum latifolium incanum erectum floribus spicatis maximis pallide violaceis siliquis folliculatis rugosis.* Tria verò Synonyma, quæ citato loco Apocyno huic assignata sunt, nempe 1. *Apocynum Ægyptiacum lactescens* siliqua *Asclepiadis* C. B. P. 2. *Beidelsar Alpini* sive *Apocynum Syriacum* J. B. & 3. *Bedeloscar Alpini* in Lib. de Pl. Ægypt. transferenda sunt ad Apocynum

num. præcedens nonum; à quo hoc decimum solo floris colore differt.

Comelinus in notis *Hort. Mal. Part. 2.* falsò prodidit, *Ericu Beideloffar Alpini & Beidelfar Vestingi seu Apocynum Syriacum Corn.* unam eandemque plantam esse. Tres autem distinctæ plantæ sunt, prout in infra dicendis evidentè apparebit; proinde quæ *Comelinus* citato loco *Ericu* adscripsit quod nempe in *Belgicis hortis* sit notissimum quod ejus folia quotannis intereant & quod radix instar lolii procurvat. ea nequaquam de *Ericu* sed de *Apocyno Syriaco Cornutiano*, quod decimum quartum in nostro ordine est, intelligenda sunt.

Apocynum erectum incanum latifolium Malabaricum floribus omnino albis. Belericu Hort. Malab. part. 2.

Copiose mihi occurrit in arenosis Insulæ Zeylan & Regionis Malabaricæ. In notis *Hort. Mal. part. 2.* scripsit idem commentator *Comelinus* *Belericu* vocari in Catologo Horti Regni Parisiensis *Apocynum Syriacum rectum caule viridi flore ex albedo.* Et in Horti Amstelodamensis Part. pr. *Belericu* cum *Apocyno Majori Syriaco recto Cornuti* conjunxit. Ubi quippe i. *Apo-*

D ;

cynum

cynum Syriacum rectum caule viridi flore ex albido Hort. Reg. Par. 2. Apocynum Majus Syriacum rectum Cornuti & 3. Belericu Hort. Mal. Genetis comunione quidem similes specie autem differentes plantæ sunt. Primum varietas est Apocyni secundi, Tertium vero varietas Ericu.

Hactenus nec *Ericu* nec *Belericu* in Horto Amstelodamensi viguerunt, quamquam utrumque à *Comelino* Catalogo ejusdem Horti insertum est.

APOCYNUM erectum incanum latifolium Americanum floribus ex incarnato suave violaceis. Apocynum erectum majus latifolium Indicum flore concavo amplo carneo suave purpurascete Breyn. pr. 2.

Apocynum hoc ex vulgi errore pro *Ericu* Hort. Mal. habetur à quo tamen specie distinctum est. *Ericu* enim incolæ est Indiæ orientalis imprimis Regionis Malabaricæ flores proferens ad caulium summitates sparsim congestos multo majores & pulchriores quam *Americanum*, majoris ex albo intensius purpurascens; Hoc verò *Americanum* in *Sirinama* proventit estque partibus omnibus *Ericu* minus, floribus coloris ex incarnato dilutiis violaceis pluribus simul quasi in umbella cumulat-

tis,

dis, quamvis nonnunquam unicus duo tresve circa ramorum extrema conspiciantur. Aeris inclementiae impatientissimum toto fere anno maxime vero rigente bruma in hypocauftis vitreis quàm diligentissime fovendum est.

APOCYNUM erectum latifolium Americanum glabrum floribus longissimis tubulosis.

Hujus *Apocyni* ramulo sicco ex Surinama delato nos donavit *Philippus de Flines*. Habebat longitudinem dodrantis cum semisse crassitiem calami; *Folia* ad genicula bina, ex adverso, glabra rigida nervosa quatuor transversos digitos lata, palmam longa, in mucronem desinentia; Circa extremum sindebatur in breves aliquot *petiolos* (tredecim numeravi) sustinentes quinquifidos oblongos *calyces*, e quorum medio prodibat *tubus* tenuis septem uncias longus, qui in quinque segmenta tanquam *petala* se laxabat coloris purpurascens, medium occupabant totidem *apices* longiusculi flavescentes. cetera nobis incomperta sunt.

APOCYNUM erectum latifolium incanum Syriacum floribus parvis obsolete purpurascens. *Apocynum latifolium Syriacum*

cum incanum erectum floribus umbellatis minoribus obsolete purpurascentibus siliquis folliculatis rugosis Hort. Lugd. Bat. Apocynum Majus Syriacum rectum Corn. Apocynum Syriacum forse Clusi. Apocynum rectum Americanum latifolium sive majus. Park. Beidsar VVeixii Clus. Beidessar Veslingi. Esula Indica Patavinorum Ger. Desor.

Habendam esse hanc plantam pro *Beidessar Alpini* seu *Ossar Hon. Belli*, crediderunt *Clusius* & ab hoc persuasus *Casp. Baubin*, qui in *Pinace Apocynum Syriacum* cum *Beidessar Alpini* miscuit. His quoque assentitur *Rajus* in *Histor. motus auctoritate Veslingii*, qui in observat. ad *Prosp. Alpini*, *Apocynum Syriacum Cornuti* pro *Beidessar Alpini* depinxit & descripsit. Non obstante autem, quod *Weixius* (referente *Clasio*) *Apocynum Syriacum* circa *Hiericho* nascens ad flumen *Jordanum* observaverit; Tamen ab *Ossar Belli* sive *Beidel Ossar Alpini* multum differt *Cornutus* & *Parkinsonius* optime annotaverunt.

Idem hoc *Apocynum* est, quod *Comelinus* in *Hort. Mal. part. 2.* cum *Ericu* & *Beidelossar Alpini* atque

in catalogo Horti Amstel. cum *Belericu* confundit, male simul ibidem ab hoc *Apocyno Syriaco Americano* separans *Apocynum rectum latifolium Americanum Park.*

Variat hoc *Apocynum* pro varietate Climatis è quo defertur; Est enim *foliis* vel magis vel minus incanis; *Caulibus* nunc atropurpureis nunc viridantibus nunc incanis: *Floribus* in obsoleta purpura aut saturationibus aut dilutionibus aut prorsus albis. Hinc præter illud *Cornutianum* innotuerunt.

APOCYNUM *Syriacum rectum canle viridi, flore ex albido Hort. Reg. Paris.*

APOCYNUM *erectum Virginianum caulibus & nervis foliorum puniceis Par. Bat. Pr.*

Enatum est in Horto Beverningiano seminibus ex Virginia illatis.

APOCYNUM *erectum Noveboracense foliis minus incanis flore ex obsoleto dilute purpurascense, An Apocynum erectum medium latifolium peregrinum flore umbellato ex obsoleto dilute purpurascense Breyn. Prod. 2.? An Apocynum rectum latifolium Novæ Belgiae Comelm. Cat. Hort. Med. Amstel.*

Conspeximus in Horto Beaumontiano ex quo habuit *Comelinus*.

APOCYNUM erectum Canadense *angustifolium*.
Apocynum minus rectum Canadense Corn. *Apocynum angustifolium Canadense viride erectum floribus rubicundis* Hort. Lugd. Bat. *Apocynum rectum Americanum angustifolium sive minus* Park. *Apocynum Americanum Asclepiadis folio; & Apocynum umbellato rubro flore* Horti Hermans Foenquet. Hort.

Siliquas fert erectas nunc ex uno calyce geminas nunc singulares.

APOCINUM erectum Canadense *latifolium*.

Ab *Apocyno* præcedente distinguitur potissimum foliorum forma & florum colore. *Folia* quippe multo sunt latiora & longiora, colorisque in viridi pallidioris. *Flores* rubent saturatius quam in *Apocyno Syriaco* Cornuano, seu si magis dilutius quam in *Apocyno* præcedente. *Stolones* ex nigro nunc purpurascunt nunc virescunt, est parilis coloris in caule lusus *Apocyno* quoque præcedenti familiaris est. Hujus *semana* primum ex Canada postmodum etiam ex Noveboraco huc illata

illata sunt. *Flores* sub nostro climate exhibet seri-
us, *semina* raro aut nunquam perficit. Amat quod-
vis solum, seseque multiplicat propaginibus ab ra-
dice resectis. Huc forsan pertinet.

APOCYNUM erectum Virginianum *VVi-
sanck, seu Vincetoxicum Indicum dictum
Gerard.*

QUantum enim ex Icone à *Gerardo* proposita
animadverto, vel est idem *Apocynum ere-
ctum Canadense latifolium*, vel ejusdem varietas.
Qua vero ratione à *Rajo* in *Histor. Apocyno Sy-
riaco* & ab utroque *Bauhino Asclepiadi* adjunctum
sit, non constat.

APOCYNUM erectum Canadense humilior angu-
stissimo folio Hort: Lugd-Bat.

AB *Apocyno erecto Canadensi angustifolio* so-
la foliorum angustia cauliumque brevitate
deslectit.

APOCYNUM Novæ Angliæ subhirsutum radice
tuberosa floribus aurantiis Hort. Lugd. Bat. App.
Apocynum erectum minus latifolium Americanum
E 2 flore

flore umbellato aurantio petalis reflexis radice tuberosa Breyn. Prod. 2.

APOCYNUM Corassavicum seu Americanum fibrosa radice floribus aurantiis Chamenerii foliis angustioribus Par. Bat. Pr. & Pluckn. phyt. Apocynum erectum minimum angustifolium Americanum flore umbellato aurantio petalis reflexis Breyn. pr. 2.

APOCYNUM Corassavicum seu Americanum fibrosa radice floribus aurantiis Chamenerii foliis latioribus Par. Bat. pr.

VTriusque Apocyni Curassavici flores, structurâ & magnitudine Apocyno Novæ Angliæ tuberosa radice adeo consimiles sunt, ut in solo colore differentia animadvertatur. Apocyni Noveboracensis flores unicolores sunt petalis scilicet segmentis singulis intenso aurantiaco colore tinctis; Corassivi vero bicolores sunt intermediis peralis erectis, dilute croceo seu aurantiaco flaventibus, externis vero deorsum inflexis fulgenti cocco splendidibus. Caudales mox ab radice in multas alas divisi ad pedis altitudinem atolluntur ornati ad singulos nodos foliis ex opposito binis, ad Chamenerium seu Lysimachiam filiquosam quadantenus accedentibus, attramen

APOCYNUM
Americanum
Chamaenerii folius.

p. 36.



men glabris gracilibus magis mucronatis colorisque in viridi dilutionis. Speciei priori latiora sunt & longiora, posteriori vero angustiora & breviora. Ex singulis foliorum conjugationibus surgit petiolus biuncialis cui flores velut in umbellam sparsi insident, in singulis radius in quos petiolus finditur, singuli. Floribus marcescentibus succedunt *siliquæ* ut plurimum singulares raro geminata erectæ siliquis *Asclepiadis* crassiores & breviores *seminibus* lanigeris velut in congeneribus referta. *Radix* numerosis fibris ab uno cespite prodeuntibus capillatur, novas subinde soboies emittens, quæ si transplantantur prompte adolefcunt, Flores perficit Augustus, Semina Septembri. Amat solum fervidius solis radiis collustratum; Proinde mox ab ineunte autumno ad insequentem æstatem usque in hybernaculis custodiri expetit. *Succum* fundit lacteum, gustanti insipidum.

APOCYNUM erectum fruticosum folio subrotundo glauco. *Apocynum folio subrotundo* C. B. P. *Apocynum folio subrotundo floribus ex albo pallentibus* I. B. *Periplocca latifolia* Gerard. *Apocynum latifolium non repens* Park.

Cætera *Apocyni* hujus Synonyma videantur in
Pipace Casp. Baub.

APOCYNUM erectum *Fruticosum folio
subrotundo viridante.*

In Catologo *Hort. Lugd. Bat.* ut & in *Flora Bata-
va* nomine *Apocyni recti Americani latifolii ma-
joris Park.* quo *Dn. Watfius* ex Anglia miserat per-
peram propositum est. Nam varietas est *Apocyni*,
præcedentis a quo solo foliorum colore differt.

APOCYNUM Indicum minus *Nummula-
ria folius Breyn. Ephem. Germ.*

In Insula Zeylan, ubi *Breynius* provenire scripsit,
nobis non occurrit. Neque unquam in Horto
Amstelodamensi apparuit, cujus Catalogo a *Come-
lino* insertum est.

APOCYNUM Virginianum flore herbaceo
*siliqua longissima Mor. Præl. Bot. Apo-
cynum Canadense maximum flore mini-
mo herbaceo Hort. Reg. Bles & Cat. Hort.
Reg. Par. Pluck. Phyt.*

Iconem vide in *Pluck. Phyt.* de descriptionem autem in *Moris. Prel. Botan.* Cui Adde, *siliquas* ferri ex uno *calyce* semper geminas propendentes mucrone coalescentes. *Radix* late serpendo multas propagines emittit, singulis annis ex radice repullulans. *Floret* sub finem æstatis, *semina* perficit exeunte autumno.

Hoc opinor idem illud *Apocynum* esse, quod *Joncquetus* in Horto vocavit *Apocynum erectum folio Esulæ raræ Venetorum*? *Folius* enim varie ludit. *Alia* *Esulæ raræ Venetorum* valde respondent, *alia* duplo aut triplo ampliora sunt.

APOCYNUM maritimum erectum Venetum flore purpureo Hort. Lugd. Bat. Tithymalus maritimus purpurascens floribus C. B. P. Esula rara è Lio Venetorum Insula. Lob.

APOCYNUM maritimum erectum flore albo Hort. Lugd. Bat. Tithymalus maritimus, seu Esula rara è Lio Venetorum Insula flore albo Cat. Hort. Reg. Par.

Ambas hæc plantas non *Esulas* sed *Apocynis* inscribendas esse evincunt *Seminea lanigera* in fili-

filiquis univalvibus angustis summa parte per longitudinem dehiscentibus. Differunt inter se potissimum florum colore. Posterior

APOCYNUM *Americanum foliis Androsami majoris, floris Lilii convallium suave rubentis Cat. Hort. Reg. Par. Apocynum Canadense foliis Androsami majoris Bocc. Ic. & Descr*

Frigus innoxie tolerat hoc *Apocynum* amans solum udum compactum, frequentem transplantationem ægre ferens.

APOCYNUM *Zeylanicum indicum frutescens Neri flore candidissimo.*

In solo Zeylanico sabuloso provenit hoc fruticosum *Apocyni* genus, quod flexilibus suis & obsequiosis virgulis tam late varietque diffunditur, ut inter *Apocyna* erecta & scandentia medium locum obtinere posse videatur. Adolefcit *caudice* crassitudinis pollicaris nunc quatuor nunc plurium cubitorum altitudinis, *ligno* molli consimilique medulla repleto, *cortice* glabro in fusco rubente, cinereis lituris anguineo more maculato. *Radix* subest albida

albida lignosa furculosa longo ductu summam tellurem perreptans. *Ramulos* undique luxuriantes ornant *folia* utrinque adversa *periplocae* scandenti folio longo purpurante flore non multum absimilia glabra pingua, parte superna saturate virentia, infernâ pallidula, numerosis venulis pulchrè cancellata, mucrone acuto deorsum flexo, magnitudinis valde inæqualis, sed quæ maxima sunt, nec digitum longitudine nec duos transversos latitudine excedunt. In ramorum apicibus laxior apparet *corymbus* ex octonis nonnunquam pluribus aut paucioribus oblongis acuminatis in viridi pallentibus capitulis congestus, quæ sensim & successive in *flores* forma & magnitudine *Nerio* æquales expanduntur; *Odorem* quidem singularem nullum præ se ferunt sed structuræ & immaculati *candoris* pulchritudinem tam eximiam ut à Zeylanensibus nomen *Iddaghar*, quod florem arboris denotat, *Apocynum* hoc meruerit.

Oblongi & tubulati sunt *flores* summa parte quinquepartiti e medio prominentibus quinque flavescentibus staminibus in conum coalescentibus cum quindecim parvis albis foliolis trilobatis, lobis singulis laciniatis quasque fimbriatis stamina ista coronæ instar ambientibus. Ex singulis demum florum caliculis demittuntur *siliquæ* geminæ digi-

F

tum

tum longæ glabræ ab *Apocyno* Americano *Androsani* foliis *Bocc.* sola magnitudine desectentibus. In his *Semina* continentur depressa membranacea flava lanuginosa velut in cocteris hujus sortis *Lacteo succo* viscoso acris mordacisque saporis turgēt. Florum quovis anni tempore fœrax est.

APOCYNÆ ex Horto Malabarico.

APOCYNUM Malabanicum erectum flore tetrapetaloide. *Parparam Hort. Mal. Part. 9.*

NUm *Parparam Apocynis* sit annumerandum dubitat præter omnem rationem *Comelinus*: inquit enim in notis suis ad *Parperam*: Si *Parperam* plenarie est descripta: vix inter *Apocyna* recenseri potest. Flos enim tetrapetalus est, *Siliquæ* verò cum *Apocynis* conveniunt; si flos esset pentapetalus & caules vel album vel viridem succum fuiderent, inter *Apocyna* numerari deberet. Ast ex descriptione hac non liquet. Liquet autem evidentissime tum ex icone tum ex descriptione in *Horti Mal. Part. 9.* propositus, *Parparam* nulli plantarum familiæ nisi *Apocynorum* esse inferendum. In Icone enim exprimuntur *Siliquæ* univalves per longitudinem seaperientes; In descriptione vero edocetur *Semina*

mina ita esse disposita, ut se invicem scutellatim obtegant. & filis penicillatis filamentoque medio communi annectentur. h: e: Semina cum appendicibus suis lanuginosis imbricatum more stylo nutritivo incumbunt. Constat autem neque flores pentapetaloides nec succum lacteum viridemve ut Comelinus opinatur; sed solam prædictam seminum in siliquis dispositionem notam Apocynorum characteristicam constituere.

APOCYNÄ *Asclepiades dicta. Asclepias flore albo C. B. P. Asclepias sive Vinetoxicum cum multis floribus albicantibus I. B.*

A *Sclepiadis* hujus varietates duas in horto colui, quarum prima est *Cauliculis* tenuioribus lentis infirmis & deorsum flexis nisi baculo alligentur: altera est *Cauliculis* robustioribus rectè assurgentibus, nullo adminiculo egentibus.

ASCLEPIAS *angustifolia flore flavescente*
Cat. Hort. Reg. Par.

Quod hoc nomine in horto nostro colitur *folia* habet æque lata ac præcedens, sed paulo breviora.

ASCLEPIAS *siliqua bifido mucrone C.B. P. Asclepias Cretica Clusi J. B. Park.*

APOCYNUM *Malabaricum arborescens foliis quinis in orbem congestis Pala Hort. Mal. Part. 1.*

APOCYNUM *erectum Malabaricum frutescens Jasmini flore candido. Codaga Pala Hort. Mal. part. 1.*

Frequens est in Insula Zeylan, ubi *Wal Idda* id est flos Sylvaticus appellatur.

APOCYNUM *Malabaricum arborescens Nerii siliquis & semine floribus ex flavo rubescentibus. Nelam pala Hort. Mal. part. 9.*

APOCYNNA *ex Antonii Rechii Historia Mexicana.*

APO-

APOCYNUM erectum *Texcoquense*
Verbasci foliis, floribus variis, Cenanam
Texcoquensis seu Maser Spice Maizil
Rech.

Coloris in flore varietatem probat *Columna*,
 in notis ad *Rechium*, inquit. In *Rechii*
exemplari flores depinguntur coccineo colore ex Caly-
cibus virentibus, altero vero ramulo basis coccinea,
& flos infidens luteus. *Rechius* autem flores can-
 dentes adscripsit. Idem *Columna* ad *Nerium* vel
 ejus speciem referrı posse censet, folia *Lysimachia*
siliquosa dicta comparans. *Terentius* inter *Peri-*
ploccas seu *Apocyna* reponendum esse rectissime
 conjicit. Rationes vide in ejusdem commentario.
 An planta sit erecta an scandens à *Rechio*, eodem
 monente *Terentio*, prateritum est. Si quæ con-
 jectura ex *Icone* sit facienda, potius erecta censen-
 da est.

APOCYNUM erectum *Texcoquense*
Periploca angustifolia foliis. Cenanam
Texcoquensis Rech. Terent.

Praecedenti simile fecit *Columna* in notis ad *Rech.*
Cenanam autem De *Quabuna* hoc quam idem
 F. 3. *Columna*

Colonna Apocynis congenerem fecit, ad plantas bacciferas spectare videtur. Ei enim assignavit *Terentius* baccas in unam congestas virides ut in *Solano*.

APOCYNUM erectum *Mexicanum*
tuberosa radice fructu spinifero. Quahutzontic seu *Truncus sectus.* Quahauhton *Rech.* seu *Truncus parvus.* Coatzontecomatl seu *Radix rotunda.* Huchueli caton. Yztacpatli *Hortzocensibus* seu *candida Medicina Rech.*

APOCYNUM erectum *Mexicanum*
nodosum tuberosa radice folio salicis.
 Yztacpatli *Rech. Terent.*

FRUCTUS in Icone expressus spinulis videtur armatus velut fructus proxime præcedentis. Ambo hæc *Apocyna* ob spinosi fructus similitudinem forte subijcienda sunt *Apocynis* Africanis fructu villosi.

APO-

APOCYNUM erectum *Mexicanum*
Limonis folio purpurascens. Tepezenti.
Spica Maizii Montani Rech.

APOCYNUM Virginianum *Asclepiadis folio erectum floribus pallide coeruleis radice crassa.* An *Moyotliayacatli Rech?*
Pluckn. Phyt.

Terentius hujus folia *Lilach* seu *Periploca* latifoliae similia fecit & floribus colorem rubrum assignavit. Radicis formam nec in Icone nec descriptione expressit. Cœterum Icon *Rechii* cum Icone *Pluckenetii* consonat.

Apocyna NERIA Diffa.

NERIUM floribus rubescentibus C. B. P.
Nerium sive Rhododendron flore rubro f. B.

NERIUM floribus albis C. B. P. *Nerium sive Rhododendron flore albo l. B.*

NE-

NERIUM *Indicum angustifolium floribus odoratis simplicibus Hort. Lugd. Bat. Belutta-areli aut Fula Mestica alba Hort. Mal. part. 9.*

NERIUM *latifolium floribus odoratis plenis Hort. Lugd. Bat. Nerium Indicum flore rubescens pleno Breyn. Prodr. 2. Tsiiovanna-aleri vel Fula Mestica incarnata Hort. Mal. Part. 9.*

VTriusque *Nerii* Indici plenam descriptionem vide sis in *Hort. Mal. part. 9.* quam supple sequentibus : *Siliquas* profert erectas ex uno calyce geminas , quibus includuntur *semina* oblonga teretia in rusto flavescentia lanugine concolori cristata , imbricum modo duplici serie stylo intermedio adhaerentia. Speciei priori *folia* sunt angustiora ad singula genicula ut plurimum bina sibi opposita ; Speciei posteriori *folia* sunt latiora ad singula genicula terna. Utraque fundit *succum* limpidum flavescentem.

Comelinus in notis ad *Belutta-areli* prodidit, *Nerium* ab *Apocyno* discerni quod hoc sit herba , illud vero arbuscula sed cum *Apocyna* quaedam frutes-

tescunt imo & arborescunt, differentia ista admittenda non est.

NERIUM *Americanum maximum folio longissimo nonnihil mucronato Par. Bat. prod. Quam hutchepates seu Arbor ignea Rech.*

NERIUM *Americanum maximum folio longissimo obtuso Par. Bat. prod.*

Vtrumque ex America sub Nomine *Nerii* floribus luteis odoratis in Belgium invectum est. Præter folia & caulem hætenus nihil protulit. Illa dodrantem longa sunt, lata pollicem, rigida numerosis transversalibus venis insignita. Hic pollicem crassius, duos pedes altus foliis absque ordine vestitus.

NERIUM *Americanum lactescens longissimo folio flore albo odoratissimo Hort. Beaumont. Cat.*

Valde accedit ad *Nerium* præcedens, si non sit idem. Florem nondum protulit.

NERIUM *Portoricense crasso angustissimo folio.*

Inter plantas siccas exoticas Amplissimi *Beaumontii* occurrit.

NERIO *Similis arbor C. B. P. Nerii facie
arbor J. B.*

Nisi obstarat tomentum quod arboris hujus seminibus adscripsit *Pena*, dixisses potiori jure *Palega pajanelli* & *Pajanelli Hort. Malab. part. 1.* quam *Nerio* congenerem esse. *Paja pajanelli* & *Pajaneili semina* sunt depressa membranacea more imbricum in siliquis invicem incumbencia. Con- similem dispositionem habent semina *arboris Nerio similis*. *Siliquæ* enim, docente *Pena*, infarciuntur pelliculis cepaceis exuvium serpentis ementuentibus, ast, quod difficultatem parit, tomentosis. Si igitur per tomentum intelligendum sit cauda lanuginosa, ut *Lobelius* uterque *Baubinus* & alii intelligere videntur, utique *Nerii* non *Palapajanelli* aut *Pajanelli* annumeranda est.

NERIUM Mexitanum *Perfice foliis siliquis luteis. Mexochil seu Omexochil Rech. Terentius ad Apocyna, Columna ad Nervium referendum censet.*

Neriorum familiae adscripserunt *Terentius* & *Fonstonius Yccotli Rech.* Hinc NERIO *similis arbor altera Fonstonio vocatur. Ast fructus quos ipse Teren-*

Terentius Bursæ Pastoris similes fecit, docent ad arbores *capsulatas* emandandam esse arborem istam Mexicanam.

VIX NERIUM *forte Apocyno congener* inquit *Terentius*, est Arbor illa Mexicana *Rechio* TETLATIA seu urens arbor Haitinis *Guao* dicta. At repugnat fructus, qui à Nerio & *Apocyno* valde alienus & *Rechio* ipso teste *Uredonis* forma & magnitudine est.

NERIS quoque annuierat *Zanoni* in *Hist. Bot.* duas plantas Creticas quarum primam vocat *Leandro di Candia fruttifero majore fœtido*. *Mentzelius* in *Ind.* transtulit *Nerium Creticum fructiferum majus fœtidum*. *Rajus* in *Hist. App. Oleander minor frugifer fœtidus Creticus*. Alteram nominat *Leandro di Candia fruttifero minore fœtido*. *Mentz.* in *Ind.* vertit *Nerium Creticum fructiferum minus fœtidum* & *Rajus* in *Hist. App. Oleander Creticus fruticosus major fœtidus*. Ista autem plantas nequaquam ad *Neria* sed ad arbores bacciferas & forsitan ad *Periclymena* seu *Caprifolia* spectare, id evincere videntur florum forma & baccatorum fructuum dispositio. Huic sententiæ Calculum suum adjecit *Rajus* inquam in *Historiæ plantarum*

appendice p. 1919. Hanc (denotans speciem majorem) plantam esse existimo quam prope Scaleam in Regno Neapolitano inveni & postea siccam apud insignem Botanicum Job-Mariam Ferro Pharmacopæum vidi Periclymeni supini pumili appellatione. Floris equidem forma ad periclymenum accedit, flos etiam summo fructus insidet ut periclymeno qui fructus qualis fuerit, in sicca discernere non licet, pyriformis tamen videtur & umbilicatus.

APOCYNÆ scandentia seu Volubilia

APOCYNUM Sive Periploca scandens, folio longo flore purpurante J. B. *Apocynum folio Oblongo* C. B. P.

APOCYNUM Angusto Salicis folio C. B. P.
Apocyni secundi species altera Clusi.

APOCYNUM Scandens Ægyptiacum Sefelios Æthiopici foliis angustioribus. Secamone Alpin. *Libr. de pl. Ægypt. Phaseolus Indicus* IV. Bont.

IN Zeylona & Malabara mihi non occurrit hoc *Apocynum*, quanquam Bontius hujus mentionem inter stirpes Javanenses fecerit, Icone, quam proposuit,

posuit, ex *Alpino* deprompta. Hoc ab *Apocyni* *secundi* *specie* *altera* *Clusii* deferre, recte monuit *Parkinsonius*: *Bauhinus* in *Pinace* cum eodem conjunxit. Siccum ramulum absque floribus & seminibus misit ex Promontorio Bonæ Spei DN. *Oldenlandius* sub appellatione *Apocyni scandentis* *Africani* *foliis* *rigidis*.

APOCYNUM Scandens fruticosum fungoso cortice *Brasilianum*. *Apocynum Brasilianum amplexicaule fructu magno* *Beidelsaris Raji Hist.* *Ibari Marckgr.*

APOCYNVM Scandens fruticosum fungoso cortice *Sirinamense fructu magno* *pentagono* *Pipu Simeron Sirinam.* *Armen* *Dupbel vulgo.*

HOc à *Brasiliano* discrepat potissimum fructu. Quem ex *Sirinama* habeo fructus totus glaber est, magnitudine & forma ovi gallinacei coloris in flavo viridantis quinque membranaceis rigidis alis per longitudinem excurrentibus & in extremitate in parvum obtusumque mucronem coeuntibus, donatus. Huic magnitudine & colore

similis est fructus *Apocyni Brasiliensis*; ast alis caret, harumque vice, referente Marckgravio, exterius multis prominentiis instar aculeorum praeclatus est.

APOCYNUM Scandens *Scammonii foliis latioribus & acutioribus. Apocynum latifolium amplexicaule* J. B. *Scammonia Monspeliaca affinis foliis acutioribus* C. B. P.

APOCYNUM Scandens *Scammonii foliis latioribus & acutioribus viridantibus* Fl. Bat.

Prioris varietas est.

APOCYNUM Scandens *Monspeliacum Scammonii foliis rotundioribus. Scammonia Monspeliaca foliis rotundioribus* C. B. P.

A Dolevit seminibus Ulyssipona illatus. Octobris initio floret, Semina rarius perficit.

APOCYNUM *Asclepiadis folio flore nigro* Hort. Lugd. Bat. *Asclepias nigro flore* C. B. P. *Asclepias flore nigro quorundam* J. B.

APO-

APOCYNUM Scandens *Zeylanicum radice Asclepiadis. Apocynum scandens foliis Laurinis*
Par. Bat. Pr. Manughawæl Zeyl.

L Ocis aridis incultis Insulæ Zeylan obvium, & Incolis ob insignes *radicum* virtutes expetitissimum est. Hæ albidæ sunt prælongæ tenues fibrosæ, odore *Vincetoxicum* æmulantes, sapore subdulci moderate acri & sub finem non nihil nauseoso, ut proinde purgando pectori tota proprietate dicatæ sint, tussique quam stomachalem vulgus vocat in specie medeantur. Tenacem pulmonum mucum attenuant, acrem mitigant, & ad excretionem promovent. Decoctum & Syrupus puerorum alvum blande subducit & nonnunquam vomitum concitat. *Cauliculos* emittunt ramosos teneros longitudinem duorum triumve cubitorum superantes, nunc humi procidentes nunc vicina fulcra scandentes. Obducti sunt *membrana* duplici, quarum exterior tomentosa est, interior, quæ medullæ incumbit, velut cannabisin filâ ductilis. Singulis nodis adnascuntur *folia* bina ex opposito duos pollices longa, unum lata, densa raris brevibus & lanuginosis villis quasi pube obsita, in summo obtusa e medio nervo nonnulli prominente. Ad horum sedes apparunt *flosculi* in umbellam congesti parvi flavesc-

vescentes , medio dilate purpurascetes in quinque segmenta dissecti : tabescentibus succedunt, *filiquæ* lanigeræ longæ angustæ ut plurimum geminæ quæ ex *calycibus* quinquifidis , velut in Asclepiade pro-pendent. Hactenus cœli nostri intemperiem adeo reformidavit hoc *Apocynum* ut Martio consitum pulchre quidem progerminaverit , ast Octobri sensim ingruente inclementiori aura , quantumvis ab hac diligentissime fuerit custoditum consenuerit & perierit.

APOCYNUM Scandens Zeylanicum *Scammonie*
foliis hirsutum.

Iisdem natalibus , quibus antecedens , gaudet hoc Apocynum. *Radicem* habet vivacem pallide flavescentem fibrosam ; *Coliculos* ramosos longos lentos volubiles , crassitie calami , velut Cannabæ in fila ductiles. In singulis nodis *folia* ex opposito bina , cordiformia , Scammonie Monspeliacæ rotundifolæ foliis rotundioribus C. B. P. similia , ast paulo minora. *Flosculos* septem aut decem umbellæ effigie tenui digitali ramulo dependentes , parvos , è quinque segmentis pallide virentibus villosis crassiusculis & intermedio umbilico pentagono candicante lucido , in mucronem fastigiato ,
con-

constructos. *Siliquas* ex calyce quinquifido nunc solitarias, nunc geminatas pilis hirsutas mucronatas deorsum spectantes, longitudine uncias tres cum semisse, crassitie unam, præcipue in medio ubi crassissimæ, adæquantes. In his continentur *Semina* candida de more cæterarum, hujus familiæ specierum. Tota planta villosa hirsutic obducta est lacteque acriscatet.

APOCYNUM Scandens *Africanum foliis Laurinis Lucidis glabris* Par. Bat. Prodr.

HOc Conspexi Floribus viduum in Horto plantarum rariorum feracissimo DN. *Johannis Van Riedt* in quem illatum erat ex promontorio Bonæ spei. *Cauliculos* habebat cubitales graciles lentos glabros & ad singula genicula folia conjugata, digitum longa sesquipollicem lata, rigidiuscula Lauri foliis quadantenus similia, in extremitate vero obtusa, parte superna coloris in viriditente, inferna palliduli, multis transversis venuis insignita. *Radix* erat prælonga albicans fibrosa. *Lac* fundebat paucum fere insipidum.

APOCYNUM Scandens *Vinca peruviana*
foliis viride fructu villoso.

A Bſque ulla difficultate adolevit ſeminibus à DN. Oldenlandio ex Promontorio Bonæ Spei tranſmiſſis. *Radibus* eſt tenuibus albis longis reptatricibus fibroſis, *Viticulis* lentis ſubhurſutis calamo tenuioribus, valde ramoſis tres quatuorve ulnas longis pedementa quævis multiplici circumvolutione amplectentibus; *Foliis* ad ſingula genicula binis ex adverſo *Clematidis Daphnoide* majoris facie, pollicem & amplius latis, unum cum ſemiſe longis è baſi ſinuata in obtuſum ambitum tendentibus, cum prominulo brevifſimo mucrone, craſſiuſculis lucidis ſupina parte in viridi pallentibus multiſque cancellatis venulis inſcriptis; *Floribus* parvis albidis ſeptem novem aut undecim in uno communi petiolo ex foliorum alis emergente, in umbellam congeſtis, unico petalo in quinque profundas crenas diſſecto & intermedio pentagono concolori umbilico conſtantibus; *Calycibus* quinquifidis viridantibus magnitudine ipſos flores excedentibus ut *hor*, potius umbilicum, *iſtos*, flores dixeris. *Seminibus* nigricantibus de more lanuginofis in *ſiliquis* villis aculeorum inſtar armatis nunc ſingularibus nunc geminatis ex uno calyce, *Lacte*
ſca-

scatet acri amaricanti & nauseoso. Floruit Octobri mense, secundo à satione anno, siliquis, dum hæc scribo, nondum maturatis.

APOCYNUM Scandens *Africanum Vinæ pervinæ foliis subincanum. Apocynum scandens Africanum hirsutum Par. Bat. Prod.*

A Præcedente distinguitur, quod *Vitriculi & folia*, mox à tenera adolescentia, lanuginosa rara qualique senili canitie albescant. Coetera conveniunt. Augusto mense hujus anni floruit in Horto Dominae de Block. stirpium rariorum feracissimo. *Fructus* nondum conspexi. Eos priori non multum dissimiles esse, consimilis partium structura indicare videtur.

APOCYNUM Scandens *Africanum Asphodeli radice angustissimo folio Oldenlandii.*

HUjus *Radices* ab uno capite numerosæ ceu glandes circiter octo vel septem Asphodeli modo coacervatæ descendunt, digitum crassitudine, palmum excedentes, carnosæ succo plenæ, in fibras inæquales exeuntes, gustus primum subdulcis postmodum pungentis nauseosi, odoris vhe-

mentis hircini. Virgulas emittunt tres quatuorve virgineas prælongas, lignosas ramosas, tenues multiplicibus gyris vicina statumina involventes; Ad singulos nodos quadruplici digito intervallatos erumpunt folia bina ex opposito angusta *Pulegio cervino* seu *Satureja Virginiana Horti Lugd. Bat.* non dissimilia, rigidiuscula leviter mucronata altera parte pulchre viridia, altera candidula nervo in longum porrecto insignita. Ex horum sede exit pediculus brevis, qui ubi in radios finditur quinque senisve parvis foliolis in orbem fuscis circumvallatur, singuli radii sustinent florem monopetalum tubulosum urceolatum in quinque incisuras sectum Coloris intensissime miniat, quem delapsum excipit *fil. q. a* Asclepiadis effigie incurva fuscis lanuginosis *seminibus* plena, è parvo quiquifido calyce propendens. Ita fere scripsit Ornatissimus *Oldenlandius* cum sic cum hoc *Apocynum* ejusque iconem ex Promontorio Bonæ Spei ad me mitteret. An lacte more congenerum turgat, Additum non erat.

APOCYNUM Scandens *Corassavicum*
Satureja foliis.

INter plantas siccas sumptibus & cura Amplissimi *Beaumontii* ex *Corassavia* delatas conspexi. *Fol. liis*

lâs priori Apocyno brevioribus est, *Siliquis* quoque angustioribus & brevioribus, *Radice* pro plantæ magnitudine satis crassa, *Flores* dignoscere haud potui.

APOCYNUM Scandens *Americanum hirsutum flore amplo purpureo Pluckn. Tab. LXXVI.*

Apocynum. Scandens Africanum hirsutum Par. Bat. Prodr. ab hoc alienum esse, id ex superioribus colligere est, An idem sit? dubitat Pluchetius.

APOCYNUM *Guineense mere Apbyllum flore albo tetrapetalo odoratissimo. Hort. Beaumont. Catal.*

Cauliculos fert glabros teretes viridantes lacte turgidos prælongos articulatos, *Foliorum* vice (in quantum hætenus apparuit) ramulos ad singulos articulos ex opposito binos & ex his alios atque alios quibus vicina statumina scandit. *Flores* mihi hætenus non visi, perhibentur tetrapetali albi odoratissimi *Gasmini* æmuli. *Semina* lanuginosa in *siliquis* longis angustis ex Guinea delata ostendit DN. Kiggelarius rerum naturalium insigni non tantum copia, sed & cognitione instructissimus, cujus indefessâ industriâ carissimum hoc Apocynum inter multas alias utriusque Indiarum delicias in Hortis

amplissimi *Beaumontii* in hunc usque diem vernat.

APOCYNUM *Humile Aizoides aphyllum Africanum. Apocynum humile Aizoides siliquis erectis Africanum Hort. Lugd. Bat. Fritillaria crassa Prom. Bon. Ex. Stapel.*

APOCYNNA *Scandentia ex Horto Malabarico.*

APOCYNUM *Scandens Malabaricum fruticosum floribus Nerii caryophyllos redolentibus, Belutta Kakakodi Hort. Mal. Part. 9.*

APOCYNVM *Scandens Malabaricum, flore vario folliculis triplici costa insignitis Adakodien Hort. Mal. Part. 9.*

Apocynum *Scandens flore variegato siliquis Ericu similibus vocatur à Comelino in Comment. Hort. Mal. At in siliquis Adakodien & Ericu notabilis est disparitas.*

tas. Hoc, nempe *Erica* filiquas habet in superficie inæquales & rugatas & hinc inde lacunosas, Illud, tribus pro minus costis insignitas, coetera glabras.

APOCYNUM Scandens *Malabaricum fruticosum siliquis bifidis expansis flosculis flavis omnium minimis.* Kakadodi Hort. *Mal. Part 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum siliquis singularibus floribus flavis stellatis.* Kudici Kodi Hort. *Mal. part. 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum siliquis singularibus floribus flavis stellatis absque staminibus.* Wallia palvalli Hort. *Mal. Part. 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum siliquis bifidis expansis floribus minoribus viridantibus.* Katupalvalli Hort. *Mal. part. 9.*

In

In descriptione *Katupalvalli Hort. Mal.* dicitur: *Fructus ex uno flore in communi calyce proveniunt quinque.* At cum hoc in *Apocynis* nunquam contingat, locum istum ita corrigendum esse censeo: Nimirum unum florem sequuntur siliquæ gemellæ (seu unitum par siliquarum in uno calyce) duobus tribus aut quinque paribus ex uno communi pediculo (non calyce) dependentibus. Miror *Comelinum* commentatorem id non animadvertisse.

APOCYNUM Scandens *Malabaricum* siliquis bifidis expansis floridantibus majoribus viribus umbone rubescente. *Nansjera Pasia Hort. Mal. part. 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum* siliquis bifidis longissimis & angustissimis floribus nonnihil villosis *Palvalli Hort. Mal. part. 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum* siliquis bifidis expansis floribus jasmini intus candidis extus rubris. *Kamettivalli Hort. Mal. part. 9.*

APOCYNUM Scandens *Malabaricum* siliquis bifidis expansis profunde liratis floribus viridantibus. *Watta Kakacodi Hort. Mal. part. 9.*

APO-

APOCYNUM *Scandens Malabaricum filiquis singularibus floribus Aristolochiæ ad oras quinque partitis. Niota nioden valli Hort. Mal. part. 9.*

APOCYNNA *Scandentia ex Hist. Mexic. Rechii.*

APOCYNUM *Scandens Michuacanicum diureticum Solani foliis. Mas I. Tlallantlacuacuit lapilli seu cauda parvi Tlacuatzin Rech.*

APOCYNUM *Scandens Michuacanicum diureticum. Mas II. Rech.*

APOCYNUM *Michuacanicum diureticum. Mas III. Rech.*

Hoc erectis *Apocynis* inferendum esse judicare licet, tum ex imagine a *Rechio* proposita tum etiam ex notis *Terentii*, qui *crassiori è caudice erectum* magis esse asserit.

APOCYNUM *Scandens Michuacanicum diureticum Fœmina fructu parvo Peponi simili Rech.*

Tres priores species, quarum florum fructuumque structura licet ex *Rechio* non constet, conjungendas esse cum specie postrema nempe

Femina vel ex eo liquet, quod singulis unam eandemque naturam tribuerit *Rechius*, & ipse *Terentius* qui *Rechii* autenticum exemplar vidit, in suis notis fructum, quem *Rechius Feminae* adscripsit, tribus prioribus speciebus quoque communem fecisse videtur.

Cui vero plantarum generi quatuor istae species annumerari debeant ipse *Terentius* ambigit. Nam in notis ad *Tacuache Tlallantlacuacuitlapilli* convolvulis miscuisse videtur, in notis ad *Tlallantlacuacuitlapilli* dubitanter proponit annon *Mediæ* inter *Cucumeraceam* & *Apocyni* familias statuendæ sint? inquit enim: *Lanugo illa argentea (quæ instar filamentorum sericeorum seminibus appendet) foliaque bina Apocynum petunt, cum in alio nullo volubilium genere reperiantur, at peponi similis in Apocyno fructus nunquam sed siliquæ duæ ex uno flore exorte.* Igitur subjungit: *Quid si medias inter Cucumeraceam & Apocyni familias statueris?* Ego vero, non obstante fructu singulari haud gemino parvo peponi simili, quatuor illas species *Apocynis* annumerari debere nullus dubito. Primo enim *dispositio seminum* in fructu *Apocynis* est consimillima; Deinde *Apocyna* quandoque *siliquas* singulares quandoque geminas proferunt; postremo *fructus externa facies* (sive illa sit peponiformis
sive

sive folliculata glabra villosa siliquata aliove quovis modo constituta) *Apocyna* designant; sed sola *semina* lanigera imbricatum in siliquis univalvibus disposita, uti superius annotatum est. Dulcedo quam *Rechius* radici tribuit nihil quicquam sententiae meae derogare potest. Quippe *Apocynorum* sapor in speciebus singulis non est unus idemque. Licet in plerisque sit acris amarus nauseosus fauces & linguam inflammans, tamen in nonnullis subdulcis aut prorsus insipiens deprehenditur. De *succo lacteo* flavoque cujus *Rechius* non meminit quid statuendum sit in superioribus indicatum est.

APOCYNUM Scandens *Michuacanicum Catharticum Mas.* Tacuache seu Radix *Michuacanica* *Rech.*

APOCYNUM Scandens *Michuacanicum*
Femina *Rech.*

APOCYNUM *Michuacanicum radice*
tenuiore *Rech.*

Horum *Apocynorum* nullum *Mecchoacannis* à *Monarde* propositis simile esse, id in annotationibus & additionibus ad *Rechium* rectissime

monuit *Fabius Columna*, taxans simul *Terentium*, qui tertiam speciem pro *Mechoacanna Bryonide* *Monardis* habere videtur.

Demiror *Fabium Columnam*, qui in citatis annotationibus *Tacuache* species *Apocynis* annumerare dubitavit, cum tamen ex *Rechii* descriptione perpenfis illis quæ de *Tlallantcuacutlapilli* nullibi aptius quam in familia *Apocynorum* collocari posse, manifesto liquet.

An tertia species volubilis sit aut erecta ex *Rechio* ægre dijudicatur. Nam præter plenariam descriptionem deest quoque Icon.

APOCYNUM Scandens foliis *Scammonii*
Neicotlapati.

Hujus fructificationem *Rechius* non prodidit. *Terentius* tamen inter *Apocyni* genera rependum esse judicat.

APOCYNUM Mexicanum *Pyri folio*. *Tepecutlacotl seu Cuirlacotl montana Rech.*

Neque hujus plantæ fructum descripsit *Rechius*. E foliis binis ex adverso positis & sapore acri *Apocyno* forte adjungi posse suspicatur *Terentius*.

APO-

APOCYNUM Mexicanum *procumbens foliis obrotundis flore candente.* Tlaltzilocayotli seu Tzilacayotli *humile. Siliquastrum Mexicanum Rech.*

An hæc planta inter *Apocyni* species referenda sit, incertum est, *Rechius* enim nec *flo- rum* nec *fructuum* structuram expressit. *Terentius* inclinat parti affirmanti, at siculneis utitur rationibus quæ hic adscribi vix merentur.

Veteres Græci in duo summa genera contraxerunt **ARI** species in ἄρον εὐώδημον *Arum esculentum*, & ἄρον δρακόντιον *Arum Draconium*. Posteriores in ἄρον ἥμερον *Arum sativum* & ἄρον ἄγρον *Arum sylvestre*. Recentiores in ἄρον absolute *Arum* & δρακόντιον *Dracontium*.

Dioscorides distribuit in δρακόντιον, ἄρον & ἁείαιρον, quibus quoque adjunxit, dummodo legitima sint duo illa capita, quæ in quibusdam codicibus *Dioscorideis* extant, δρακοντίαν μεγάλην, *Draconteam majorem* & δρακοντίαν μικράν *Draconteam minorem*.

Arabes similiter duo genera fecerunt *Luf* & *Luf serpentum*.

Plurimum *Ari* generum *Plinius*, ast non sine confusione, meminit.

Galenus attulit *Ari* genus in *Cyrenaica* nascens radice dulci, quod nonnulli à *Cyrenaica* & *Aegypto* usque culinis Romanis importatum & modernorum *Colocassiam* esse suspicantur, quamvis & hæc acrimonia, *Aris* communis, non careat.

Varia autem & intricatissima sunt, quæ *Prisci* de specierum istarum tum nominibus tum cæteris notis memoriz prodiderunt. Nam neque inter se conveniunt neque speciebus, quæ istis nominibus exhiberi solent respondent. Equidem non defuerunt & nostri & superioris sæculi Doctissimi Viri qui in difficultatibus istis expediendis omnem suam operam impendunt, quam irritam infectamque cum animadverterent horum cordatiores, vel veterum in tradenda stirpium historia negligentiam & fidem, vel propriam in iis agnoscendis inertiam inculcare nullo modo dubitarunt.

Relictis igitur Veterum intricatissimis de *Arotriciis*, subjicere liber, quæ species nostro & supe-

superiori sæculo sub nominibus *Ari, Arisari, Colocasia & Dracontii* innotuerint; & quibus notis a se invicem discernantur.

Singulæ sunt plantæ *Baccifera monopetala cucullata*. Floribus nempe ex oblongo convulso petalo cucullum mentiente & in intermedio stylo cornu genitale seu pistillum referente constructis.

ARUM

Absolute sic dictum

Hujus plurimæ varietates prostant nimirum.

1. *ARVM rotundiori folio maculis harumque colore in foliis conspicuis varium.*
Arum venis albis C. B. P.

ARUM venis albis lituris nigris signatum
 Mor. Hort. Bles. *Arum venis albis maculis nigris lituris maculatum* H. R. Par.
nigricantibus lituris aliquando purpureis signatum C. B. Matth. Cum hoc congruit

ARUM

ARUM vulgare folio subrotundo maculatum maculis nigris Jonquet. Hort.

ARUM Vulgare folio subrotundo maculatum maculis nigris spica violacea
Des Bertinieres Jonqu. Hort.

ARVM Venis albis maximum Italicum
H. R. Par.

His Succedit.

i i *ARVM Vulgare foliis longioribus maculatum aut non maculatum,*
hinc notatur.

ARUM maculatum maculis candidis
C. B. P.

ARUM Maculatum maculis nigris C. B. P.

ARUM Vulgare non maculatum C. B. P.

Sequentium specierum differentias ipsæ nomenclaturæ docebunt.

ARUM



ARUM
Zeylanicum
maximum

ARUM *Maximum, Macrorrizon Zeylanicum.*
Arum Maximum Zeylanicum foliis nervosis Par.
 Bat. Pr. Habara vel Habaraalla Zeylan.

Radix à *Colocasia Macrorriza* Alpini non multum abludit, carnosâ namque est brachium crassâ transversum acta foris flavescent intus pallida multis in superficie tuberculis & Zonulis quasi geniculis notata. *Folia* ex tuberculis coacervatim prodeunt. *Forma* quidem *Arum* æmulantur, ast longe ampliora sunt amplitudine *Musa* folia adæquantia validissimis prominentibus nervis firmata, & ad ambitum undulata læti pulcherrimique nitoris. Horum prælongi excavati pediculi, parte inferiori qua se invicem pressissime amplexantur in caulis speciem coalescunt, qui nonnunquam proceritatem trium pedum crassitiem brachii implet. *Flos* albicat & odorem suavissimum spirat. De cætero congeneribus respondet, solâ magnitudine exceptâ: Consimilem quoque habet temperamenti & facultatum harmoniam. Exit in Insula Zeylan ad fossarum margines, ut & in paludibus quæ æstate exarescunt. Prompte multiplicatur tuberculis ab radice avulsis & terræ insitis. Sub Belgico vero cœlo culturæ impatientissimum est, adventante enim hyeme etiamsi frigori subducatur flaccescit & putrescit.

trifcit. Radicibus elixis ficcatis & a volatili acridine vindicatis indigæ vefcuntur velut cæteris *Ari* generibus.

Idem *Arum* videtur quod *Comelinus* in *Catal. Horti Med. Amstel.* nominat *Arum maximum Ceylonicum radice crassa longa rotunda geniculata Colocasia folio.* *Welila Hort. Malab. part. 13.* nondum editæ. At appellatio isthæc non arridet, Nostri enim folia nihil cum *Colocasiis* habent commune, sed forma ad *Arum* accedunt, pediculumque cui incumbunt non in medio sed extremo foliorum insertum habent.

ARUM *Africanum flore albo odorato* Par. Bat. Prod. *Arum Aethiopicum flore albo odorato molle olente* Hort. Lugd. Bat.

Vix à sequenti *Aro Indico* discerpat nisi floris odore gratissimo. Abundat ad Promontorium Bonæ spei. Indigenæ radicibus ustulatis siccatæ & acrimonia liberatis vefcuntur.

ARUM *Indicum amplo flore* Moris Hort. Bles. & Jonq. Hort. *Arum indicum bicubitale amplo flore* Mor. Hort. Bles. Delin. *Arum Indicum magno flore* H. R. Par.

ARUM

ARUM *Bizantium Clusi.*

Vulgaror Prodromi *Paradisæ Batavi* falso inscripsit *Arum Lusitanicum majus folio auriculata*. Huc spectare videtur, cuius florem siccum in Horto Oxoniensi lectum, ad nos transmisit, Clarissimus Vir *Guilielmus Sberard* in Stirpium doctrina exercitatissimus Amicus plurimum æstimatus, nempe:

ARUM *Syriacum flore maculato.*

ARUM *Minus Matthioli.*

Ico *Bauhini* florem; *Matthioli* vero fructum exhibet.

ARUM *Zeylanicum minus Sagittaria folio* Par. Bar. Prodr.

ARUM *Zeylanicum spinosum Sagittæ foliis.* Kohn Wila Zeyl.

Radicem in obliquum agit longam crassam multis quasi geniculis cinctam & quaquaversum aculeatis tuberculis exasperatam. Folia insident pediculis spinosis plusquam cubitum altis *Aro vul-*

gari longiora nullis maculis infecta, parte inferiori, quâ pediculus inseritur, auriculatâ, auriculis in longulum mucronem acuminatis. *Flos* consimilibus aculeatis pediculis incumbit, constans longilimo in carinam excavato & recto habitu sursum ascendente petalo ut & pistillo parvo crassitie & longitudine vix digitum implente, qui, ubi maturuit, in crassam & densissime compactam uvam extuberat. Provenit in palustribus & umbrosis Insulæ Zeylan. *Sapor* acris & mordacissimus est cum vehementi faucium adstrictione in recessu.

ARUM *Bisfolium Ægyptium.* Arum minus *Ægyptium* Vellingii.

ARUM • *Bisfolium Arabicum maculatum* Ardabar *Matth. a Joseph.* Arum *Oriente* Ardabar dictum & *Raji* Arum *Indiæ Orientalis* Ardabar dictum foliis securis instar maculatis. *Mentz. Ind.*

Ob enormem & insolitam foliorum figuram suspectum conjicit Doctissimus *Rajus in Hist.* suspicionem autem tollit experientia nostra. Nam cum anno millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo Coutschinæ hæreremus, inter alia tum raritate tum singularitate elegantissima mirabilis hujus

jus plantæ folia sicca conspicienda nobis concessit R. Pater *Mattheus* Ordinis St. Josephi Carmelita discalceatus, Vir sane honestissimus omni prædicatione & fide dignissimus. Idem ille est, qui suas quas de plantarum orientalium virtutibus consignaverat observationes, in Hortum Malabaricum fideliter transtulit, & cujus plantarum Orientalium descriptiones & delineationes propria manu exaratae in *Zanonii* manus inciderunt. Oriundus est laudatus *Mattheus* Neapoli non è Lombardia ut *Zanonius* in Historia sua Botanica perhibet.

ARUM *Brafilense, anonymum, flosculus pharniceis elegantissimis folio unico Colocasiae Theatr. Brasil. Mentz. Ind.*

ARUM *Zeylanicum minus Colocasiae foliis pediculis puniceis Par. Bat. Pr. Ghahala Zeyl. Arum Ceylonicum minus cauliculis nigricantibus foliis Colocasiae similibus. Comel. Cat. Hort. Med. Amst.*

ARUM *Zeylanicum minus Colocasiae foliis pediculis viridantibus. Arum Ceylonicum minus cauliculis viridantibus foliis Colocasiae similibus. Comel. Cat. Hort. Med. Amst.*

Utriusque *Ari* Zeylanici folia formâ & lat-
vore *Colocassiam* imitantur quanquam
pediculi foliorum non inferantur.

ARVM *montanum Colocasia radice rotunda.*

ARVM *montanum Alpini Exot.*

ARVM *trilobato folio elatius & majus Bra-
silianum. Serpentaria triphilla Brasiliana*
C. B. Prodr. & *Dodart. Mem. Dracun-
culus minor Indicus Hort. Reg. Par. va-
ginula lineis dilute carneis & atro pur-
pureis striata pistillo nigro* Jonqv. Hort.

ARVM *trilobato folio elatius & majus fo-
liis latioribus. Serpentaria triphylla Bra-
siliana foliis latioribus & vaginula infe-
riore?* Jonqv. Hort.

ARUM *trilobato folio humilius & minus*
*Zeylanicum. Panualla Zeylan. Arum hu-
mile Arisarum dictum latifolium Ceyloni-
cum pistillo longissimo miniato colore. Co-
mel. Cat. Hort. Med. Amst. Nelen Schena*
Hort.

ARUM *Zeylanicum trilobato folio*
humilius et minus

p. 78.



Hort. Mal. part. 13. nandum edita. Ser-
pentaria triphylla Zeylanica Breyn.
Prodr. 2.

Locis opacis irriguis Insulæ Zeylan provenit pu-
 milum hoc *Ari* genus, quod Zeylanensibus
Pannala nominatur. Id nominis meruit a putrido-
 rum ulcerum vermiculis *Pann* dictis quos acris plan-
 tæ succus interimit. *Ala* idem est ac radix vel po-
 tius *Inhame* seu *Ignome* Lusitanorum, quæ vox ad
 quasvis radices tuberosas esui aptas extenditur.
 Est enim *radiculis* albidis tuberosis oblongo rotun-
 dis pluribus invicem coherentibus avellanæ & non-
 nunquam juglandis nucis magnitudine, e quarum
 sede numerosæ crassiusculæ fibræ in terram de-
 scendunt. *Folia* prima pubertate emittit integra
 aro vulgari similia ast minora multo, per adole-
 scentiam vero duplo aut triplo ampliora, & in
 duas tresve profundas lacinias quasi rotidem folia
 dissecta. Insistunt hæc pediculis sesquipalmaribus,
 qui parte inferiori in profundam cavitatem sulcan-
 tur. E singulis radicum tuberculis profilit foliacea
 convoluta *vagina*, sensim in mucronem turbinata,
 coloris extrinsecus herbacei cum intercurrentibus
 rubescentibus stris, intrinsecus puniceo holoserici
 pulchre

pulcre nitentis. Hæc dum solvitur demonstrat *Julum* Aro vulgari graciliorem breviorisque qui conspiciendus sic extat : Totus palmi longitudinem vix adæquat. Inferiori parte nonnihil intumescit & suave rubentibus parvis acinis concoloribusque molleculis cirrosis staminulis circumdatur; paulo supra contractior levior & tenerior & immaculato candore tinctus est; Media acinosus grandiorque apparet roseo colore pulchre nitens; Tandem in spicam desinit productiorem longitudine digiti, levem glabram intense rubram quæ faciem pistilli seu genitalis refert. Hæc, dum marcescunt sequuntur *baccæ* magnitudine & facie formicarum ovi haud absimiles coloris albidæ, *Ari* congenerum more instar *botrios* congestæ, binos oblongos arillos continentes, è quibus in terram nutricem procidentibus foliola *cochlearia* paria progerminant.

Tota planta *gustus* fervidi & mordacis est *Ari* & *Dracunculi* virtutibus respondens. Incolæ radices vel coctas vel sole siccatas atque adeo acredine orbatas esitant.

Haftenus in Belgio hospitari non didicit, nam vel levissimum frigus reformidans perit.

ARUM *aquaticum non maculatum* Belgarum *Jong. Hort.*

An

AN sic *Dracunculus palustris* five radice arundinacea. C. B. P. an ab hoc diversum? ex nomenclatura assequi non licet.

Forte *Aris* speciebus subjiciendæ sunt duæ illæ *Aninghæ Pison*. Suspicionem movent inter alia Flos, qui ex unico folio carinato coloris pallide flavi, & intermedio stamine crasso flavo constare dicitur. Deinde Julius, qui fructus illius est, & in priori specie magnitudine & figura ovum struthionis seu ut in prima Pisonis editione extat, *Ananas* adæquat; multis quasi quadratis constans coloris viridis intus refertus pulpa alba humida; In secunda verò, oblongus crassus compactus ac veluti granis & punctulis distinctus est, coloris primo viridis mox ex cinereo flavescens. Sane flos ille carinatus monopetalus cucullum, & julus utriusque pusillum baccis onustum non inepte referre videntur, quanquam alter contractior alter productior sit. ast difficultatem parit, quod nec *Margravius* nec *Piso* acrimoniæ quæ *Aris* omnibus communis est, mentionem fecerint. Uterque inquit fructus tempore necessitatis comedi, & quod majus est, utriusque *Aninghæ radicem* esse qualitatis frigida tenuium quoque partium & deobstruentem.

Priorem *Aninghæ* speciem olim in horto *Fageliano* semine ex America delato enatam animadverti. Prima folia sagittariam referebant cœtera *Aninghæ* prio-

si simillima erant ea præferunt, quæ plantæ euli
adstabant. Hanc ob rationem in *Par. Bot. Prodr.*
nominata est

ARUM *Brasilianum arborescens folio Sagittariae*, de-
buisse addi *aquaticum vel palustre.*

ARUM *palustre Brasilianum*, *Anonyma Theatr. Bra-*
sil. Menz. Ind.

AN hoc cum priori vel posteriori *Aningha* con-
veniat, an ab utraque differat hæreo, mallem
tamen affirmare postremum, ex eo quod *Menz-*
sius in elencho Autorum quorum nomina in Indi-
ce abbreviata continentur, asserat, in Theatro re-
rum naturalium Brasiliæ (quod in Bibliotheca Ele-
ctorali Brandenburgica asservatur) comprehendi eas
quos *Cl. Piso & Markgravius* nondum ediderunt.

ARISARUM *forma* Arum men-
titur sed partibus omnibus præcipue
flore & fructu minus & gracilius est,
hinc quoque nomen *αἰς* & *αἰδα* per di-
minutionem, seu ἵσθ herba *Aro* similis [pro
quo *αἰσαρον* inolevit] obtinuit. Quamvis
nonnulli dubitent an *αἰς* & *αἰσαρον* apud
priscos

perisicos unam eandemque plantam denotent.
Pediculis florum in plurimis speciebus nudis.
 Cæteræ notæ, quibus *Arifara* ab *Ano* & à
 se ipsis discrepent, id ex eorum cognomini-
 bus facile apparebit.

ARISARUM *Latifolium primum* Clusi. *Ari-
 sarum latifolium alterum* C. B. P. *Foliis longio-
 ribus.*

Hujus & *Arifari angustifolia* C. B. P. Synonyma
 à *Casp. Bauhino* in pinace, *Matthiolo* & *Ta-
 bernæ montano* tradita inter se non conveniunt. Dif-
 ferunt quoque scriptorum de hoc *Arifaro* ico-
 nes.

ARISARUM *Latifolium alterum* Clusi. *Ariforum
 latifolium majus* C. B. P. *Foliis rotundioribus &
 amplioribus.*

ARISARUM *palustre radice arundinacea.* *Dra-
 cunculus palustris sive radice arundinacea* C. B. P.

ARISARUM *angustifolium* Clusi. *Dioscoridis for-
 te.* C. B. P. *Ernstu alba.*

ARISARUM *cum flore Myconi angustifolium* Hist.
Lugd. *fructu rubro.*

ARISARUM *angustifolium aliud Promontorii magni*
Grisley Virid Lusit.

ARISARVM *Hercyniae Thalii.* Quid sit, igno-
ratur.

ARISARVM *foliis longis angustissimis gramineis*
flori succedentibus Mentz. Pugil. An *Arisarum*
gramineo folio promontorii magni Grisley Virid-
Lusit?

ARISARVM *angustifolium minimum* Bocconi.

ARISARVM *Potamogeti folio.* Boccon.

ARISARUM *triphyllum minus pene atrovubente*
Bannist. Cat. plant. Virgin. Raj. *Arum triphyl-*
lum minus pene atrovubente Virginianum Pluck.
Phyt.

ARISARVM *triphyllum pene viridi* Bannist. Cat.
plant. Virg. Raj.

ARISARVM *Dracontii foliis pene longo acuminato*
Bannist. Cat. plant. Virg. Raj.

ARI-

ARISARVM *fluitans pene nudo Virginianum* Bannist. Cat. Manusc. & *Arum Moschatum ophioglossoides pene nudo Jamaicense*. An melius *Ophioglossum Moschatum Jamaicense Limonii in extremo sinuatis* Pluck. Phyt.

COLOCASIA ab *Aro* distinguitur *Foliis* umbilicatis lævibus nullis maculis aut lituris infectis; *pediculis* non in extremo velut in *Aro* sed pene in folii medio, ubi umbilicus est, more *Cotyledonis* se inferente; *Floribus* nunc singulatim nunc pluribus ex uno folliculato pediculo egredientibus; *Stilo* intermedio *Aro* crassiori & breviori in tenuem mucronem gracilesciente.

COLOCASIA *strongylorrhiza* Alpin. Exot. *Arum maximum* quod vulgo *Colocasía* C. B. P. *pediculis viridantibus*.

COLOCASIA *strongylorrhiza Zeylanica* *pediculis & limbis foliorum atropuniceis*. *Arum maximum Ægyptiacum*, quod vulgo *Colocasía* *cauliculis nigricantibus Zeylanica*, Hort. Lugd. Bat.

A priori differt *pediculis & limbis foliorum* nunc puniceis nunc atropuniceis nunc prorsus atris.

COLOCASIÆ si non *Aro* subjiciendæ videntur tres species *Tajaoba Markgravii*, ut & quarta, quam *Piso* adjunxit. Hic quatuor hæc species, quod à Brasiliæ inter olera recipiantur, communi nomine *Brassicas* vocat singulorum tamen appellationes Brasiliæ usitatas apponens. Conjecturam juvat præter *foliorum* & *radicis* formam in iconibus expressam & *Colocasis* non adeo dissimilem descriptio tertæ speciei *Markgravii*, nempe quod *stos* sit longus constans unico *folio* per mediam longitudinem secto & velut in scapham excavato, ut & *stamine* cylindræo fastigiato, crassitie pennæ anserinæ, longitudinis paulo majoris duorum digitorum ac semis brevibus villis luteolis vestito. Sane folium illud longum in scapham excavatum & stamen fastigiatum non inepte cucullum cum pistillo referre videntur. Quatuor istas species, quod à Brasiliæ inter olera recipiantur, communi nomine *Brassicas* vocat *Piso* singularum tamen appellationes específicas Brasiliæ usitatas apponens. Quas nî conjectura me fallat sic appellari posse opinor:

COLOCASIA *Brasiliana lactescentis latifolia caule fusco. Tajaoba Pison. & Markgr.*

CO.

PARADISUS BATAVUS. 27

COLOCASIA *Brasilica lactescens latifolia caule viridi.* Mangaze petua Pison.

COLOCASIA *Brasiliana non lactescens sagittae foliis angustis.* Tajaobo vel Mangaza miri Pif.

COLOCASIA *Sylvestris radice caustica.* Tajaobo *Sylvestris.* Tajobaraon nonnullis Majara brava. Pison.

DRACONTIUM Dracunculus, Serpentaria, Colubrina, Dracunculus *polyphyllus* Arum *polyphyllum* Arum *dracunculinum* dictum, à cæteris hujus sortis differt potissimum *foliis* multifidis, profunde & varie infectis. Hujus species sequentes detectæ sunt.

DRACONTIVM *majus* Ger. Dracunculus *polyphyllus* C. B. P. Arum *polyphyllum* Dracunculus & Serpentaria dictum caule maculato *majus* & *elavus* Hort. Lugd. Bat. *Foliis viridantibus.*

DRACONTIVM *majus caule maculato foliis ex luteo variegatis* Hort. Reg. Par.

DRA-

DRACONTIUM *maius caule glauco immaculato.*
Dracunculus polyphyllus major Indicus serotinus
immaculato caule Hort. Reg. Par. Dracontium poly-
phyllum caule non maculato N. D. Hort. Lug. Bat.
Raj. Hist. Dracunculus polyphyllus alter medius cau-
le glauco nullis variegato coloribus, foliis vagi-
nulam nondum cruentatam cingentibus corollæ in-
star, Ari vulgaris flore. Jonqv. Hort. Arisa-
rum Serpentariae majoris folio viridi flavescente?
Horti Hermans. Jonq. Hort.

Ico quam autor *Hist. Lugd.* nomine *Dracunculi*
 sive *Serpentariae majoris* *Dod.* proponit non inepte
 referte videtur hoc *Dracontium*.

DRACONTIVM *caule immaculato minus &*
humilius. Arum polyphyllum Dracunculus & Ser-
pentariae dictum caule non maculato minus & hu-
milius Hort. Lugd. Bat.

Hujus *caulis* proceritate partim cubiti longitu-
 dinem excedit, *coloris* in glauco viridantis
 absque ullis maculis, Cætera *Dracontio* majori *Ger.*
 quod primum in ordine est, conveniunt. Viget
 in *Horto Lugduno-Batarvo* ex Gallus invecum.

DRA-

DRACONTIUM *Zeylanicum ramoso folio*
caule ex viridi & flavo variegato aspero.
 Kidaram Zeyl. *Serpentaria polyphylla* In-
dica caule maculato aspero Breyn. Prodr. 2.
Arum polyphyllum Dracontium & Ser-
pentaria dictum folio ramoso Pæonia in-
star caule aspero Zeylanicum Par. Bat. pr.
Arum polyphyllum Dracunculus & Ser-
pentaria dictum Ceylonicum caule aspero
cum maculis viridi fuscis & viridi dilu-
tis albicantibus pulchre notatum majus &
elatus Cornel. Cat. Hort. Med. Amst.
Mulen Schena Hort. Mal. part. 13. nondum
 editæ.

Huic non absimile genus in aggeribus & fossa-
 rum marginibus Insulæ Zeylan observavi.
 quod ob partium magnitudinem nominare libuit.

DRACONTIVM *Zeylanicum ramoso*
folio maximum.

Caules omnes trichotomi erant nempe in tres
 ramos & hi rursus in aliquot foliaceas alas di-
 visi, quas longuli & in margine sinuati fimbriati-
 M que

que lobi pinnata serie cingebant. Flor cœteris speciebus quidem brevior sed multo amplior & speciosior non in mucronem sed obtusam ambitum desinebat, parte media qua in latitudinem pandebatur quasi auriculatus, auriculis diversimode laciniatis & perpulchrè fimbriatis florem corollæ instar ambientibus. Color intensè purpurascebat albis hinc inde maculis & lituris undulato flexu varie ductis elegantissimè exornatus. Pistillus in flavescentem & densè congestam urvam exhibat, qui quo cœteris longitudine inferior eo quoque crassitudine superior erat.

DRACONTIVM *Zeylanicum* ramoso folio caule ex viridi & albo variegato levi. *Serpentaria polyphylla Indica* caule maculato levi Breyn. Prodr. 2. *Arum polyphyllum Dracontium* & *Serpentaria dictum* folio ramoso *Pœonia* instar caule levi Par. Bat. pr. *Arum polyphyllum Dracontulus* & *Serpentaria dictum Ceylonicum* caule glabro viridi diluto maculis albicantibus notato majus & elatius. COTT. Cat. Hort. Med. Amst. Schena Hort. Mal. part. 13. nondum editæ.

Valde

Valde congruis hæc planta descriptioni *Serpentaria majoris seu Dracunculi majoris* Lusitanis *Erva de St. Maria* dicti *Marckgr. & Pis.* Dubitationem tamen moveant *folia*, quæ plus quam *Hieracii* aut *Chondrillæ* folia exacta esse *Marckgravius* scripsit; Nostri autem *Dracontii* folia composita, verius decomposita sunt & ramosa pinnis seu lobis rarius laciniatis costas & ramos alarum instar amplexantibus. At vero ambiguitas tollitur, si integer ramus pro folio sumatur. Hic enim utique in pinnas seu lobos dissectus dici potest.

Ico quam *Piso* in posteriori editione sub prædicta appellatione exhibuit deprompta videtur ex *Historia Lugdun.* exhibens potius *Dracontium* quod in ordine nostro tertium est.

DRACONTIVM *Mexicanum.* HOGAXOCHIL *Hern.*

Hujus descriptionem *Hernandes* non attulit. *Fructus* non in caule qui folia fert, sed in singulari pediculo juxta caulem e radice egrediente pinguntur. *Caulis* abie in septena folia. *Radicem* Aro similem facit *Terentius*.

Huc subjicit quoque aliam speciem *Hernandes* nomine *Huica* seu *Mizmail* Dracontium quoad

picturam referentem , quæ si ex hujus familia sit vocari meretur.

DRACONTIUM *Mexicanum aromaticum.*

De hac planta dicit Terentius : *Aromatica est, cortice præsertim & fructu, caulis nitidus ad colorem tendit castaneum, folium septisariam partitum habet. Uva ex albo ad flavum tendit; admodum similis est majori Serpentaria si baccae essent rubrae.* Subdit tandem : *Monardes vocat Cassavi.* Ac vero *Cassavi* seu Americanorum panis de quo Monardes scripsit fit ex radice *Mandi*, *Marckgr.* & *Pison*, quæ ab *Hiuca* seu *Mizmaist* diversissima est, ut icones & descriptiones conferenti sponte apparebit. Interim dubitandum non est, quin ex hujus quoque plantæ radice *Cassavi* apud Mexicanos paratur, tum quod eodem nomine scilicet *Hiucca* seu *Tucca*, quo Mexicani *Cassavi* seu panem ex radicibus paratum exprimunt, vocetur, tum quod ex omnibus *Dracontii Colocasie* & hujus sortis radicibus simile quid *cassavi* vices supplens conficiatur. Hanc ob rem sequens *Dracontium Rumphal* *Marth.* à Joseph vulgo *Ignome* (*Igname*, *Inhame*, quæ vox radicem esui aptam denotat, appellatur. Visum est nobis vocare.

DRA-

p. 93



ARUM
polyphyllum
caule scabro
puncante etc.

DRACONTIVM *Oriente folio quinquifido. Rumphal Matth. à Joseph. & Confal Vincent. Zan. Hist. Bot. Arum Indicum Rumphal dictum Raj. Hist.*

D*racontis* Zeylanicis ramoso folio adjungendum est *Dracontium Americanum*, quod laudabili cura Strenui & nullis sumptibus parcentis Viri Simonis a Beaumont ex Surinama in Belgium inductum est, dictum

DRACONTIUM *Americanum scabro puniceo caule radice Cyclaminis. Arum Surinamense caule atrovubente & eleganter variegato Hort. Beaumont. Cat. Arum polyphyllum Dracontium dictum caule scabro punicante Surinamense Par. Bat. Prodr.*

H*ujus caulis*, qui innumeris è nigro puniceis parvis tuberculis exasperatus & intermicantibus albis maculis pulcherrimè expictus est, squamosum & versicolor angustum corpus apposite repræsentat. Profurgit ad altitudinem cubiti nunc simplex nunc statim ab exortu bipartitus, pollicem crassus, vertice in tres nonnunquam in quatuor partito *frondes*, qui in quinque aut sex alios minores subdivisi & ad costas lucidis atrovirentibus

bus foliis Dracunculo vulgari minoribus, inaequaliter factis absque petiolo alarum instar vestiti sunt. Caulis elanguescente, altera radice parte egreditur cucullus totus nigricans coeterisque speciebus longe contractior crasso brevique pediculo fultus involvens concolorem pistillum crassitudine duos pollices longitudine vix semidigitum adaequantem qui quaquaversum crassiusculis puniceis staminulis in angustissima colossina quasi plumosa foliola fasciculis ornatus est. Radix subest tuberosa in fusco punicea forma & magnitudine *Cyclaminis*, multis ad ambitum tophis obsita eaque parte qua cucullus emergit aliquot in longum porrectas fibras demittens. De fructibus nihil habeo compertum. An hoc sit *Arum triphyllum*, *Dracunculus* & *Serpentaria dictum ex Surinama caule atro rubente*. Comel Bat. Hort. Med. Amst. affirmare vix audeo. Illud affirmo, quod, dum *Dracontium* nostrum pullulare incipit, caulium extremitates primum in tres ramos quasi totidem folia findantur, postmodum in quatuor rarius plures dividantur.

DRACONTIUM *Zeylanicum spinosum Polypodii foliis radice repente.*

Radice & pediculorum quibus flos & folia nuntur, aculeato habitu, *Ara* Zeylanico spinoso

p. 95.

ASTER novæ Angliæ
Linariæ folius chamæmeli
floribus.



noso superius proposito convenit, Gaudet quoque consimilibus natalibus & virtute. *Folia* vero pinnata sunt instar *Polypodii* insecta, sed multo ampliora. *Florem* conspiciere non licuit, *Arum* verò supra dicto haud disparem esse vel consimilem praestitulus qui velut *arum* istud in *avam* terminatur confirmare videtur.

ASTER *Novae Angliae Linaria foliis Chamaemeli floribus.* Aster Americanus multiflorus flore albo bellidis disco luteo DN. de Plin. Schol. Baë. Hort. Reg. Par. Tournefortii & Plukenetii Phytograph. Aster Virginianus frutescens minor ericoides, linaria folio flore albo parvo Breynj. Prod. 2.

Crescunt ex radice vivaci, quæ ex innumeris tenuissimis repentibus fibris capillata est, folia per initia numerosa glabra saturate viridia angusta *Linaria* æmula digitum longa & in macronem extenuata, quæ dum flores apparere incipiunt marcescunt & penitus disparent. Inter ea attolluntur caules altitudinis plusquam sesquicubitalis crassitie calamum scriptorium adæquantes nonnunquam excedentes denique propemodum lignosif,

si, annis tamen singulis intercidentes. Hi dividuntur in multiplices ramos maxime circa summitates in quibus tanta copia luxuriant, ut integram sylvam constituere videantur. *Folia* quæ de more *Asterum* absque petiolis alterna serie caulibus hærent magnitudine & dispositione insigniter discrepant. Ima namque & quo terræ propiora, còlatoria productiora & longius ab invicem distita sunt, remotiora vero & quæ ramulorum cacumina vestiunt densius congesta contractiora *Ericæ*que foliis simillima apparent. Apices ramulorum singuli exeunt in longula squamosa capitula, quæ se in florem pandunt *Bellidi* sylvestri minori verius *Chamæmelo* similem petalis scilicet albis & intermedio flavescente orbiculo in papposum *semen* faciscente.

Patriam, culturam, indolem & florendi tempus cum *Astere* superiori habet commune. Uterque vero in florentissimo horto laudatissimæ Domini de Block primum educatus est.

ASTER *Novæ Angliæ purpureus Virgæ aureæ facie*
& *foliis undulatis.*

Eo quod hujus plantæ flores in prolixas spicas velutque jubar longa densissimæque serie congesti

ASTER
Virga aurea Jacq
folius undulatis.



gusti sunt, dubitavi an ad *Asteris* an *Virgas aureas* reducenda esset, est cum flores præcipuis non ad *Asteris* propius quam *Virgas aureas* accedere videbantur, libuit prius eligere & hanc *Asterem* cognominato *Virga aurea* appellare.

Radix habet vivacem & repentem, ex cinereo in fuscum tendente fibratam, è qua exeunt cauliculi complures sesquipediales & certe majores duriusculi infra leviter purpurascens in progressu vero viridantes, crebros ramos de se spargentes. *Folia* pallidula sunt, undulata, elata cordata basi in modicum acumen desinentia. *Ima*, quæ primis æstatis caloribus è radice proficiscuntur, longis sulcatis petiolis insistent, & magnitudine *Asterem* latifolium autumnalem *Corvini* quadantenus æquant, est rotundiuscula sunt, subhisclata & in ambitu levissimè crenata: Cætera multo minora sunt asperiuscula rigida ad margines integra atque cauliculis sine ullis petiolis perfoliata instar juncta. Cultura operosa quidem non indiget hic *Aster* sed per radicum excrescentias velut superior conterraneus ejus propagatur, tamen naturæ tenerioris est & hyeme, acrius stringente bruma, stragulis contegendus est, ut subsequente æstate numerosiore prole repululet. Sub finem Septembris fastigiantur caules in *spicas* dograntæ nunc longiores nunc breviores quos

pulchrâ numerosâque serie exornant *flores* prominulo in ruffo flavesciente disco purpureisque radius *Asteri* Tripolii flore adeo consimiles ut sola parvitate ab his discriminentur. Superiores tum dehiscent, inferiores languescunt velut in plerisque floribus spicis usu venit. Discus resolvitur in pappum e pallido paulisper rufescentem.

ASTER *Novæ Angliæ altissimus hirsutus floribus amplissimis purpuro-violaceis.* Aster *Novæ Angliæ hirsutus floribus majoribus saturate violaceis* Dominæ de Flines. Turnef. Schol. Bot. Hort. Reg. Paris.

Quanvis hoc *Asteris* genus floream suam commam serius & longe post æquinoctium autumnii apud nos explicare incipiat, ob *florum* tamen amplitudinem & venustatem coeteris suæ sortis minime postponendum est. Hi namque inopiam hybernorum florum supplentes, in caulium ramorumque fastigiis eo numero & serie disponuntur, ut non simplices flores, sed artificiose contextum fasciculum mentiri videantur. Constructi sunt ex prominulo flavesciente umbone numerosisque longulis petalis in orbem diradiatis violacco colore splendidissime purpurascantibus. *Caulis hominis*

ASTER
Novæ Angliæ
altissimus
hirsutus etc.



minus proceritatem superant rarisque lanuginosis pilis præcipue parte inferiori pubescunt, & à medio ad summum usque in complures ramos quorum supremi brevissimi sunt se expandunt. His circumstant *folia* mollia undulata sesquidigitum longa pallide virentia è latiuscula auriculata sede in mucronem gracilescuntia quorum auriculæ ita inter se connivent, ut eminus conspicienti à caulibus perfecta videantur. *Radix* vivax est, ex crebris fibris ab uno capite descendentibus & in longum sparsis compacta, annisque singulis folia & caules, quæ duo hyeme intercidunt, renovans. *Semina* velut in reliquis hujus familiæ pappescunt. Brumam rigidiores innoxie tolerat & licet per radicum soboles avulsas in quovis solo prompte multiplicetur, lætius tamen multo adolescit, floresque plenius & maturius perficit, si loco horti solis meridiani radiis exposito implantetur.

Hic *Aster*, semine ex nova Anglia illato, primum educatus est a DOMINA *Agneta de Block*, SPECTATISSIMI DOMINI *Sybrandi de Flines* conjugæ honestissima, stirpium omnium imprimis exoticarum cultrice & indagatrice sine exemplo studiosissima, cujus eximia liberalitate postmodum in aliorum hortos transiit.

Consimilem ortum sibi vendicat quoque sequens

varietas, caulium proceritate florum colore & dispositione priori simillima, despectens tantum ramis in catulis rarioribus; foliis angustioribus & mollius undulatis, auriculis amplioribus altiusque insertis & floribus paulo minoribus.

ASTER *Nova Anglia altissimus hirsutus alter, floribus nonnihil minoribus.*

ATRIPLEX *Argentea dentata Corassioidea.*

Plantæ quas *Atriplices* vocant Herbarii, in duobus summâ genera distribui possunt. Utrique post floris staminei herbaceique exanthesi *femen* quidem singulare est, sed duobus modis dispositum. *Senecio* enim prioris generis involvitur tenuissima pellicula tanquam exiguo subrotundo rugoso & anguloso vasculo in summo aperto; posterioris vero reconditur intra duo conniventia foliola depressam quasi theculam monstrantia.

Cum *Atriplice* mîscet nonnulli scriptorum geminas quasdam species *Blii*, hæcque rursus confundunt cum legitimis *Amaranthis* non capientes genericas harum plantarum notas esse diversas. *Blium* enim post herbacei stamineique floris defluxum perficit *femen* unicum in vasculo oblonge acumini-



ATRIPLEX
Argentea dentata.

minato orbiculatam sicut Botani loquuntur horizontaliter in duas partes dissiliente, *Amaranthus* autem post florem pentapetaloidem stamineo affinem, consimile fert vasculum aut *seminibus* pluribus & plerumque quaternis refertum, uti supra in expositione *Amaranthoidum* indicatum est.

Ad *Atriplicem* prioris generis pertinet hæc Americana, quam nunc describendam suscepimus. Tota *Halimi* instar candicat, & quasi argenteo splendente polline conspersa ad solem lucet. Pingui & apposito solo insita ad duorum pedum altitudinem adolescit crebris brachiata *ramis* adeo infirmis, ut plerumque resupina procumbant & humi fundantur. *Folia* atriplicem odoratam *Botris* dictam quadrantenis æmulantur, ad ambitum scilicet dentata sinuata & nonnihil undata. *Flosculi* staminei sunt herbacei perexigui nudis oculis vix conspicui, conferti velut in brevissimis racemulis, qui summo caule & ramulis è foliorum sede egrediuntur. Hos sequuntur *semina* minutissima tenuissimis rogos vasculi pelliculis pro congenerum more recta. *Radix* pallida est aliquot fibris capillata & annua, quæ è delapsis feminibus annuatim sese renovat. *Odore & sapore* malotoso coeteris suæ sortis respondet. Nec dubitandum est quum conveniat quoque facultatibus. Legimus in Horto Fagehano.

Huc pertinet.

ATRIPLEX *Americana*, lanuginosa foliis pbylli, seu *Origanum incanum*, iconem *Pluckenetius* in *Tab. 75.* proposuit sub nomine *Amaranthi Indici verticillati albi Origanum foliis lanugine incanis.*

BALSAMINÆ nomine duo genera inter se diversa a Botanologis proponuntur. **PRIMUM** Pomiferum est, & scandens; *Viticulis* claviculatis; *Folius* alternis vel integris, vel lobatis, lobis nunc magis nunc minus profundis, *Floribus* in quinque plerumque segmenta uniformi divisus; *Fructibus* vel majoribus cucumerinis vel minoribus baccarum instar, utrisque vel levibus vel verrucosis scabris aut hirsutis; *Seminibus* magnitudine forma & dispositione varis. **ALTERUM** capsulatum est & non scandens; *Capsulis* communiter pentagonis per maturitatem, in totidem partes sese contorquentes, dissiliantibus, *Seminibus* subrotundis; *Floribus* monopetalis difformibus, antérieur rictum posterius calcar habentibus; *Caulibus* erectis, *Folius* integris, in margine crenatis, vel alternis vel conjugatis.

PRIORIS GENERIS SPECIES duodecim
repe-

teperiuntur apud auctores prima *Balsamina rotundifolia repens* seu *Mas*; a Bauhino in Pinace. Ab aliis *Cucumis puniceus*. *Balsamina cucumerina*. *Momordica* &c: dicitur, cujus fructus vel puriolus est vel ex luteo rubescit. Reliquæ undecim sub nomenclaturis Malabaricis exhibentur in *Horti Malabarici parte octava*, quibus intersunt tres species in *Horti Lugduno Batavi Catalogo & Paradisi Batavi Prodomo* propositæ, duæ nimirum sub nomine *Cucumeris puniceæ Indici majoris & minoris*, Tertia verò sub appellatione *Bryonia Zeylanica foliis asperis profunde laciniatis*, quæ forsitan rectius vocanda est *Balsamina scandens* seu *Momordica Indica Bryonioides fructu levi minori rubro albis lineis virgato*. Zeylanensibus *Basangilli* dicitur.

His deciman tertiam subtexemus dictam.

BALSAMINA *Scandens* seu *Momordica Indica foetida Bryonioides fructu levi majori rubro*. Kopalani Zeyl.

Ex hujus radice exeunt tres pluresve viticulæ prælongæ claviculatae congenerum more vicina statumina involventes, angulosæ nonnihil lignosæ & nodosæ, nodis quasi in tubera excrecentibus & ubi terram attingunt novas radices agentibus.

Foliis

Foliis ornatur *Balsamina* mari *C. Baub.* similibus, sed amplioribus in longiora angustiora & profundiora sementa divisis, atroviridibus & subinde pallidis maculis infectis. Majores quoque sunt flores quinque farinam secti flavescentes, *calici* parvo, in quinque angusta setacea foliola desinente, insidentes. Hos excipiunt fructus glabri nitide rubentes teretes semidigitum longi pollicem crassi, in quorum pulpa continentur *semina* oblonga lurida, quadruplici serie secundum longitudinem disposita. *Radix* lignosa vivax & albida est nunc simplex nunc bipartita ac velut *Bryonia* saepe rapacea crassitie, modo summo telluri obliquo ductu harena, modo alius terræ impacta. Uti *sapore* acri amaro ingrato odoreque viroso imo etiam toto fere habitu ad *Bryoniam* accedit; sic quoque virtute cathartica ab hac non multum discrepat. Sed cum tardius & summa cum violentia operatur, inter venena reponitur à Zeylanensibus. Locus sordidis umbrosis ad macerias & parietinas frequens occurrit in Malabara & insula Zeylan. solum Belgicum valde pere averfatur. Nisi enim in Hypocaustis solite colatur, facile marcescit & interit.

POSTERIORIS GENERIS SPECIES novem innotuerunt; prima est *Balsamina Foemina* *C. B. Pin.* *Floris* vel candido vel incarnato vel excandido

BALSAMINA

Termina Zeylanica
angustifolia.



dido & *rubro variegato punctatoque*; *Setunda est Balsamina lutea*, seu *Noli me tangere C. B. Pin. Flore vel luteo vel pallido.* Cæteras sex exhibet *Horti Malabarici pars nona* sub nominibus *Onapu.* Nonam nos adjungimus, indicatam:

BALSAMINA *Erecta seu femina*, *Persica angustifolia Zeylanica.* *Dijakudalu Zeyl.*

Hæc nomen accepit à *Dija* aqua & *Kudalu* hiru-
dine, quasi diceretur hiru-dinaria aquatica.
Primum enim locis irriguis & paludosis nasci amat,
deinde hiru-dines vel plantæ hujus folus insidere so-
lent, vel seminalium capsularum formam qua-
dantenus referre videntur. Facie simillima est *Bal-
saminæ Faminæ C. B. P.* At *folia* sunt angustiora
& longiora; *Flores* minores rubello elegantissimo
colore nitentes; conceptacula minora & glabra.
Seminibus strato prægnanti insitis facile quidem ado-
lescit; sed sub nostro climate hætenus ad frugem
non pervenit. Mox enim autumnii initio, post-
quam vix unum alterumve florem concepit, nullo
subsequente fructu, exaruit. Huc referendæ sunt
tres species *Balsaminæ faminæ Indicæ Breyni in prodr.*
1. nempe flore albo, flore purpureo foliosiore, & flore
purpureo fructu hiru-dinis facie, nam *Zeylanicæ* no-
stræ varietates, neutiquam species diversæ sunt.

BETONICA *Maxima Scrophularia folio, floribus incarnatis*

Ad quinque pluriumve pedum proceritatem assurgit *caulibus* quadrangulis geniculatis glabris & instar *Scrophularia* radice nodosa, atropurpureascentibus, cui & *folia* quadantenus similia sunt, utrinque ex adverso posita rugosa mucronata, una parte viridia, altera pallidula, è geniculis exeunt rami, utrinque unus, quorum summitatibus spicatè denseque verticillata serie circumstant *flores* pallidè incarnati. Hi e galea bifida, labello auriculato & aliquot apiculatis staminibus constructi sunt. Singulis verticillis interponuntur parva foliola, sed ab iis quæ ramis & caulibus hærent diversa, minora nempe glabra tenuia acuminata nonnunquam pallidula & in ambitu rubentia. Tandem succedunt *semina* quaterna parva teretia fusca in caliculis quinquifidis oblongis. *Radix* numerosis albidis & in longum protensis fibramentis constat atque ad tertium quartumve annum perennat. Magna autem cura curari non postulat, quia in quovis Solo feliciter germinat, & e delapsis seminibus sese propagat. *Sapor* subacris & aromaticus, *odor* graviusculus subacutus inter mentham & lamium medius. *Semina* a CL. Do. Roberto Bora-



BETONICA maxima
Scrophularia folio.



BRYONIA cretica
fl. luteo fructu rubro.

Botanico Oxoniensi accepimus, ubi locorum sponte nascatur non constat. Quæ in SCHOLA BOTANICA HORTI REGII PAR. sub nomine *Betonica maxime scrophulariæ folio, flore e luteo pallescente* dicitur, vel eadem est, vel à nostra tantum floris colore differt.

BRYONIA *Africana laciniata tuberosa radice, floribus herbaceis.*

BRYONIA *Africana laciniata, tuberosa radice, floribus luteis.*


UTraque mihi enata est seminibus ad promontorium Bonæ Spei collectis. Priori radix est rotunda pugni magnitudine *Rhaphani* instar, albida, paucis fibris prædita, una parte duas, tresve appendices quasi totidem novas radices promens. E summo capite mittit *flagella* longa capreolata tenera nodosa glabra ramosa quæ congenerum more obvia scandunt seseque iis involvunt. His *folia* hærent alterna glabra lucida in aliquot lacinias profunde secta. *Flosculi* e quinque herbaceis segmentis totidemque crocatis staminulis constant; singuli insistent singularibus tenuibus petiolis, in quos pediculus qui ad alas emergit, divisus est. Qui fertiles sunt

subjectum habent capitulum futuri fructus primordium, quod e marcidis flosculis abit in baccam insigniter rubentem pisi majoris magnitudine includentem quatuor acinos fuscis oblongo rotundos. In hypocaustis asservata perpetuo viret.

Huic non absimilis est posterior, proferens viticulas quadrangulas, *Folia* crassiuscula pingua in tres aut quinque sinuatos dissecta lobos, *Flores* paulo majores singulares luteolos. *Fructus* nondum perfecit licet copiose floruerit. *Semina* verò e quibus adolevit forma & magnitudine seminibus *Cardui Marie* similia erant, coloris fusci, maxime splendentis. Utraque in hypocaustis asservata perpetuo viret. Facultate purgandi a *Bryonia* nigra vix aut nihil differre consimilis *sapor* prænuntiare videtur.

BRYONIOIDES *Canadensis villosa fructu monosperma.*

NOVUM hoc plantæ genus *Bryonioidis* appellatione indigitavimus, eo quod crescendi modo, *caulibus* nempe scandentibus, *foliis* angulosis, *floribus* herbaceis & ni fallamur purgandi quoque virtute *Bryonia alba* valde simile sit, solis fructibus & radicibus exceptis. Namque fibrosa est *radix*
ultra



ultra citroque per terram reptans , albida & summa parte in parvum veluti capitulum extuberans : *Flagella* longissima tenuia capreolata pilosa in multos ramos divisa & multiplici reptatu quibuscvis obviis sese intorquentia : *Folia* Bryoniae albæ foliorum æmula texturæ gracilioris & coloris in viridi dilutioris. *Flores* longulis pilosis pediculis e foliorum alis egredientibus insident *Bryoniæ albæ* colore textura & dispositione prorsus similis. Singulis, qui fertiles sunt , subjiciuntur fructus singuli , *amygdaliformes* propemodum magnitudine. Hi virides sunt continentes sub scabra crassiuscula carnosâ cute, undique rigidis villis quasi aculeis vestita , *semen* unicum depressum *Citrulli* semine paulo minus foris fuscum , intus candidum & in apice duabus vix apparentibus eminentiis donatum ut *Cucurbitæ* genus esse diceres. Annua est hæc planta , quæ ex decisis seminibus quotannis regerminat ea sæpe luxuria ut nisi soboles sedulo evellantur & rami maturius præcidantur, facto incremento vicinas stirpes irretiat & strangulet. *Sapor* percipitur acris amarus nauseosus *Bryoniæ albæ* similis. Huic quoque virtute purgandi forsân non dissimilis est.

E Canada delata est ad *Clarissimum Tournesortium* à cujus munificentia nos recepinus.

CAPRARIA *Corassavica Cavritta Lu-*
sit.

EO quod in Corassavia insula hâc planta pascantur capræ velut in Europâ ex fruticum ramis, Lusitanis *Cavritta*, quod latinis *Capraria* sonat, indicta est. *Folia* quæ primis æstatis caloribus e radice pullulant in orbem congesta sunt, *Agerati* folius paria, longiora tamen, profundius ferrata & obscurius virentia. Inter ea fruticant tres pluresve *caules* ramosi sesquicubitum & amplius alti, quos alterno ordine ambiunt *folia*, iis quæ ad radicem sunt multo minora. Ex singulis fernæ alis ab imis ramis ad apicem usque egrediuntur parvi quinquifidi caliculi bini ternive, interdum unicus & ex his *flores* oblongi candidi in quinque segmenta divisi. His marcescentibus succedunt *semina* parva, cineracea in conceptaculis oblongis nonnihil deprellis quæ primùm in duas postmodum in quatuor partes quasi totidem carinata foliola dissiliunt. *Radix* crassioribus & albo pallentibus fibris summan tellurem perreptantibus constat. Ea licet sit fertilitate hæc planta, ut per furculos ramulos & decidua semina sine multo labore propagetur, tamen auram rigidam geli-

p. 110.



CAPRARIA
Corallavica

p. III.



CARYOPHYLLATA
Virginiana alba

р.и.



CAUCALIS.
Daucoides

gelidamve perpeti nesciens, hyeme in hypocauftis, æstate locis soli expositis & ab injuriis cœli tutis custodiri expedit. *Sapor herbaceus, odor omnino nullus est.*

CARYOPHYLLATA *Virginiana alba, flore minore radice inodora.* Hort. Lugd. Bat.

C*aryophyllata* hujus facies quamvis ex descriptione in *Hort. Lugd. Bat.* Catalogo tradita facile cognosci possit, atque etiam à vulgari non multum discrepet; nihilominus ejus iconem a nemine hætenus editam in gratiam Botanophylorum exhibere visum est. Culta in hortis æque luxuriat ac vulgaris, hyemisque frigus innoxie tolerat.

CAUCALIS *Major Daucoides Tingitana* Moris.

D*aucoides* cognominata est hæc *Caucalis*, quod toto habitu *Daucum sativum* seu *Pastinacam tenuifoliam* referat, seminibus exceptis quæ in hac majora, crassiora, & longioribus aculeis armata. Ejus historiam tractavit *Morisonus* in plantarum umbelliferarum distributione nova, idcirco iconem tantum in præsentī tabella exhibendam & lectorem ad accuratam *Morisoni* descriptionem pag. 65. relegandum duximus.

CE.

CEREI, insolitæ & mirabilis structuræ stirpes, a funalis redæ effigie ita dicti, *Opuntis* seu Ficubus Indicis congenere sunt. Id florum fructuumque forma & dispositio facile evincunt. In Americæ insulis (borealibus exceptis) tanta sæpe frequentia reperiuntur, ut integras quasi sylvas constituere videantur. Quo loci non è terra tantum sed & arboribus, lignis putridis, ipsisque rupium interventus progerminant; Neque sub nostro cælo culturam renuunt. Nam per semina & ramosæque feliciter propagantur ac *Opuntia*, & velut hæ in fistilibus loco calido & per hyemem absque ulla fere rigatione in hypocaustis curari postulant.

Caules faciunt prælongos crassitudinis ab imo ad summum usque fere æqualis nunc simplices nunc in medio aut mox a radice multifidos, aliquotcostis, recta excurrentibus, præditas. Harum anguli, *Foliorum* loco armantur minacibus spinis, Octonis, novenis aut pluribus ab uno centro radiatim sese exferentibus.

Cute teguntur carnosæ, intus torulo, per ætatem ligneo farcti. *Fructus* qui vel intra ipsas spinas vel paulo infra eas oriuntur magnitudine colore & forma distincti sunt, singuli tamen fructum *Opuntia* referunt & in molli dulcique carne multa granula continent. Nec *Opuntia* dissimiles sunt

sunt *flores*. Hi enim fructuum rudimentis insidentes ex oblongo crassoque collo in amplum ambirum terminantur. Petalis constant plurimis numero incertis, quorum inferiora basin floris strictius ambiunt, eamque veluti squamæ congregunt; Summa verò rosæ instar in orbem laxantur. Nituntur *radicibus* pro stupis magnitudine admodum parvis, lignosis albidis in crassiusculas paucas fibras divisis. Cum primum è semine pullulant, emittunt muscosum & in orbem conglobarum tomentum, (araneosam telam in se convolutam dices,) sub quo costarum & spinarum primordia non injucundo spectaculo delitescunt. Harum septem species ex America in Belgium illatæ sunt. quatuor majores & erectæ & tres minores & scandentes seu procumbentes, quanquam quinta nonnunquam erecta conspiciatur. prima audit.

CEREUS *erectus maximus fructu spinoso rubro.*

Dadus

Hujus *truncus* mox ab exortu multifidus raro simplex crassitie femur, proceritate quindécim pluresve cubitos superat; & circa summitem quasi in oblongum caput protuberat Costis
P con-

constat octonis interdum denis, armatis rotidem spinis ex uno centro prodeuntibus, validis sed brevibus quarum longissima vix unciam excedit. *Flores* è viridi pallidè flavescente dicuntur. *Fructus* pugni magnitudine rotundi & Spinis muniti insigni rubro nitent, quem colorem quoque sicci retinent; Horum concolor caro continet *semina* parva oblonga nigra. Qui in Paradisi Bat. prodr. *Cristatus Beaumontianus* appellatur, *Cerei* hujus varietas est, cacumen habens compressum & velut bifida crista coronatum. Spectatur in Horto laudatissimi *Beaumontii*, unde cognomen accepit. Altera est.

CEREUS *erectus fructu rubro non spinoso.*

Hastas erigit priori conformes, ast angulosiores & spinosiores, spinis junioribus præcipue ad exortum rara rufescente lanugine pubescentibus. Consimiles quoque sunt *Flores*. *Fructus* magnitudine & forma ovum gallinaceum referunt, spinisque carent, superficies rubet, caro in viridi languet, *Semina* nigricant. Hic idem videtur quem *Nierembergius* in *Historia naturæ* sub nomine *Cerei spinosi*, *Bauhini* in *pinace Cerei peruviani spinosi fructu rubro natis magni-*

p. 15

CEREUS
*erectus fructu rubro
non spinoso.*



gnitudine & Stapelius in notis ad Theophrastum *Euphorbii adultæ plantæ* sive *Cerei effigie* Lob. proponunt. In Catalogo Horti Lugduno Batavi nominatur *Ficoides seu Ficus Americana Cerei effigie spinosa & angulosa*. Tertia indicta est.

CEREUS *erectus fructu rubro non spinoso lanuginosus.*

A præcedenti differt potissimum colore glauco & copiosiori lanugine, quæ ad trunci fastigium inter spinas apparet. *Flores* herbacei coloris sunt, *Fructus* magnitudine nucem juglandem adæquant, extus rubri, intus viridantes *Seminibus* nigris pleni. Hujus *Cerei* varietates duæ observantur in Horto Beaumontiano. Prioris lanugo flavescit, Alterius vero ex albo pallescit. An *Cereus* in ordine nostro secundus hujus tertii varietas sit, an vero species distincta, determinare vix audeo, propenderem tamen in partem affirmantem, quia fructus sicci nihil inter se videbantur differre. Tertius hic *Cereus* in *Parad. Bat. prodr.* ordine quintus est, cujus nomenclatura ibidem proposita corrigenda est. Quarta vocatur.

CEREUS *erectus altissimus Surinamensis.*

Hujus truncum ultra quadraginta cubitorum altitudinem attolli, asserunt ex Surinama reduces. Ante octodecim annos Surculum vix palmum altum CL. meus prædecessor *Arnoldus Syenius* in Hortum Academicum Lugduno-Batavum transtulit, qui jam in eam amplitudinem adolevit, ut crassitie brachium & proceritate septendecim cubita superet, vestigiis incrementi, quod singulis annis accessit, in superficie trunci remanentibus, Rectus est & simplex non ramosus costis in imo quinis mox octonis & summum versus denis præditus. quarum extrema ab radice ad cacumen usque armantur spinis, octo decemve ex uno centro egredientibus, ast brevioribus quàm in antecedentibus. Anno M. DC. LXXXI. unum atque alterum protulit *florem*; Biennio vero post, cum æstas fervidior esset, Julio mense viginti septem edidit. Hi ad costarum extrema fere in medio trunci nunc intra spinas nunc juxta eas exhibant effigieque tubum in amplum orificium sese laxantem referebant. Tubus carnosus erat viridis rotundus striatus & orificium versus quasi squamatus, squamis tamen à se mutuo non sece-

secedentibus, crassitie pollicem, longitudine digitorum cum semisse implebat, ad summam oram verò, ubi in petala se explicabat, Rosæ majoris amplitudinem excedebat. Petala numeravi quadraginta quatuor, quorum interiora candida & ad extremum ambitum in aliquot crenas secta erant, exteriora vero in viridi obsoleto purpureo colore pallebant. Ex umbilico horum multa candida capitata staminula coronæ specie in orbem fusa prodibant, in quorum medio alia sedecim aut septendecim absque capitulis flavescente farina aspersa, quæ crassiusculo Stylo ab imo tubi, ubi fructus incipit, oriundo, procedebant. *Flores* una cum *fructibus* quibus insidebant & arcte coherebant eodem die quo se aperuerant defluebant. *Opuntis* autem similes videbantur fructus. Nam horum rudimenta multis *granulis* referta, viridia erant, spinisque destituta. Quinta nominatur.


CEREUS *Erectus minor fructu spinoso, costarum numero varians.* Colebre de Spine Hisp.

HUjus *caules* minores sunt quam præcedentis duos tresve pollices in ambitu crassi. Costarum numero variant primum tres postmodum

quatuor & quinque in uno eodemque caule observavi. Spinarum agmina longius invicem dissident, spinis productionibus & tenuioribus communiter quinis juxta se positis. *Flos* è viridi pallet. *Fructus* rotundus spinosus. *Semina* masculula. Hic in Paradisi Batavi prodromo *Cereus erectus Curassavicus tetragonus articulatus* appellatur; Ast verè articulatus non est; Sed caulis fastigio, dum augetur & succrescit, novus caulis, nexu quasi articulo junctus, videtur accessisse. Sexta est

CEREUS Scandens minor trigonus articulatus fructu suavissimo.

CAulibus exit prælongis in ambitu tres pollices crassis, ramosis, articulatis, flexuosis, humi reptantibus aut, si adminicula inveniant haderæ more ascendentibus. Hi ternas acutas costas quinque vel sex parvis aculeis velut præcedentes armatas habent. Articuli quibus caules coagmentantur in patrio solo vix palmum longitudine attingunt; In hypocaustis vero vitreis sub nostro cælo pedem nonnunquam superant. Ex omni ferè parte præcipue intra canaliculos sive sulcos emittunt longas pallentes fibras, quæ vel in terram demittuntur, vel arborum quas scandunt scissuris veluti claviculi se



CEREUS
Scandens minor
articularis

se insinuant illaqueantque. In floribus siccis quinque tantum petala e viridi pallentia numeravi. Reduces ex America asserunt, fructum appellari *Pythahaya*, intus & extra elegantissime rubere, magnitudine *aurantiam* æquare & ob suavissimum acidum dulcem saporem in deliciis haberi. Eadem fere de *Pythahaya* refert *Nierenbergius* in c. 80. l. 14. *Hist. Nat. Addit de Laet* c. 12. l. 19. *Descr. Ind. occid.* quod comestus fructus urinam tingat colore plane sanguineo, sine noxa tamen. Nomine *Cerei peruviani amplexicaulis articulati fructu rotundo maximo coccineo* extat in *Parad. Bat. Prodr.* *Bauh.* in *Pinace* vocatur *Cardus spinosissimus brachiatus ex Hispaniola.*

Huc valde simile est *JAMACARU* 1. *Pison.* *Pluckenetius* in *Phytogr. Tab. 29.* plane idem esse censet; Ast dubium inter alia injicit fructus pulpa. Hanc *Piso* candidissimam esse scripsit. Nostri *Cerei* fructum intus & extus elegantissime rubere accepimus. Laudatus *Pluckenetius* l. 6. *Cerei* hujus iconem sub appellatione *Ficoidis Americani* seu *Cerei erecti cristati foliis triangularibus profundè canaliculatis* proposuit. Nos cristatum hæcenus non observavimus.

An *Cardus Pitahaya* Americanorum cujus fructus iconem *Parkinsonius* ex *Oviedo* exhibuit cum

nostro *Cereo* conveniat, iis decernendum relinquo, quibus fructum vidisse contigit.

Similis etiam species huc invec̃ta est ex insula St. Crucis nomine *Pythahaya Simeron* hoc est *Pythahaya* sylvestris. Facie vero a priori diversa non erat. Sed differentiam in fructus sapore minus suavi consistere perhibebant qui huc attulerant. Septima appellatur.

CEREUS *Scandens minor polygonus articulatus.*

Crescendi modo similis est præcedenti, proferens *caules* prælongos articulatos flexuosos ramosos & radicosos, digitum crassos, multis costis, (nonnunquam quindecim numeravi) totidemque brevissimis & tenuissimis spinulis armatis præditos. De *flore* & *fructu* nihil mihi constat. Idem minimus articulatus ex vera cruce *Par. Bat. Prodr.* ab hoc *cereo* nullatenus differt.

Ad *Cereorum* familiam pertinet quoque planta Mexicana quam ex *Rechio Job. Terentius* Lynceus proposuit nomine *Raub cuetz placuitlapilli.*

CH A-

CHAMÆCISTUS *Americana Portulacæ folio ; flore albo.* *Portulaca Americana seu Corassavica latifolia , erecta floribus albis.* Par. Bat. pr.

CUbitali altitudine assurgit, *caule* inæquali, tereti, glabro, succoso, frequentibus inconditis ramis distincto. Hos vestiunt *folia* crassiuscula ex angusto principio in obtusam latitudinem, se laxantia, sativæ *portulacæ* proxima, at paulo ampliora & succo aqueo insipido plena. *Caulis* & ramorum summitates finduntur in triquetros sesquidigitales quasque alatos ramulos, & hi rursus in alios breviores, *foliis* ut plurimum viduos, quos veluti spicata serie coronant *flores* candidi pentapetali, insidentes calici bivalvi herbaceo, fugaci; hos subsequuntur vascula subrotunda pīso majora, quæ maturitate in bina, ut plurimum tamen ternaria carinata tenuia foliola diffiliunt & exigua nigricantia *semina* profundunt. *Radix* fibrosa alba & annua videbatur. Prodiit hoc anno (1688) seminibus ex *insula Crucis* delatis, cujus incolæ plantæ hujus foliis, velut nostrates portulacâ, vescuntur.

CISTUS *Humilis aizoides Africanus glauco folio,*
flore albo.

IN Horto Lugduno-Batavo iconem & descriptionem exhibuimus *Chamaecisti aizoidis Africani maritimi flore rubello*, cui impresentiarum subnectimus duas alias species eidem *aizoides*, quarum prima descriptæ adeò affinis est, ut ex sola nomenclatura ab illa faciliè discriminetur, neque exactam descriptionem nedum iconem exigere videatur. Nec radice nec foliis differunt, nisi quod hæc breviora plenumque sint & glauco colore undique perfusa. *Caulis* etiam vix tam altè assurgunt, sustinentque *flores* albos staminibus luteis in medio stipatos, quibus subest *calyx* bifolius virescens plurimis nigris maculis punctatus. Cætera conveniunt.

Plantarum Corymbiferarum
feminibus bidentibus, seu duabus
rarius tribus in apice aristis præ-
ditis tres species novas propo-
nemus. Prima est.

CHRY-



CISTUS humilis
aizoides.





CHRYSA ATHENIENSIS
Pyvinianum folius
Cicuta nonnulla
Similibus

CHRYSANTHEMUM *Americanum Cordis Indi folio.* Chrysanthemum *Virginianum foliis multifidis Cicute non nihil similibus* H. L. Bat. Chrysanthemum *Cannabinum Americanum frutescens Virginianum Sambucci laciniata foliis & facie* Breyn. Pr. 1. Chrysanthemum *Chinense foliis plurisariam divisis Halicacabi peregrini emulis* Pluck. Tab. 22. Cuambu sive Caryophyllata Pison.

HOc e China allatum esse *Pluckenetius* refert. Nos primum à præfecto Horti pharmaceutici Londinensis, ad quem e Virginia delatum erat, habuimus, & deinde ex Corassavia & Nova Anglia accepimus. Piso in Brasilia observavit. *Caulis* striati sunt quadranguli & nonnihil deprelli. *Folia* potius *pisi* vesicaru seu *Cordis Indi* quam *Cicute* aut *Sambucci laciniatæ* folia imitantur. *Semina* in summo duabus interdum tribus aristis donata sunt, fusca quadrangula angusta unciam longa, formam acus referentia; Hinc ab acus forma vulgo **Spalden en Spelden huydt** appellatur. *Radix* quotannis interit, & ex seminibus deciduis sese renovat. Cætera quæ plantæ hujus historiam attinent, habentur in descriptione, quæ in Hort. Lugd. Bat. Catalogo, sed absque iconè proponi-

ponitur. Idem latifolium seminibus longissimis
Curassavicum Parad. Bat. prodr. specie diversum
 non est. Pro vario solo ac cælo varia est foliorum
 magnitudo. Altera est

CHRYSANTHEMUM *Americanum Ciceris fo-*
lio glabro, Bellidis majoris flore.

R Arum hoc & perpulchrum *Chrysanthemum*
 florum colore & forma *Bellidem* majorem syl-
 vestrem, foliorum pinnis *Cicer* quodammodo æmu-
 latur. *Caules* promit quamplurimos cubitales no-
 dosos ramosos graciles infirmos & ni fulciantur hu-
 nu residentes. *Folia* conjugata, pinnis crenatis hilaris
 viroris ex uno pediculo ternis composita, ad imos
 caules nonnunquam quinis & ad summos qui flores
 sustinent solitariis, quæ quo propiores radici, eo
 rotundiores & quo remotiores eo longiores sunt.
Flores ex octonis candidis petalis & punicante in luteo
 disco constant. *Semina* succedunt priori paria stria-
 ta bifurcata fusca & si diligentius inspiciantur un-
 dique villosis hamulis obsita, inde est quod veluti
 præcentia prætereuntium vestibulis adherent. *Radix*
 e numerosis albidis fibris cohæret, vivax est, &
 vim sobolis procreandæ possidet. Naturæ tene-
 rioris est hæc planta & ab hyberno frigore quod
 inno-

CHRYSANthemum
Americanum Ciccris
folio-

p 124.



p 125.



innoxie non fert defendenda. Sapore & odore evidenti caret. Adolevit in Horto Fageliano seminibus ex Insula St. Crucis investis. Postrema est.

CHRYSANTHEMVM *Corassavicum alato Caule floribus aurantiis.* Chrysanthemum cannabinum Americanum alatum flore aphylo globoso auranti foliis Baccharidis Breyn. Pr. 2. Chrysanthemum Americanum bidentis alatum flore parvo aurantiaco Pluckn. Tab. XLVIII.

Abidentibus *Chrysanthemis* multum discrepat plantæ hujus externus habitus: *Caules* enim ab imo fere ad summum usque membranaceis alis e foliorum marginibus deorsum flexis vestiuntur. *Folia* non conjugato sed alterno ordine nascuntur. Differentia quoque in floribus est, ut postea dicetur. Hi si expendantur primo intuitu *Conyza* potius quàm bidentis *Chrysanthemi* genus esse videtur; Ast ubi semina apparuerunt nemo eam à prædictis *Chrysanthemis* facile removebit. *Radicibus* firmatur ab uno principio compluribus vivacibus surculosis pallidis, è multis fibris minimum digitum crassis & in profundum ætatis coag-

Q;

men-

mentatis; *Caules* ultra cubitum rectà elewantur in varios ramos divisi rotundi subhirsuti digitalis crassitiei. *Folia* quidpiam similitudinis cum Monspelienfium *Bacharide* habent. Rugofa enim funt multis venis prædita, in margine crenata quafique undulata abfque pediculis in caule locata. Formâ admodum variant. Interiora pene rotunda funt, cœtera longula & interdum non nihil mucronata; intermedia quæ maxima funt, amplitudinem palmæ nonnunquam excedunt. Ramulorum cœmis infident globuli e multis minutis flosculis aurantiaci coloris & in quinque fegmenta partitis contexti. Singulis fuccedunt *fecmina* parva fpadicea membranacea cordata in fummo duobus breviffimis & anguffiffimis apiculis donata. *Pluckenetius* fuæ iconi tres apiculos appinxit. Eo quod a Brumæ rigore facile lædatur in hybernaculis afervandum eft, medio verò Maj in pulvillos difpofitum, confpirante cœli temperie lætius affurgit, quam fi in tellaceis relinquatur. *Sapor* herbaeus, floris *odor* languidus.

Cum primùm feminibus e Coraffavia invectis adoleviffet hoc *Chryfanthemum* totum incanum erat, Bimulum verò factum & deinde per foboles & fecmina propagatum mutata canitie, elegantiviridi colore nitebat.

CO-

p15



CONYZA *Pyrenaica foliis primulae veris* Conyza latifolia viscosa suaveolens flore aureo è Gallo provincia Schol. Bot. Paris. Tournef. Eupatoria Conyzoides maxima Canadensis foliis caulem amplexantibus. Plucken. Tab. LXXXVII. Conyza major alato caule foliis primulae veris longe amplioribus graviter odoratis. Læl. Triumfett.

Per initia antequam decaulescit Conyza hæc folia profert in orbem fusa, superficie rugosa & in ambitu acuminatis crenis incisa, *Primulae veris* foliis adeo similia, ut potius hujus quam Conyzae genus esse diceres. Deinde ex horum medio (quod secundo a satto anno contingere solet) egrediuntur caules bini ternive, aliquando unicus, sesquicubitales, qui veluti *Bacharis* Monspeliensium ferme à medio ad summum usque in multos ramos, & hi rursus in alios minores, umbellæ formam constituentes, dividuntur. Singuli exeunt in oblonga foliosa parva capitula, extrema parte multis luteis tubulosis flosculis, & parvis angustis concoloribus petalis numero, ut plurimum quatuor coronæ instar, ornata. Senescentibus succedunt papposa semina Conyzarum fami-

familiae communia. Caules vestiunt *folia* absque pediculis alterna serie, quorum inferiora & intermedia iis, quæ ex radice prodeunt magnitudine cedunt; Superiora vero sensim decrescunt atque rugis & crenis carent. *Radix*, pollicari crassitudine ad palmæ longitudinem descendit, albida & in aliquot fibras brachiata, quæ intercidentibus caulibus hyeme in hortis nostris, quorum solum humidius est, corrumpitur, quam non raro è summo capite soboles emittat, quæ insequente anno sese perficiunt. In fictili asservata complures annos superstes est. Abunde quoque renascitur ex delapsis septembri mense seminibus.

Plantæ vis & effectus reliquis *Conyzis* non omnino dissimilis videtur. Tota namque pinguis & tactu glutinosa est odore suavis & fragrans sapore acris ad *chamamelum* nonnihil accedens.

E Gallo Provincia lecta est à Clarissimo *Tournefortio*, nobisque communicata.

Virga aurea latissimo folio Canadensis glabra *Schol. Botan. Paris.* quam *Pluckenetius* licet dubitanter Tab. LXXXVII. nostræ huic *Conyza* synonymum facit, ab hac diversissima est.

Qua

Quatuor Plantæ sunt, quæ vulgo *Cortusæ* vocantur. I^{ma} est *Cortusa Matthioli* ab inventore *Jacobo Antonio Cortuso* ita nuncupata. *Uncapsularis* ea est & polyspermos; capsula nempe oblonga in brevi quinquifido calyce; *Floribus* monopetalis, quinque crenis divisis, pluribus in summo caulis nudi simul junctis; *Foliis* subrotundis rugosis crenatis & laciniatis. Igitur vel *Primulis veris* vel verius *Auriculis Ursi* subjicienda est. *Clusius* & *C. Bauhinus* vocant *Saniculam montanam*, denotantes nomine *Saniculæ Auriculam Urfi*. *Cortusæ* hujus duæ Icones ab autoribus exhibentur, altera floribus propendentibus, altera surrectis. Unam autem eandemque plantam significare videntur. Nam dum florere incipit *Cortusa*, flores sæpe erecti conspiciuntur, postmodum ubi penitus perficiuntur, deorsum vergunt & nolæ instar propendent, quibus defluentibus capsulæ seminales rursus eriguntur.

II est *Cortusa Americana* flore spicato petalis integris *Hort. Lugd. Bat. app.* Id nominis accepit quod *Cortusæ Matthioli* folia æmulatur, *Bodæo* a *Stapel* in *Theophr. Cortusa Indica* atque *Hedera terrestris* dicitur, Foliis enim & flagellis reptatricibus *Hederæ* nostræ

R

ter-

terrestri nonnihil similis est. In *Cat. Hort. Reg. Par.* nominatur *Sanicula montana Americana repens*, & in *Horto jonquet. Sanicula montana peregrina* seu *Cortusa Americana* D. Brunyer.

III. est *Cortusa Americana spicato flore petalis fimbriatis* H. L. B. à precedente solis petalis, quæ in tenuissimas & quasi capillaceas lacinias divisa sunt distincta variisque cognomentis ab autoribus donata. In *Horto Lugduno Batavo* a prædecessoribus meis indigirata est *Cortusa Americana flore spicato stellato* In *Hort. Reg. Paris* & *Mentzel. pugillo*, in quo simul Ico proponitur, appellatur *Sanicula* seu *Cortusa Americana altera floribus minutis fimbriatis*. In *Horto jonquet. Dicitur Sanicula montana seu Cortusa Americana spicato herbaceo flore* Robins. A diversis huc cognomentis forsitan est, quod CL. *Rajus in Hist.* ex hac tertia specie tres distinctas fecerit, cum una tantum sit. Subjungit porro *Cortusam Americanam flore spicato stellato Hort. Lugd.* ad *Pyrolæ Classem* esse referendam autore *Hermanno*. additque hujus flosculis succedere vascula compressa bicapsularia *Thlaspios æmula*, quæ eodem modo dehiscunt, quo *Pedicularis luteæ* vascula. Tantum autem abest, ut unquam docuerim ad *Pyrolæ Classem* perti-

CORTUSA
Americana
Floribus herbaceis

p. 170



pertinere, ut potius probaverim, hanc & præcedentem secundam esse plantas angiospermicas *seminibus* parvis oblongis nigris lucidis conceptaculis parvis subrotundis nonnihil depressis leviter acuminatis per mediam longitudinem lineola inscriptis, nequaquam bicapsularibus nec intergerina membrana velut *Thlaspi* præditis: sed unicapularibus & dum flores defluerunt grandæscen- & in duas carinas dehiscen- *floribus* tibus, *floribus* minutis in quinque segmenta divis- & spicæ ordi- ne structis; Caliculis rotundis laxis in viridi al- bentibus, *Folius* Cortusæ *Matthioli* æmulis.

IV. est *Cortusa Americana* flore *squallide purpureo* vulgè dicta quo nomine quoque In *Hort. Academ. Lugd. Bat. Catalogo* inter *Primulas* veris proponitur. *Pluckenetius* in *Phyt. Tab.* 58. hujus ramulum pinxit subscripto nomine *Saniculæ* seu *Cortusæ Americane spicæ floribus squallide purpureis*. Nos pleniorẽ iconem ad vivum expressam sistimus. Radice constat mul- tiplici palmum longa, digitum crassa nonni- hil intorta foris fusca intus albida ex multis ad latera nascentibus propaginibus quasi totidem ra- dicibus cum intermixtis aliquot tenuibus fibris co- hærente. In singulis harum capitibus *Folia* profert in orbem fusa, vitiginea longis pediculis innixa

Cortusa Matthioli paria, ast ampliora multo crassiora minusque rugosa superne saturatius virentia, inferne pallidula in ambitu crenata & nonnunquam laciniata, crenis in brevem & inermem aculeum desinentibus. Intra hæc eriguntur *cauliculi* sesquipalmares tenues nunc simplices foliis vidui, nunc ex aliquot ramis compositi & ad quemlibet ramorum ortum foliolo inferioribus multo minori præditi. His fere a medio ad fastigium usque circumstant *flosculi* in laxiorem quasi spicam digesti, singuli constructi sunt è parvo quinquifido calyce & prominentibus aliquot apiculatis staminulis sordide purpurascenscentibus. De *seminibus* horumque conceptaculis nihil statuo, ea enim quamvis in hortis nostris copiose floruerit nec dum vidisse contigit. Ad postremam autem *Cortusam* attinere non incongrue forsitan ex consimili habitu & crescendi modo suspicamur. In quovis solo licet frigidiusculo sine ullo labore succrescit & multiplicatur. *Sapor* inest terreus & adstrictorius, *odor* omnino nullus.

103

CUCUMIS Canadensis

monospermus

fructu

echinato.



CUCUMIS *Africanus echinatus minor.* *Hystrix vegetabilis vulgò.*

PRæter *Cucumeris* species, ab auctoribus qui ante nos scripserunt, propositas, novam è Promontorio Bonæ spei invectam exhibemus, quam ob aculeatam fructus faciem *Cucumerem Africanum echinatum* seu *erinaceum* diximus. Duas autem differentias hætenus agnovimus, majorem nempe & minorem. Visum est minoris tantum iconem proponere, cum major sola partium magnitudine à minori discrepet. *Radix* ei subest longa alba crassitie calamus scriptorium æquans. Nihil aut parum fibrosa, in superficie multis parvis tuberculis seu verrucis exasperata & quotannis interiens *Flagella* fundit cucumerina, quadrangula, striata, aspera valdè ramosa & capreolata: his *folia* adstant oblonga, hirta, villosa, crenata, in duos ut plurimum tresve lobos nunc profundiores nunc leviores divisa, rarius integra ex alis egrediuntur *flores*, qui *cucumeri* paulò minores sunt, lutei, in quinque cuspidata segmenta dissecti; singulos, qui fertiles sunt, excipiunt *fructus* digitum longi, crassitie & forma parvum cucumerem æquantes, aculeis brevibus, crassis, sed minus pungentibus undique obsessi. Color primum viridis est, & ubi ad

maturitatem pervenerunt, in viridi fuscus ad obsoletè castaneum sordidum vergens, & per longitudinem decem undecimve albidis lineis notatus. Caro in tres quasi phalanges, & hæc rursus in alias minores distincta est, in quibus eadem quoque serie disponuntur *semina* albida, depressa, seminibus cucumeris nonnihil minora & tumidiora.

Vim cathartica[m] possidere hanc plantam, ex insigni ejus acredine & amaritie, *Colocynthis* instar, faucibus diu inhzrente, & nauseam procreante, atque etiam odore viroso, forsitan non temerè judicatur. Huic subdendus est,

CUCUMIS *Echinatus Colocynthis folio fructu majori.*

Hunc inter *melones* in horto *Maresiano* adolescentem observavi, qui tantum *fructibus* longè majoribus a superiori specie differebat. *Semina* unde allata erant incompertum est.

Duo genera *Echinomelocacti* laudabili cura AMPLISSIMI *Simonis a Beaumont* ab annis aliquot e *Corassavia* insula in Belgium delata sunt. Utrumque provenit eo loci, quo *Opuntia* & *Cerei*,
ad



ad quorum familiam *Echinomelocacti* pertinent, nascuntur, nempe in Saxorum & rupium inter-
venüs, pauca aut nulla interveniente terra, aliis
que quam plurimis locis in quæ semina injecta sunt.

Plantæ sunt visu raræ & pulchræ sphaericæ pro-
pemodum figuræ, acaules, foliis & ramis desti-
tutæ, ast spinis undique armatæ, *floribus* tubulo-
sis parvis in decem segmenta divisus, *fructibus*
oblongis forma & magnitudine *Capfici* fructu mi-
nimo, eleganter rubellis, tenui subdulci pulpa &
multis minutis *seminibus* refertis.

Quæ ex priori genere sunt subrotundi *Melonis*
magnitudinem adæquant, constantes sedecim aut
septendecim, (nonnunquam paucioribus) costis
aculeatis, & candido tomentoso capite, è quo
flores fructusque egrediuntur, cohærent. Hujus
generis duæ prostant varietates, quarum *prima* co-
stas habet ab imo ad summum recta ascendentes,
appellata :

ECHINOMELOCACTOS *Major non lactescens*
costis rectis. *Echinomelocactus major tomentoso*
capite costis rectis *Par. Bat. Pr.* *Eucoides occi-*
dentale spinosum melonis facie costis rectis *Hort.*
Lugd. Bat. App. *Pomum spinosum Opuntiatum*
Munting. Prax,

Hæc

HÆc a *Pena*, *Lobelio*, *Clusio*, aliisque delineata & descripta est.

Secunda varietas a prima non aliter distinguitur nisi costis obliquo ductu ascendentibus, & in dicta.

ECHINOMELOCACTOS *Major non lactescens costis obliquis.*

Posterioris generis *Echinomelocacti* multo minores sunt & lactescentes, nullis nec costis nec tomentoso capite constantes, sed ex multis spinosis tuberculis coherentes. *Floribus & fructibus* quaquaversum prodeuntibus, primo generi cæteroquin paribus. Horum duæ quoque differentiae notæ sunt; prima est.

ECHINOMELOCACTOS *minor lactescens tuberculis seu mammillis majoribus.*
Echinomelocactos minor lactescens absque tomento cylindris strictioribus *Par. Bat. Pr. Ficoides occidentale spinosum minus absque tomento* *Hort. Lugd. Bat. App. Ficoides seu Melocactos mammillaris glaber sulcis carens fructum suum undiquaque fundens* *Pluck. Tab. xxiæ.*

E, nu-



ECHINOMELOCACTOS

minor Lactiflora

aque tomentis

C. Andris Strictioribus



Enumerosis oblongis tuberculis, protuberantium mammillarum instar, ad apices aculeatis & nonnihil lanuginosis, novem decemve aculeis, juxta se positis, constructus est hic *Echinomelocactus*, sphaerica est ejus forma & nonnunquam productior, mali Aurantii magnitudine, coloris in hulari virore splendentis. Carne seu pulpa constat duriuscula in viridi pallente agrestis & cucumeracei saporis. Turget insuper succo lacteo, quem sauciatus omni ex parte profundit. *Flores* nunc e tuberculorum interstitiis, nunc inter ipsos aculeos erumpunt, similes *Echinomelocacto* majori, pusilli nempe rubentes & tubulosi in decem segmenta separati, exiguo Crocato umbilico cum altero flosculo e medio prominente. Singulis subjiciuntur *fructus*, qui marcescentibus floribus primo sensim prodire incipiunt & postmodum ad maturitatem perducti derrepente & quasi uno ictu, jucundo praesentium aspectu ejaculantur. Forma & magnitudine fructum *Capsici* siliquis minimis & angustissimis adaequant, & tenui sub membrana sanguinei splendoris elegantissimi coloris includunt pulparum e rubro pallentem minutissimis flavescenscentibus *seminibus* refertam. *Radix* tenuis est &

S

albi-

albida, in aliquot fibras divisa, quæ per rupium intervalla reptant harumque asperitatibus sese illaquant. Altera dicitur:

ECHINOMELOCACTOS *minor lactescens tuberculis minoribus. Echinomelocactus minor lactescens absque tomento cylindris strictioribus* Par. Bat. Prodr. Ficoides seu Melocactus minimus lanuginosus spinis mitioribus fructu sparsim egrediente. Pluck. Tab. xxix.

HUjus forma nonnihil depressior est & rarius in longitudinem porrecta. Tubercula multo minora minus protuberantia & pressius invicem coherentia. Aculei longiores tenuiores & mitiores, quibus tenuior sed copiosior lanugo intertexta est. Quoad Flores, fructus & cetera nullatenus a priori distinguitur.

Echinomelocacti majores, seu sulcati licet flores & fructus quos in Patria concepere, in Hortis nostris aliquando perfecerint, attamen absque ullo incremento eodem in statu quo e Patria delati sunt ad quartum quintumque annum persiste-runt. *Minores* vero seu mammillares facilioris cul-

culturæ sunt. Hi namque in Hortis non solum au-
gescunt, flores & fructus ferunt, sed & seminibus
mox a maturitate satis repullulant & propagan-
tur. Expostulant nihilominus exactam culturam,
solum siccum & calorem efficacissimum, ut proinde
de toto fere anno, mensibus Junio & Julio ex-
ceptis, in vitreis hypocaustis asservandi sint.

De Vitæ termino nihil determino, nisi quod
suspicer eos fructibus omnibus excussis interire.
Inter eos, quos in fictili colo, interfunt, qui
ad sextum annum vixerunt & viguerunt.

Majores & Minores sub cineribus ustulati ab
Indis esitantur. Ast ingrator horum sapor. Sua-
viores sunt fructus, qui ob dulcedinem, ficuum
æmulam, avidius expetuntur.

Terentius Ex autographo *Nardi Antonii Rechi*
sub nomine *Tepenexcomisl.* quintam *Echinomelo-*
casti speciem proponit, inquiens: *Eandem vi-*
deri plantam, quæ à Pena, Lobelio & Clusio sub
nomine Echinomelocasti descripta est, sed plurimum
differre; primùm radice, cujus fibrae in crassam
radicem coalescunt, & deinde fructu qui rubescit
quidem sed maculis quibusdam viridantibus ornatus
est, addit quoque carere capite tomentoso. E *Re-*
chii icone patet, fructus in suprema Sphæræ
parte spinis in longam porrectis circumseptos
esse.

esse. An ad lactescentes vel non lactescentes pertineat ex descriptione *Terentii* colligi nequit.

E*phmera* Græcis dicta sunt fere omnia præsentanea venena, quæ gustata intra unius diei moram homines interficiebant. Hinc *oleum Medicum, Pharicum, Colchicum, Cicuta* & alia *Ephmera* vocabantur. *Dioscorides* Ephemeris nomen duabus plantis assignat, quarum altera lethalis, altera innoxia est. *Lethalem* sub nomine *Colchici* describit & aliquibus *Ephemerum*, nonnullis *agrestem bulbum* vocari dicit. *Non lethalem* sub titulo *Ephemeris* proponit & sylvestrem *Irism* aliquibus appellari tradit. De utroque *Ephemero* intricatissima & incerta res est. *Primum* esse speciem è nostris *Colchicis* plurimorum quidem opinio est: Cum tamen nullum *Colchicum* nobis cognitum, *Colchico* seu *Ephemero* lethali *Dioscoridis* respondeat. De altero diversimode sentiunt Scriptores. Quidam enim pro *Colchico* nostro vulgari habent. *Fuchsius* pro *Lilio* quod *Convallium* dicunt. *Lobelius* *Hermodactylum* officinarum esse suspicatur inquiens *Ephemerum salubre dote duntaxat & leviori aliqua notâ non item specie ab Hermodactylo officinarum diffidere &c.* Ast ipsa

ipsa *Hermodactyli* Historia tam veterum quam officinarum nostrarum adhuc tenebricosa est.

Matthiolus pro *Ephemero* Dioscoridis pinxit plantam nulla addita descriptione, quam in Ananienſibus montibus tam in pratis quàm in Sylvis naſci, & indigenis *Giglio mato* hoc est *Lilium ſtultum* appellari, eique omnes notas convenire, quæ alteri *Ephemero* a Dioscoride tribuuntur, aſſerit. Aſt cum nemini hæcenus Planta *Matthiolianæ* Iconi ſimilis viſa ſit, haud temere forſan *Matthioli* iconem ex notis Idææ conceptus fictam habent *Lobelius*, *Columna*, & alii.

Lobelius, *Dodonæus* & horum autoritate plures ſub titulo *Ephemeris Matthioli* plantam exhibent, ſed a *Matthioliana* Icone longe diverſam. Hanc *Moriffon* in plan. Hiſt. *Blattariis* & *Lyſimachiis* bicapſularibus ſubjunxit ſub appellatione *Blattaria affinis plantæ bifoliæ levis flore albo Ephemeris*. Male bifoliam nominavit, tum quod non conſtanter folia conjugata ſed nonnunquam alterna proferit. In *Hort. Lugd. Cat. Lyſimachia ſemper vivens ſpicata Ephemeron diſta* appellatur, quo nomine etiam à *Muntingio* in praxi plantarum proponitur. *Lobelius* quoque ad *Lyſimachias* ſpicatas pertinere cenſuit, dum inquit: *Planta hæc exorica* (*Ephemeron Matthioli* intelligens) ad *Lyſi-*

nachia species, quibus forma similis est referenda videtur.

Fabius Columna in *Ephr.* part. 1. pro *Ephemeræ Dioscoridis* supposuit speciem *Digitalis* quæ *C. Bauh.* in *Pin.* *Digitalis lutea* flore majore habetur. Quamvis *Columna* margini l. c. adscripserit *Digitalem* vulgarem *Lobelii*. Neminem autem fore arbitror, qui *Digitalem*, ab *Ephemeræ Dioscoridis*, si cum ejus descriptione diligentius conferat, diversam esse negabit.

Nostri Herbarii nomine *Ephemeræ* designant plantas quasdam bulbosis affines tricapsulares, floribus fugacibus tripetalis, & in paucis speciebus in duo tantum segmenta separatis (rectius *apocapsularibus* vocari possent) eo quo nascuntur die denascentibus; *Foliis* ad singulos caulium ramorumque nodos singulis, *Radicibus* reptatricibus. Hæc à florum potissimum dispositione in duas classes distribui possunt.

Prima Classis flores tantum trifoliato calyci absque foliacea theca inhaerent, suntque vel *maiores*, qui summo cauli numerosa serie velut in umbella insident; vel *minores*, qui ex singulis foliorum sinibus nunc singulatum nunc plures simul juncti egrediuntur.

Flores

Flores *maiores* ferunt

EPHEMERVM *Virginianum erectum flore coeruleo Hort. Lugd. Bat. Phalangium Ephemenum Virginianum Tradescanti Park. Allium seu Moly Virginianum C. B. P.*

Idem flore purpureo Hort. Lugd. Bat. Phalangium Ephemenum Virginianum flore purpureo Cat. Hort. Reg. Par.

Idem flore albo Hort. Lugd. Bat. Phalangium Virginianum flore albo Cat. Hort. Reg. Par.

Idem flore candido mox coerulescente. Phalangium flore candido mox coerulescente, Hofm. Flor. Altorf.

Idem flore ex albo & violaceo vario. Phalangium Virginianum flore ex albo & violaceo varium Hofm. Flor. Altorf.

Flores

Flores *minores* edunt.

EPHEMERVM *Malabaricum aquaticum procumbens tricoccum ad singulos foliorum sinus floridum. Ephemerum Phalangoides Matraspatnense minimum secundum caulem quasi ex utriculis floridum Pluck. Tab. CLXXIV. Nir-pulli Hort. Mal. Part. 10.*

EPHEMERVM *Corassavicum procumbens angusto, longoque folio Par. Bat. Prodr.*

Ea huic est similitudo cum proxime præcedente Malabarico aquatiko, ut nisi folia produxisset longiora glabra absque pilis, plane idem pronunciarem. Eparum est *seminibus* Corassavicis, *caulibus* cubitalibus humi sparsis, & innox ab exortu ramosis, *foliis* sesquidigitum & amplius longis nonnihil striatis, ad basin latis & sinuosis in angustum desinentibus; *Floribus* ex horum sinu tripetalis coeruleis parvis. *Semina* videre non contigit. Nam postquam flores ediderat, totum exaruit.

EPHE-

EPHEMERVM *Malabaricum pumilum erectum gramineis foliis.* Nelam-pulli Hort. Mal. Part. 10.

Secundæ classis flores, præterquam quod caliculo ut plurimum trifoliato cohæreant, involvuntur complicato viridanti foliolo, univalem compressam hæmisphæricam & hiantem veluti thecam mentiente, e quo duo tres pluresve flores uni petiolo insidentes sese exerunt. Ad hanc pertinent:

EPHEMERVM *Virginianum ramosum procumbens tripetalon foliis rigidis.* Ephemerum *Virginianum procumbens ramosum foliis amplis* Zanon. Hist. Bat.

EPHEMERVM *Brasilianum ramosum procumbens bipetalon foliis mollioribus.* Ephemerum *Africanum annuum flore bipetalo* Hort. Lugd. Bat. Planta innominata *Dipetalos Brasiliana foliis Gentianæ aut Plantaginis* Mark. Raj. Hist. Phalangium *Africanum Hellebori-*
T
nes

*nes folio non descriptum Hort. Lugd. Bat.
Raj. Hist.*

Flos duobus petalis coeruleis, aliquot in pallido flavescentibus staminulis, & quatuor pallidis foliis calicem constituentibus, quorum alterum fere medium floris occupat, donatur; *Folia* multo minora sunt & molliora quam *Ephemeris* Virginiani *Zanoni* cum quo alioquin reliqua conveniunt. Sed *radix* annua est, & sapore dulci & mordicante quem in *Virginiano* deprehendit *Zanoni* caret.

EPHEMERUM *Corassavicum procumbens amphicarpon.*

Cauliculos per terram spargi dodrantes & in latiori solo nonnunquam cubitales colore viridantes & nonnihil rufescentes, nodosos ramosos, & ex singulis geniculis, quæ terram attingunt, pallidas radicales fibras demittentes; *Folia* oblongo rotunda duos ungues lata, in parvum mucronem exeuntia, nunc albis lineis aut maculis aspersa, nunc prorsus alba, superne glabra, inferne pallidula & rara vix conspicua pube, quæ & in caulibus apparet, obducta, ad margines

EPHEMERUM
Corassadicum procumbens ampicapon

p 146



gines crispa & undulata, quorum pediculus in latiusculam membranam laxatus caulem & genicula aliquousque involvit. Extremis ramis innascuntur *foliola* viridia glabra complicata hamisphoerii figuram referentia, e quibus tanquam involucris egrediuntur *flores*, tres quatuorve uni petiolo inhaerentes, parvi pallidi tubulosi, qui in duo subcœrulea segmenta & terna pallida concava foliola calicem mentientia solvuntur. Singulos flosculos excipiunt *vascula* parva oblongo rotunda, trigona, in quibus terna spadicea *semina*, in singulis loculis unum nonnunquam in universum duo tantum imo & quaterna, continentur. *Flores* & *semina* quoque intra terram crassioribus radicis fibris adnascuntur, unde *amphicarpon* cognominatum. Sed fibræ isthæc potius rami e caulium nodis in terram descendentes videntur. Plantæ herbaceus *sapor*, *odor* nullus. In hypocauftis nisi asservetur hyeme, perit, ineunte tamen æstate e seminibus sub terra latentibus repullulans.

In Icone caulis intermedius erectior exhibetur, quia pictor, Iconem ad plantam in fictili cultam expressit, in quo restincta; radicum luxurie, caules & ramuli robustiores facti nonnunquam magis attolluntur.

EPHEMERVM *Malabricum procumbens
subrotundis foliis Veetla-caitu Hort.
Mal. part. 7.*

Hujus flores in Horto Malabarico hexapetali dicuntur. Forſan intelligendi ſunt flores cum ſuis caliculis, nempe tribus petalis florem tondemque calicem deſcribentibus.

EPHEMERUM *Zeylanicum procumbens eriſtatum. Bolhinda Zeyl.*

Pulchellum hoc *Ephemerum* frequens mihi occurrit in arborum ſenio conſectarum truncis, lignis putridis, aliſque udofis & opacis locis Malabaræ & Inſulæ *Zeylan.* A proxime præcedente Malabarico *Veetla-Caitu* licet nihil differre videatur, niſi quod complicata foliola quæ florum involucria ſunt in criſtam congeſta ſint; tamen in gratiam eorum, qui ſpecierum varietate delectantur ejus iconem & deſcriptionem e Colleſtaneis meis *Zeylanicis* excerpere & exhibere non piguit. *Cauliculi* ſtriati in viridi ſubrubentes valde ramoſi & nodofi ultra cubiti longitudinem vario flexu proreptant, albidis tenuibus radicofis fibris ex ſingulis ferme internodiis deſcendenti-
bus

bus. Hos gramineo pene ritu aliquousque obvestiunt *folia*, Malabarico minora, in hilari vi-vore obscure rubentia vel prorsus viridia altera parte pallidula & juxta longitudinem velut cauli-culi, striis insignita. E caulium ramorumque geniculis assurgit *pediculus* sesquidigitalis, ima parte nudus, media ad summam usque speciosis-sima *cristata spica*, quæ ex angusto principio in latiusculum reflexum verticem laxatur, ornatus. Conflata hæc est è numerosis complicatis foliolis formam hæmisphœri exprimentibus, glabris vi-ridibus & ad oras nonnunquam rubentibus, ge-mino versu, sed in superno duntaxat pediculi la-tere locatis. Perficiuntur & marcescunt alternis vicibus, infima primùm, summa postremùm. Dif-ferunt quoque magnitudine, quo enim inferio-ra, eo minora & quo superiora, eo majora sunt. His involvuntur *flosculi* pusilli, in sex se-gmenta divisa quorum tria coerulea florem, re-liqua pallidula calicem constituunt. *Semina* an-gulosa spadicea in tricapsularibus oblongo-rotundis vasculis continentur. *Gustus* deprehenditur aqueus & in recessu subdulcis. Indi expressum plantæ succum in morbis calidis tanquam temperans & refrigerans exhibent.

EPHEMERUM *Indicum bipetalum procumbens obtuso folio pediculo alato. Ephemeron Bengalense serpens folio subrotundo brevi phalangoides Pluckn. Tab. xxvii.*

An hoc Idem sit cum *Ephemero Africano flore bipetalo Hort. Lugd. Bat. & Dipetala Virginiana foliis Gentianae aut Plantaginis Raj. Hist.* atque etiam *Gentianella Indica Bontj.* ambigit Plucknetius l. c. *Africanum Ephemeron* convenit cum *Dipetala Virginiana*, à *Benghalensi* vero diversissimum est. Hoc in Zeylan & Malabar locis umbrosis frequenter legimus, & postmodum etiam ex semine natam conspeximus in horto P. M. Illmi *Casparis Fagelii*, quondam in nobili Abbazia vulgo *Lewenhorst* exstructo. *Africanum* hodiernum in Belgarum hortis colitur. De *Gentianella Indica Bontii* nihil statuo. Ejus icona manca est, & descriptio omni ex parte rudis & imperfecta.

EPHEMERUM *Mexicanum erectum serrato folio. Matlalutzic Tetzocana. Triorchis Mexicana Rech.*

Huic

HUic non multum abfimile, ſi non idem, eſt,

EPHEMERUM *Phalangoides Virginianum majus erectum. Pſeudophalangium ramoſum majus erectum D. Bauiſſer Cat. Stirp. Virgin. Plucken. Tab. CLXXIV.*

Ad Ephemeræ quoque pertinere videtur planta è ſeminibus Noveboracenſibus nobis nata & indiſta:

EPHEMERUM *erectum Noveboracenſe Cardamomi foliis.*

Radice conſtat perenni reptante multisque al-
bentibus furculofis fibris cohærente Caulibus
geniculatis pedalibus digitum craſſis; *Foliis* alter-
nis *Cardamomo* majori paribus ſubtus pallentibus.
De *Floribus* nihil habeo compertum, quamvis
in horto per aliquot annos luxurioſè vigne-
nt.

Ephemeris forſan annumeranda veniunt plan-
tæ quædam à *Rechio* & *Hernandez* propoſitæ,
videlicet.

Coapatli *Asphodelina Rechii*

Acaxaxan seu *planta palustris* &
lenta, quæ statim comprimentibus ce-
 dat digitis. **Potamogeton Mexica-**
num 1 *Rechii*.

Acaxaxan Potamogetum Mexicanum
 11. *Rech.*

Acaxaxan *Hern. Terent.*

A*caxaxan* 1. persimilem plantam pinxit *Pluck.*
Tab. xxvii. nomine *Ephemeris Matraspat-*
ensis minimis foliis perangustis perfoliati, cui
 quoque nomen *Acaxaxan* 1. subscripsit. Vi-
 deantur, quæ de tribus hisce *Acaxaxan* specie-
 bus commentatus est *Fab. Column. in Annot. &*
Add. in Rechium.

Ephemeris, quoque nomine exhibuit *D. Pluck.*
Tab. clxxiv. quatuor sequentes species.

EPHE-

EPHEMERUM *Phalangoides Virginianum flos-
culis arbutis bullatis aureis in spicam dispositis.*
*Phalangium spicatum flosculo arbutis bullato au-
reo* D. Banister.

Hoc in numerum potius Phalangiorum quam
Ephemerorum inscribi meretur.

EPHEMERUM *Phalangoides erectum foliis li-
haceis bulbosum flore flavescente, Cap. Bon. Sp.*
ex Codice Comptoniano.

E semine natum floruit in Horto Medico Am-
stelodamensi & *Sisynrichium Africanum flore lu-
teo tetrapetalo* vocatum est.

EPHEMERUM *Lychnidis flore Africanum* ex
Codice Comptoniano.

Ab *Ephemeris* toto cœlo differens succrevit mi-
hi seminibus à *D. Henrico Bernardo Oldenlan-
dio* è Promontorio transmissis. Ea erant nigricantia
depressa membranacea Tuliparum seu Liliorum in-
star. Capsulæ oblongæ *Papaveri erratico pyrænico*
flore luteo C. Baub. Prodr. similes, sed glabræ utro-
que extremo angustæ, medio turgidæ, summâ parvo
V um.

umbilico præditæ, intus duobus loculis instructæ, quos distinguebat membrana nigricans pinguis saporis acris caryophyllaceum quid redolentis. Postquam duo foliola subrotunda in cœruleo pallentia prodiissent, paulo infra hæc (neutiquam ex horum sinu, ut communiter usu venio) pullulabant aliquot cauliculi tenues nodosi, & in progressu nonnihil lignosi, & ad singula genicula foliis oblongis glabris crassiusculis obtusis glaucis, alterno ordine sed binis sæpe uno versu obsitis. *Flores* tetrapetali fructibus insidere videbantur ob inclementiam vero nostri cœli integros & perfectos hætenus observare nondum contigit. *Amandanda* est ad bicapsulares tetrapetalas hæc planta.

EPHEMERUM *Zeylanicum Alfina media folio
procumbens.*

Quod compiler *Parad. Bat. Prodr.* hoc nomine proposuit & *D. Plucken. Tab. CLXXIV.* ad exemplar ficcum à me *D. Sherardo* communicatum pinxit *Graminis dactyli* non *Ephemeris* species est.

ERY.

p. 155.



ERYSIMUM
Aer. affinis Siliquis
Subincanum.

ERYSIMUM *foliis subincanlis, siliquis brevissimis. An Sinapi peregrinum Erucæ folio Schol. Bot. Par.?*

Ex radice fibrosa pallida exurgit *caulis* ramosus, asperis pilis vestitus, duos pedes altus, *Folia* Erucæ sativæ modo divisa sunt, at latiora asperiora, pilosa & subincana; inferiora palmum lata & interdum ampliùs; superiora angusta. *Floras* tetrapetali lutei, exigui, secundum ramulorum longitudinem quasi in spicas dispositi, quos excipiunt *siliquæ* tenues & brevès erectæ, caulibus strictè appressæ, bivalves cum membrana tenui intermedia, ex duobus quasi articulis constructæ in oblongum & obtusum mucronem desinentes. *Petio*lo insident contiguitatem habente cum membrana intergerina, qui quasi tertium articulum refert. Provenit *seminibus* parvis flavescenribus ex Lusitania acceptis.

Est & alia huic non multùm dissimilis, cui *folia* multò ampliora, crassiora non hirsuta; *Caulis* elatior, ramosi, glabri, raris subinde brevibusque pilis exasperati *flor*es tetrapetali, coloris quam præcedentis, magis saturati, *Siliquæ* breviores, ramulis seu cauli minus strictè junctæ. Hæc quoque ex seminibus Lusitanicis produt. Prioris fo-

lia sapore remissiore prædita sunt quam posterioris, utriusque tamen sapor nihil aut parum habet acridinis.

Quatuor potissimum Plantarum generibus attribuitur à Botanicis nomen *Eupatorii*. Primum Chrysanthemis secundi generis, seminibus duabus ut plurimum aristis præditis, quorum tres species præter eas, quæ ab autoribus nomine Cannabinæ Verbesinæ aliove descriptæ sunt, supra proposuimus. Deinde Ageratis & quidem illi imprimis speciei, quæ à Casp. Bauh. *Ageratum foliis serratis* dicitur, & in quibusdam Medicorum officinis pro *Eupatorio Mesues* habetur. Tertio Agrimonie officinarum. Denique ab hujus sæculi Botanicis adsignatur Plantis pappescentibus, floribus parvis in umbellæ formam congestis, staminulo bifido ex singulis sese exerente, foliis ut plurimum conjugatis, in quibusdam tribus quatuorve, singula genicula ambientibus. Harum una tantum species proponitur in Pinace C. B. nempe *Eupatorium cannabinum*, cui in *Flora Batava* superadditur altera species, nempe *Eupatorium cannabinum floribus albis*, quod prioris potius varietas est.

Cornutus attulit tres species, duas nomine *Va-*
le-

leriana Urtica folio, & in catalogo Hort. Lugd. Bat. *Eupatorii* dictæ, unam nomine *Eupatoria Enule folio* quæ aptius *Eupatorium Salvia folio* appellari meretur.

Plures alias exhibet D. *Pluckenetus* in *Phytographia*, quæ omnes an ad *Eupatorii* familiam attineant, asserere non audeo. Cum singulas vidisse nondum hinc. Minime tamen reticere volui, Synonyma nonnulla, quæ *Pluckenetus* *Eupatoriis* suis subjecit, nřdem haud convenire.

Primo enim *Serratula Noveboracensis folio leviter crenato molli incano* Par. Bat. Prod. & *Cattuschi-ragam* Hort. Mal. part. 2. (quæ à Breynio in Prodr. *Jaceæ* & *Serratulae* adfinis capitulis *Baccharidis*, & in Prodr. 2. *Serratula Indica latifolia mollis* dicitur) duæ & inter se distinctæ plantæ sunt, odoris expertes & ab *Eupatoria Conyzoidi odorata folio crenato molli subincano* Pluck. Tab. 87. diversæ.

Secundò, *Eupatorium Novæ Angliæ Stachidis seu Betonicae foliis crenatis floribus albis* Par. Bat. Prod. cujus iconem mox exhibebimus cum iconē *Eupatorii Americani Melissa foliis magis acuminatis* Pluck. Tab. 87. non convenit.

Tertiò, *Conyza major alata foliis Primulae veris*

longe amplioribus graviter odoratis *Triumfetti*, quam *Pluck. Tab. 87.* cum *Eupatoria Conyzonide maxima Canadensi* foliis caulem amplexantibus eandem statuit, legitima species *Conyza* minime *Eupatorii* est, ut supra ostendimus.

Quartò, *Jaceæ & Serratulæ affinis Breynii* in *Hort. Lugd. Bat. App.* picta eadem est, quæ in *Hort. Mal. part. 2.* sub appellatione *Cattuchiragam* exhibetur & ab *Eupatorio Conyzoides integro Jacobæ folio glabro & duriusculo Indiæ Orientalis Pluck. Tab. 87.* & ab *Eupatoria Conyzoides integro Jacobæ folio Molli & incano Indiæ Orientalis Pluck. Tab. 177.* diversissima.

Quintò, *Virga aurea humilis Alpina Moris. Virga aurea folio Veronica Mentz. Pugill. & Eupatorium humile Africanum Senecionis facie, folio Lamii Par. Bat. Pr. & Pluckn. Tab. 88.* tres distinctæ plantæ sunt, invicem non confundendæ.

Nos species *Eupatorii* quatuor in Belgarum Hortis hætenus cultas proponemus.

EUPATORIUM *Novæ Angliæ Urticæ foliis floribus purpurascens maculato caule. Hort. Lugd. Bat. App.*

Eupa-

152

EUPATORIUM

Urticae folius



E*upatorio* cannabino C. B. humilius est, altitudine sesquicubitum vix excedens. *Radices* agit oblique pallidas furculosas, numerosis fibris comatas, è quibus *caules* eriguntur glabri solidi rotundi punctis lineolisve puniceis undique respersi & ad singula genicula *foliis* quaternis rarius ternis urticæ majoris foliorum æmulis sed crassioribus minusque crenatis circumdati. *Flosculi* situ & habitu *Eupatorio* prædicto similes sunt, plures nempe ex uno folioso oblongo capitulo tanquam calyce prodeunt, singuli vero ex rubente quinquifido tubulo & concolori bifurcato stylo contexti sunt. Hi Septembri mense evanescunt in pappum, quo tempore & caules exarescunt sola remanente radice, quæ in sequenti æstate regerminat. Tota planta acris amari & ingrati saporis est, odorisque debilis. Qui semina ex Nova Anglia ad nos mittebat radici gratum aromaticum saporem adscripserat, quem tamen in ea quæ ex semine nata erat deprehendere non potui. Idem observare est in *Valeriana urticæ folio flore albo Corn.* Hujus namque radicem Nardum redolere asserit *Cornutus*, cum in ea quæ in hortis colitur, odor nullus percipiatur. Ita pro vario cælo & solo varium quoque est ingenium plantis.

EUPATORIUM *Nova Angliæ Betonica foliis
villosis flore albo.*

Cum primum ex semine pullulasset planta tota cineris & lanuginosis villis pubescebat, ut *Stachidem* potius quam *Eupatorium* dixisses. Adultior facta fere tomentum omne evanescebat. *Caulibus* est pedem altis in aliquot ramos & hi rursus in minores divaricatis, nunc solitariis nunc conjugatis singulis sustentibus *flosculos* congeneribus similes exalbidos in pappum abeuntes. *Folia* *Betonicæ* aut *Mentastro* respondent rugis & villis exasperata. *Caulis* parti inferiori bina ex opposito in progressu vero & ramulis solitaria harent. *Radix* fusca est fibrosa & annua. Gustu & odore evidenti videbatur destituta.


In Prodromo Par. Bat. vocatur. *Eupatorium Nova Angliæ Stachidis seu Betonicæ foliis crenatis floribus albis.* Breynius qui in Horto Lugd. Bat. vidit in Prodr. 2. nominat *Eupatorium Americanum Nepetæ folio angustiori subaspero floribus albis longioribus.*

Enata nobis est ex seminibus quæ inter alia absque adscriptione nominis ex Nova Anglia recepimus.

EUPA-



EUPATORIUM
Betonice folius



EUPATORIUM
Senecionis facie
Joh. Lam.

EUPATORIUM *humile Africanum Senecionis facie, folio Lamii. Senecio Americanus Lamii facie Schol. Bot. Par. An Eupatorium Americanum Nepetæ folio latiori, floribus albis brevioribus Breyn. p. 2?*

De patrio solo hujus *Eupatorii* nihil certi nobis constat. Honestissima Domina *de Block* in cuius Horto primum conspeximus, semina hujus ex Mauritania ad se delata esse referebat, Opacis maxime gaudet, in his altius assurgit quam in iis, quæ solis radius sunt opposita. Profert *cauliculos* tenues infirmos altitudinis palmaris aut pedalis, ad singula genicula binis ex adverso ramulis & juxta hos totidem *foliis* Lamii æmulis sed mollioribus tenuioribus & rotundioribus adornatos, Ramulis proceritate caules sæpe superantibus. Apices comantur *flosculis* albis lanugineis in capitula *senecionis* instar congestis, quibus emarcidis succedunt *semina* parva nigra incano pappo cristata. *Radix* annua est è tenuibus fibris cohærens.

Quid de Synonymis à *D. Puckenetio* Eupatorio huic subscriptis sit sentiendum, supra innuimus.

EUPATORIUM *Americanum Amaranthoidis Indici majoris foliis,*

Inter quamplures plantas, cura Illustrissimi *Beaumont* e Corassavia Insula advectas, & in ejusdem viridario florentes, observavimus. Partibus omnibus incana hirsute pubescebat ut per initia potius *Lychnidis coronariae* aut *Amaranthoidis Indici majoris* quam *Eupatorii* genus referre videretur, *Caulis* binorum palmorum altitudine surgebant in aliquot ramos brachiat, albidisque discoideis *flosculis* in umbellae formam collectis ornati, *Folia* caulibus haerebant absque pediculis conjugata, praedictae *Lychnidi Amaranthoidi* perquam similia, latitudine pollicem, longitudine semudigitum complentia & in obtusum mucronem desinentia; *Semina* congenerum ritu pappescebant. *Radix* e fibris contexta perennavit. *Sapore & odore* singulari nullo constabat.

In Prodomo 2. *Breynii* vocatur *Eupatorium Americanum tomentosum Lychnidis coronariae foliis & facie, flore albo*. In Catalogo Horti *Beaumontiani* *Eupatorium* hocce non reperitur, quanquam ad tertium annum in eodem horto viguerit.

Quid de tribus *Eupatoriis* in *Breynii Cent. 1.* propositis, censendum sit, alibi edocebimus.

p. 103

FERULA
Galbanifera



FERULA *Africana Galbanifera ligustici foliis & facie.* Ferula fruticosa semper virens foliis Anisi Par. Bat. Pr. Anisum Africanum fruticescens folio & caule rore cæruleo tinctis. Pluck. Tab. xii. Oreoselinum Anisoides arborescens Ligustici foliis & facie, flore. luteo. Capitis Bona Spei. Breyn. Pr. 2.

Genuina illa planta, quæ Galbanum officinarum fundit, nostri sæculi Botanicis nondum innotuit. Ferulaceam esse veteres docent omnes, quænam vero species sit, non constat. Eo equidem nomine Plantam pinxit Lobelius, è semine lato foliaceo aromatico in Galbani lachryma Antwerpæ reperto natam, quæ an Galbanum unquam stillaverit nec Lobelius nec alii tradunt. Si Lobeliana planta ea ipsa sit, quæ Casp. Bauh. in Pin. Ferulagd latiori folio nominatur, & in hortis nostris frequentatur, certum est eam succum Galbano similem haud quaquam fundere, licet odor ejus Galbano valde similis deprehendatur. Incertum autem est, an Ferula, quam nunc ex-

hibemus, legitima illa fit, è qua antiquorum aut officinarum *Galbanum* emanat, ut ut ex caudicis geniculis aliquando lachrymam collegerimus *Galbano Officinarum* simillimam. Præterquam enim quod prisci non ipsam Plantam sed *Galbanum* tantum descripserint, plures extare possunt stirpes, quæ succum *Galbano* similem stillant, ut de variis lachrymis quæ inter se conveniunt & è diversis stirpibus leguntur, nobis compertum est.

Ferula igitur Africanæ *caules* pollicari crassitie ultra tres quatuorve cubitos eriguntur; Annuï non sunt ut cæterarum *Ferularum*, sed perpetui lignosi rotundi glauco rore obducti, quo etiam *folia* perfusa sunt, geniculati, albida duriuscula medulla farcti, & in ramos aliquot brachiati, quorum cacumina occupant *flosculi* lutei pusilli ferulacei in umbellam conglobati. Hos excipiunt *semina* oblonga striata paululum depressa fusco spadicea & in ambitu velut *Ferula*, tenui membranacea ala circumdata. A *Legustici* seu *Levistici* seminibus non aliter differunt, quam quod hæc profundioribus sulcis inscripta sint, & membranaceo margine destituantur. Singula caulium ramorumque internodia teguntur foliacea quadam valvula è qua egrediuntur *folia* *Levistici* foliis paria, sed rigidiora
&c



FERULA
Sinaitana
Lucida.

& læto dilutiorique virore splendentia, Lobis extremo ambitu anusi foliorum instar incis. *Radix* crassa est lignosa pallida in aliquot fibras brachiata. *Planta* perpetuæ viriditatis est, & sine magno labore in hybernaculis sustentatur. Per Ramulos quocunque modo cultos hætenus multiplicari non potuit; Facilius verò per semina, quæ ferventiori æstate in Belgio maturescunt. Acredine aromatica sat penetranti gustantium linguam perstringit. Sauciata *Lac* fundit viscidum sed dilutius & paucum, in lachrymam Galbano omnibus notis respondentem concrescens. E trimuli quadrimulive caulis geniculis sua sponte nonnunquam emanat.

FERULA *Tingitana folio latissimo lucido.*
Hort. Edinb. Sutherl. Ferula Tingitana
lucido folio, Apii segmentis. Breyn. Pr. 2.

F*erula* hujus copiam nobis fecit Cl. D. Jac. Sutherlandius Horti Medici Edinburgensis præfectus dignissimus, qui semina ex Tingitanis agris collecta acceperat. *Radice* firmatur brachiata, magna, nigrâ cute obducta, intus albida, bima, nonnunquam trima facta, *caulem* protrudit in plures ramulos expansum, *Ferulae semina* Plinii C. B. proceritate & crassitie nonnihil minorem.

Folia insigni virore splendent, quasi vernice essent obducta, & à sole vibrata oculos perstringunt. Horum segmenta *Apii* segmentis magnitudine & incisuris non malè respondent, sed crassiora sunt & rigida. Pediculi in latam membranam folliculum efformantem diducuntur, & ramos è caulium nodis oriundos aliquousque involvunt. *Flores* luteoli in umbellatum orbem conglobati, & *semina*, maturitate penè nigrescentia, à congeneribus nihil ferè discrepant. *Sapore*, *odore* & temperamento *Ferule fœminæ* paulo inferior est.

Hæc quamvis perennet, nec ab hyberno frigore facile lædatur, soboles rarò gignit, ideoque seminibus, quæ Autumno perficiuntur, propaganda est.

FICOIDES *Africana erecta teretifolia floribus albis umbellatis.* Ficoides seu *Mesembrianthemum Africanum frutescens floribus albis parvis umbellatis.* Pluck. Tab. CXVII.

Locis maritimis arenosis Promontorii Bonæ spei sponte oritur egregia hæc *Ficoides*. Hortis nostris familiarior est quàm cæteræ hujus generis spe.

FICOIDES
Erecta teretifolia

p. 56



species. Nam quanquam hybernis mensibus locis à gelu liberis affervari postulet, quasvis æstivi acris tempestates innoxie sustinet & per ramulos cuivis solo commissos facillime propagatur. *Caulis* erigit pedales aut sesquipedales lignosos rotundos geniculatos ramosos. Duobus tamis semper sibi oppositis. Qui adultiores sunt membranaceo & in fusco castaneo cortice induuntur. Juniores in pallido virescunt. Geniculis adhærent *folia* ex adverso duo propemodum trigona succosa & carnosâ, quorum inferiora crassitie calamus scriptorium, longitudine dimidium digitum impleat; Cœtera sensim gracilescent. *Ramuli* sparguntur in tres pedicellos sustinentes *flores albos* Bellidis Sylvestris minoris floribus paulo minores, qui è numerosis candidis angustis petalis, & intermediis concoloribus apiculatis staminibus contexti sunt. Hi ea serie & copia prodeunt, ut perpulchræ umbellæ speciem exprimere videantur. Singulis subjicitur *calix* crassiusculus viridis quinquifidus, in quo emarcido flore conspicitur *fructus* congenerebus similis parte superiori in quinque cellulas *seminibus* cineraceis parvis duris arenæ instar refertas divisus. *Radix* tenuis est lignosa candida multis fibramentis capillata. Ab exortu Vergiliarum ad Autumnum usque floret, eodem-

denique tempore favente cœli molliæ semina sua perficit.

FICOIDES *Africanum luteum procumbens longissimis foliis.*

Nec hoc *Ficoidis* genus cœlum nostrum & solum tenuit. Nam & seminibus & avulsis ramulis facillime succrescit & perficitur. Hujus *semen* terræ injectum, postquam intumuerit in duo crassiuscula orbiculata *foliola* laxatur, è quorum sinu alia atque alia semper sibi invicem opposita egrediuntur; Hæc ubi adolescunt longitudinem & crassitiem digiti nonnunquam excedunt. Rigida vero & glauca non sunt ut in præcedenti specie, sed mollecula flaccida viridia repentina tertia aliquando trigona & in obtusum depressum quasique ensiformem mucronem abeunt, brevibus quibusdam eminentis quasi dentibus nunc ex horum medio nunc prope exortum nunc ad ipsas extremitates protuberantibus. *Caules* ex unica *radice*, quæ parva albida & fibrosa est, profert ut plurimum tres quatuorve, sed perbreves, & densa conjugatorum foliorum serie circumdatos. Ex horum alis prodit *flos* petiolo semidigitali innixus, magnitudine floris *Taraxaci*, inter initia totus luteus,

teus, & ubi flaccescere incipit ruber aut coccineus. Multis constat angustis petalis & intermediis aliquot tenuissimis filamentis velut disco. Hæc ad Solis accessum in orbem expanduntur, ad recessum vero contrahuntur. *Fructus* congeneribus similis est multicapsularis & orbiculatus, magnitudine *cerasum* æquans continens *semina* parva spadicæ dura. Solum amat laxum siccum & arenosum, udum compactum & pingue aspernatur.

FICOIDES *Africana Annua Centauroides.*

Natalium ortu, temperamenti harmonia & partium dispositione *Ficoidibus Africanis* cognata planta, dimidii palmi altitudinem vix exsuperat. *Radice* constat annua parva albida fibris perpaucis capillata, tellurisque summo oblique inhaerente, *Coliculo* tenui quidem ast dum adolescit duro & pene lignoso glauco genicularo, nunc recta nunc oblique se ab humo protollente & summitatem communiter in tres ramulos quasi pedicellos, quibus *flores* insident, diviso. Hi per initia floribus *Centaureis minoris*, postmodum *Sedimontani tomentosi*, quod *Gnaphalodes* & *Arachno-*
Y des

das vulgus appellat, quadantenus conformes sunt, aut coloris pulchre miniat in luteum fatiscens sed petalis quinque nonnunquam quatuor in basi junctis & in acumen extenuatis constructi, medium occupantibus aliquot brevibus viridantibus staminibus croceis apiculis exornatis. *Calix* pentagonus in quinque cuspidata folia exiens; *fructum* præcedenti similem sed multo minorem includit, in quo *semina* minuta scobis instar apparent. Singulis coliculi geniculis conjugato ordine adnascuntur *folia* minime angulosa sed plana *Centaurii minoris* foliis paria aut crassiora multo & succosa glauco colore velut circinnatum *Sedum* nientia. Linguae sensum nullo singulari sapore nisi aquo afficit.

FICOIDES *Africana annua minima muscosa.*

Omnium minimam hanc *Ficoidis* speciem primo intuitu *Alfinem Aizoidem* dices, ubi vero penitus examinaveris à præcedente non aliter differre agnosces nisi exilitate partium & colore, qui viridis est aut in viridi nonnihil rufescens. Pro *radice* habet tenuissimos capillos summæ telluri inhaerentes, è quibus sparguntur *coliculi* graciles plurimam partem humi jacentes longitudinis
digi-

digitalis in ternos plerumque ramulos divisi. His hærent *foliola* Alfinæ minimæ paria at crassiora succosa, & præcedentis foliis multo tenuiora. Summi ramuli decorantur *flosculis* perpetuis muscosis albidis quinquifidis, plurimis parvæ umbellæ specie simul junctis & quinquifidis caliculis-flosculos exuperantibus circumvallatis.

Hæc atque proxime antecedens, ex semine hæc Julio Mense in Horto meo floruerunt sed postquam Augusto insequente ad frugem pervenissent penitus contabuerunt.

Præter exhibitas has *Ficoidum* species duæ aliæ nobis enatæ sunt, quarum hic loci meminisse oportet. *Prima* appellari potest.

FICOIDES *Africanum erectum spinosum.*

F*icoidi Africana minori erectæ folio triangulari glauco flore luteo valde simile est, sed folia in superficie multis cavis punctulis inscripta erant, & quod hoc in genere rarum & insolitum, ramuli, in quos cauliculus separabatur ad alas pungentibus spinis armabantur, spinis in medio duobus ex opposito foliolis cæteris multo minoribus præditis. Hæc cum altitudinem circiter palmi adepta esset vermiculo atrosa non sine dolore meo*

interiit. *Altera* quæ in horto meo adhuc viget dici meretur.

FICOIDES *Africanum triangulari robustissimo folio.*

Folius est inter omnes quæ hætenus innotuerunt *Ficoides* robustissimus glaucis trigonis rigidis, digitum longis, pollicem crassis, multis ut prior in superficie foraminulis non perviis insignitis, cæterum tardissime germinat, nam trienni spatio vix digiti longitudinem assecuta est. Utriusque fructus quinqucapsularis erat.

Has *Ficoidis* species debemus *Doltsissimo Oldenlandio* qui quatuor priores ad Promontorium bonæ spei, duas posteriores in Heycon Africæ primus detexit earumque semina inde ad nos transmisit.

De Flore quem ob signa passionis Domini nostri quæ refert, *Florem passionis* vocant, veteres omnes siluerunt. Is primum ab Hispanis subjugata America detectus est. *Nicolaus Monardus* & *Petrus Cieza*, qui plantis indagandis operam dederunt unius tantum speciei, nomine *Granadilla*, meminerunt. *Gerhardus Marchgravius* septem species, *Murucujæ* appellatione,
ex-

FLOS PASSIONIS
albus



exhibet. *Guilielmus Piso* decem species à se re-
 pertas asserit, quanquam quinque tantum descri-
 pserit. Aliam producit *Nardus Antonius Re-*
chus, quam *Coanenepilli* seu *Contrayervam* nomi-
 nat. *Muntingius*, præter *Contrayervam*, duas
 pinxit, quarum *Marckgravius* & *Piso* non me-
 minisse videntur, unam nempe *campanulato flo-*
re, & alteram *Hederaceam flore luteo*. Plures à
 laudatis auctoribus non scriptæ venustate tamen
 & raritate insignes ex America in Belgium illa-
 tæ sunt cura & impensis Illustrissimi & omni præ-
 dicatione majoris Viri *Simonis à Beaumont* in cu-
 jus amœnissimo viridario inter alia florea mira-
 cula viguerunt. Harum species aliquot recenset
Breynius in *Prodr.* 2. Nonnullas delineavit *Pluc-*
kenetius in *Phytographia*. Nos tres species quarum
 icones à multis ab hinc annis æri insculpi curavi-
 mus, proponemus. *Prima est*

FLOS PASSIONIS *albus reticulatus.*

Flos Passionis *Curassavicus Hedera hirsu-*
to folio flore albo Par. Bat. Pr. Flos Pas-
 sionis *Althææ folio lanuginoso longiore sæ-*
tidus flore decapetalo & *filamentis niveis*
fructu vesicario & *Idem filamentis ex al-*

bo & purpureo colore variegatis Breyer.
 Pr. 2. Passiflora vesicaria Hederacea foliis
 lanuginosis odore retro filamentis florum
 ex albo & purpureo variegatis Pluck.
 Tab. 104.

Non Americae insularum tantum sed & conti-
 nentis indigena planta, habitu pilosa, tactu
 mollis; & odore *Daturam* inter & *Hyoscyamum*
 medio, gravis est, Graveolentior multo & hirsu-
 tior in Patrio solo, quam quae ex semine in hor-
 tis nostris colitur. At, hoc plurimis stirpibus
 commune, ut mutato solo & caelo habitum non
 tantum, sed & ingenium mutant. *Viticulis* te-
 nuibus ramosis praelongis latissime exspatiatur, suis-
 que *capreolis* ex foliorum alis egressis vicina quavis
 arripit & involvit. *Folia*, è latiori cordata basi
 in conum porrecta, lanceam mutantur, ima pal-
 mum circiter lata, & sesquidigitum longa sunt,
 coetera sensim gracilescunt. Quaedam integra,
 quaedam in duos à latere angulos tanquam lobos
 infecta sunt, ut, si mucronem addideris, trilo-
 bata videantur. Ex horum sinubus prodeunt tria
 oblonga viridantia hirsuta multifida foliola reticuli
 speciem referentia, quibus tanquam *calycibus* flo-
 res & fructus irrecuntur. His partibus multa est
 simi-

similitudo cum *Nigella* quam *Melanthium Damascenum* pleno flore *Clusius* appellat; est minor est fructus, flos major, qui decem constat petalis, quinque exterioribus infra virentibus, supra candicantibus & totidem interioribus immaculato candore utrinque nitentibus. His incumbunt filamenta in orbem rotata candida & nonnunquam violaceis purpureisve punctulis ad exortum interstincta. Hinc duæ varietates in *Prodr.* 2. *Breyn.* proponuntur. Reliqua, columella nempe, capitati clavi, & pendulæ lamellæ subluteo in viridi polline aspersæ sunt. Tempore matutino flos hiat, meridiano se contrahit & contabescit, columellæ globulo è quo se fructus perficit & reticulato calyce qui fructum involvit, remanentibus. Is folliculi instar inflatus est viridis, tribus per longitudinem lineis inscriptus continens *Semina* depressa pyriformia nigra superficie scabra quasque granulata, interiori folliculi parti adnata *Radix* subest parva candida, reptantibus fibris capillata, annua & si in hybernis diligentius colatur, nonnunquam perennans. An in America edulis sit fructus non constat, qui in Belgio maturefcit, insipidus & absque pulpa deprehenditur. *Altera* est

FLOS

FLOS PASSIONIS *albus folio Ibis sericeo trilobato. Flos Passionis Althææ folio lanuginoso flore decapetalo parvo albo filamentis purpureo violaceis & Idem foliis magis serratis. Breyn. Prodr. 2. Passiflora non crenata Americana triphylla ex codice Bentingiano Pluck. Tab. ccxii. Hedera Murucujæ species vesicaria lanuginosa odoris gravis Marckgr. 73. Flos Passionis Corassaricus Hederae hirsuto folio, fl. Purpureo variegato Par. Bat. Pr.*

Hedera, *Murucujæ species vesicaria odoris gravis Markgr. in Prodr. 2. Breynii & Phytographia Pluckenetii* priori speciei attribuitur. Ast cum in Historia Marckgraviana nulla facta sit mentio reticulati calycis, & eaque secundæ speciei per omnia respondeat, id nominis potius huic quam illi competere videtur. *Foliorum* lobi variant, nunc majores sunt nunc minores, nunc in ambitu levius nunc profundius crenati. *Calyx* tribus parvis foliolis sed integris constat. *Fructus* ipsi non videmus simul ac enim in hortis nostris unum alterumve florem prorulit, interit, illum tamen priori similem ex America reduces asseriebant. Proinde nondum nobis compertum est num annua num perennis planta sit; Sed satis fuerit hu-

FLOS PASSIONIS

*herbato folio flore
purpureo variegato.*

pass.



huius iconem à *Marckgravio* omiffam exhibere. *Tertia* est

FLOS PASSIONIS *flore & fructu omnium minimis.* Flos Passionis *Curassavicus folio glabro trilobato & angusto flore flavescente omnium minimo Par. Bat. Pr. & Pluck. Tab. x.* Flos Passionis *trifido folio flore minimo pentapetalo viridi fructu minimo nigro molli Breyn. Pr. 2.*

P*assifloræ* hederaceæ flore luteo adeo, similis est hæc planta ut separata hystoria & icone vix indigeat, cum præter partium exilitatem in paucis tantum ab ea deflectat. *Folia* glabra in tria profunda & angusta segmenta divisa sunt, superiori reliquis productiori. *Flos* totus viridis partibus omnibus minor. *Cauliculi* ima præsertim parte & qui annosi sunt fungoso cortice obteguntur. *Fructus* baccam refert, tactu mollem, maturitate nigram, amplitudine granum piperis nonnihil superantem, cujus viscida concolor pulpa parva fusa oblonga semina conunct. *Radix* tenuis late proserpens perennis est, quotannis novas soboles emittens.

Clematidem Americanam digitalis flore, filiquosam monophyllon majorem & minorem Par. Bat. prodr.

Z

legi-

legitimam esse speciem *Floris Passionis*, ex ramulis siccis cum floribus ex Sirinama receptis, agnovi, *Folia* Clematidi Americanæ tetraphyllæ ampliora sunt cæteroquin valde similia. Majoris *Flos* decapetalos est & amplitudine *Florem Passionis* pentaphyllum æquat, filamentis intermediis pulchre variegatis quasque tessellatis. Minoris *Flos* tubulosus & ad oras in novem & decem segmenta divisus est, aut filamenta in medio nullâ apparebant. Uterque rubro eleganti colore nitet; Color verò Columellæ clavorum & lamellarum in neutro discerni poterat.

GERANIUM *Africanum tuberosum*
Anemones folio, incarnato flore. Geranium
Æthiopicum Myrrhidis folio tertium, flore
magno striato Breyn. Cent. I.

Venustissimi & ab Anthopilis expetitissimi hujus *Geranii Africani* historiam & iconem dedit *Breynius l. c.* in his cum singula expressa non sint, minime supervacaneum opus me facturum opinor, si pleniorē & perfectiorem historiam, additâ quoque iconē nostrâ ad vivum expressa, proponam. Subsistit igitur *radice* crassa tuberosa, multis fibramentis in
no-



nodulos extuberantibus capillata. *Folia* aliquot segmentis dividuntur instar *Anemones* latifolix latioribus tamen crassioribus & pinguioribus. Imæ quæ ab radice exeunt in circumscriptione prope modum rotunda sunt, cætera quæ caulis habet in longitudinem extenuantur. *Caulis* palmari longitudine prosurgunt, ramosi inæquales prominulis articulorum toris per digitalia aut longiora intervalia distincti, è quibus folia longis pediculis nixa ut plurimum gemina egrediuntur, duobus aut tribus cuspidatis foliolis tanquam alis singula genicula ambientibus. Ramorum fastigia ornat speciosissima florum umbella, centro è quo radii oriuntur, sex angustis reclinatis foliolis circumdato. *Flores* constant petalis quatuor raro quinque carneo colore nitentibus, duobus amplioribus galeæ instar erectis ab angusta purpurantibus stus inscripta basi in latum ambitum diductis, duabus strictioribus & aliquot purpurantibus lamellatis staminulis cum concolori multifido pistillo succedanei rostri rudimento. *Calix* qui his subest, primum in quinque angusta in rubro striata foliola expanditur, postmodum in se adductus contrahitur & totidem parva rotunda seminum conceptacula quæ superstitis & sensim grandescens stili basin ambiunt concludit. Ex singulis præ maturitate hiantibus exilit

semen oblongum è ruffo flavescent & in longiusculum tenue plumosum & circinnatum rostellum desinens. Foliorum *sapor* valde quidem adstringens & desiccans sed linguæ haud diu inharens sentitur. Integra propemodum æstate in multam hyemem usque floret, nec in hybernis si à frigore custodiatur, virorem suum facile dimittit.

Aliud Geranii genus viguit in Horto Illust. *Casparis Fagelii*, appellatum

GERANIUM *Africanum humile Adianthi foliis.*

Palmi altitudinem vix implebat. *Radix* quasi in bulbum rotundabatur; *Folia* in tenuia segmenta *Adianthi acrostici* instar insecta erant; *Flos* ex cœruleo & albo colore pulchre striatus apparebat.

In Codicibus Amplissimi *Beaumontii* conspexi

GERANIUM *batrachoides Americanum maculatum ruberrimo flore.*

Foliorum segmenta latiora & rotundiora erant quam in Geranio montano fusco, & nigricantibus maculis insignita. *Flores* ruberrimo nitente

tebant colore , *Calix* satis amplus in quinque foliola expandebatur.

Num Græcorum *Heliotropia* nostri sæculi Botanici cognita sint? incertum arbitror. Singula enim ad hanc rem attinentia si expendantur, liquido apparet nec Græcos de *Heliotropiis* inter se convenire , nec horum notas omnes recentiorum *Heliotropiis* respondere. Et certe hætenus nemini nostrum plantæ innotuerunt in quibus ejusmodi conversiones ad solem , quas Græci *Heliotropiis* assignarunt constanter observantur.

Duplicis vero generis sunt nostrorum herbariis *Heliotropia*. Primi generis species unica est nempe *Heliotropium tricoccum* , cuius pigmentum ex fructibus paratum Gallis *Turnesol* vocatur. Hoc flore est. Stamineo s. apetalò à fructibus remoto , *Fructibus* verrucosis asperis tricoccis , *Foliis* integris alternis ; Vulgo pro *Heliotropio parvo* *Dioscoridis* & *tricocco* *Plinii* habetur. Alterius generis species ad familiam plantarum asperifoliarum spectant ; *Seminibus* nempe quaternis in *calicibus* quinquifidis , *Floribus* parvis quinque partitis in spica recurvatam Scorpionis caudam imitante dispositis , *Foliis* alternis. Harum tres species ex autoribus ante se scriptis in *Pinace* proponit *Bauhinus*.

Duas species attulerunt *Marckgravia* & *Piso*. Prima dicitur *Jacua acangha* Brasilianis & *Fedagozo* Lusitanis. Altera *Aguavaquinha*. Prioris Iconem *Marckgraviana* nitidiorum multo & perfectiorem exhibet *Dodartius in memoria plantarum*, cum inscriptione *Heliotropii Americani caerulei foliis Hormini*. Posterior in Hort. Lugd. Bat. Catalogo *Horminum Americanum foliis angustioribus* appellatur. Quod hoc nomine in hortis nostris succrevit, totum pilosum erat, & tactu mollius. *Caules* habebat humiliores, *Folia* breviora multo & angustiora, *Flores* minores candidos, *semina* rotunda. Imago *Marckgraviana* potius hanc posteriorem quam priorem speciem exprimere videtur. Synonymum autem *Jacua acanga*, in Hort. Lugd. Bat. Catalogo & Parad. Bat. Prodromo posteriori speciei subscriptum, ad priorem relegandum est. Quatuor novæ species in Paradisi Batavi prodromo annotantur, quarum unicam hic exponemus, nempe

HELIO.



HELIOTROPIMUM
Lini umbilicatis facie.

HELIOTROPIUM *Americanum*
procumbens facie Lini umbilicati. Helio-
tropium Curassavicum foliis Lini umbi-
licati Par. Bat. Pr. Heliotropium Ame-
ricanum minus glabrum folio angusto
glauco Breyn. Prodr. 2. Heliotropium
Monospermum Indicum procumbens glau-
cophyllum floribus albis Pluckn. Tab.
 XXXVI.

Annequam flores parare incipit Lino um-
 bilicato *Par.* prorsus simile est. Totum
 glabrum, glauco colore nitens. *Cauli-*
culi in ramos divisi longitudine palmum
 æquantes & humi decumbentes superioribus *foliis*,
 Lino umbilicato crassioribus & pinguioribus obli-
 ti sunt. *Flosculi* minores sunt quinquepartiti can-
 didi, in spicam congeneribus similem congesti.
 Sequuntur deinde in caliculis quinquifidis *capitula*
 parva rotunda, quæ præ maturitate in quatuor
 partes separantur. Igitur tetraspermum est hoc
Heliotropium non monospermum. *Radix* fibrosa
 parva quotannis interit. Evidenti *sapore* & *odore*
 nullo sensus afficit. Augusto & Septembri perfici-
 citur & ex deciduis seminibus se renovat.

HIE-

HIERACIUM *Pyrenaicum Blattaria folio, minus hirsutum. Schol. Bot. Par. Turnes.*

Evivace crassa fibrataque *radice* multa exeunt *folia* in orbem congesta, humi decumbentia saturate viridia, acuminata per ambitum denticulata crassiuscula pilosa nervosa longitudine nonnunquam dodrantem, latitudine duos pollices superantia. *Caules* paulo ultra pedis altitudinem profurgunt ramosi hirsuti angulosi striati intus cavi, quos amplectuntur *folia* imis minora & ad exortum auriculata. Ex horum sede egreditur pediculus digitalis, hirsutus, cui capitulum infidet multis pilosis angustis & arcuatis foliolis circumseptum, quod in amplum luteum *florem* Hieracis similem sese explicat. *Semina* succedunt oblonga in ruffo nigricantia, albo pappo donata. Foliorum *sapor* amarus est cum quadam adstringentia in recessu.

Magnam habet affinitatem, si non idem sit, cum *Hieracio latifolio glabro ex valle Griesbachiana* J. Bauh. *Pluckenetus* ramuli iconem in Tab. cxvi. exhibet, eique Synonymum *Dentis leonis caulescens* C. B. Prodr. subscribit. Ast descriptio Bauhianae *Hieracio* nostro non in omnibus respondet; Inter alia obstant *folia* quæ in nostro nec rotunda
nec



HIERACIUM
Blattarra folio.

p. 184.

5



p. 134



HIERACIUM
Capitulum
Carum concolor

nec laciniata sed mucronata & in ambitu denticulata sunt.

HIERACIUM *Medio nigro Boeticum majus*
Parck. & Raj.

Hujus Historia cum à *Lobelio* in stirpium illustrationibus & à *Parkinsone* in Theatro, citra imaginem tradita sit, igitur hanc solam citra historiam exhibere visum fuit. *Foliis* insuper ludit hoc *Hieracium*; nonnunquam enim glabra sunt & pingua nonnunquam incana lanugine obducta, nunc lævius nunc profundius laciniata, & per ambitum aut nihil aut parum denticulata. Hoc anno *Hieracii* hujus varietas mihi nata est senune ab Excellentissimo *Johanne Boëhmio* Medico Veneto & rariorum stirpium indagatore & cultore solertissimo ex Italia misso. Petala exteriora albida, intermedia discum imitantia lutea, cætera priori simillima erant.

HIERACIUM *capitulis Cardui benedicti glabrum.* An *Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti majus Arabicum folio sinuato Hort. E-dinb. Sutherl.?*

Ab *Hierarcio Echioidi capitulis Cardui benedicti*
C.B. in eo tantum deflectit, quod omnibus
A a par-

partibus sit glabrum & nullis spinulis pilisve asperum, folis foliolis, floris capitulum amplectentibus exceptis, quorum margines nonnunquam brevissimis pilis at minime hirtis circumdati sunt. *Hieracii Timgitani* nomine misit D. Robertus Horti Academici Oxoniensis Præfectus dignissimus.

HORMINUM *Syriacum rugoso verrucosoque folio cornu cervinum exprimente Par. Bat. Prodr. & Pluck. Tab. cxciv.*

Ob insolitam foliorum formam cervi cornua referentium rariorum stirpium cultoribus exoptatissimum est hoc *Hormini* genus. *Folia* septem plurave ab una radice in orbem spargit palmum & amplius longa duos transversos digitos lata, aliquot profundis segmentis insecta, pallide viridia, & in patrio solo forsitan velut Æthiopis incana, crassiuscula mollecula tamen, quasique spongiosa, parte sui prona & supina inæqualibus rugis crispata, teneraque lanugine araneosæ telæ instar obducta. E centro horum erigitur *caulis* ramosus pede altior, quem ad singula genicula ambiunt *flores* galericulati purpureo-violacei *Hormino sativa Diosc.* paulò majores, tenui bifurcato stylo sese



HORMINUM
*Rufosum vel rufosagum
folio*

HORMIZUM
Agrostis folio



sele è flore longius exerente. Singulis verticillis subijciuntur bina ex opposito foliola mucronata non rugosa, in ambitu è viridi purpurascencia. *Semina* sequuntur quaterna in quinquifidis obtusis caliculis.

Radix lignosa quidem est & profundè acta, soboles vero nullas creat, sed dum planta se perficit, vivere desinit. biennium pro vita exigit, primo anno folia tantum emittit, ultimo caulescit & semina profert. *Sapor* & *odor* congeneribus similis, sed languidior.

Plukenetius in icone verticillis apposuit foliola inferioribus similia, nos verò ea ab inferioribus diversa observavimus, non rugosa, sed pilis obstructa, quò verò superiora, eo minus hirsuta.

Hujus meminisse videtur *Rauwolfius* in Itinerario cap. xii. p. 113. nomine pulcri *Hormini* generis, angustis lanuginosis profundè sectis foliis.

HORMINUM *Pyrenaicum glutinosum Angurie folio Domini Fagon. Schol. Bot. Par.*


Aceteris *Horminorum* speciebus distinguitur potissimum foliis, quæ amplissima sunt, pingua, rugosa, nervosa, in ambitu variè & inæqualiter sinuosa, crenata, laciniata & nonnihil similitudinis cum *Citrulli* & *Angurie* habentia. Pri-

ma, humi strata, longitudine cubitum, latitudine palmam attingunt, cætera quæ in caule sita sunt, sensim gracilescunt. *Caule* surgit bicubitali & altiore, quadrato, hirsuto, in oppositos conjugatim ramos ex intervallo fisso, cujus fastigia in spicam longam verticillatim disponuntur *Flores* Hormino pratenfi similes, cui & *semina* respondent. *Utriculi* cum utriculus *Hormini asphodeli radice Triumphetti* omnino conveniunt, scilicet bifidi sunt & quælibet pars duobus apicibus instructa est. *Radix* subest vivax & furculosa, in longitudinem exiens, multisque crassioribus fibris donata. *Tota* planta viscida & glutinosa est, ut *Cotus Fovis*.

Ex Pyrenæis montibus, stirpium feracissimus habuit Illustriss. *Fagonius*, cujus munificentie acceptum referimus.

HYPERICUM *frutescens Virginianum tomentosum & incanum.*

Elegantissimo hoc *Hyperici* genere, cultura in arbusculam adolescente, nos pro humanitate sua donavit Nobilissimus ac Reverendissimus D.D. *Henricus Compton* Episcopus Londinensis, qui id cum plurimis aliis ex Virginia acceperat. Non
ali-



HYPERICUM
frutescens tomentosum
et in canum.

IACEA
cum spinosis
Capitulis.






IACEA
Gynoides
alato Caule.

aliter ab *Hyperico supino tomentoso minori Monspe-
liace C.B.* differre videtur, quam quod cultura in
arbusculam excreseat. Ramulis terræ commissis
facile multiplicatur.

JACEA *cum spinosis capitulis purpurea
senuifolia J.B.*

um *Jacea*, quam hæc tabella exhibet à
Joanne Bauhino, breviter, accuratè ta-
men, descripta sit, satis duximus ejus
iconem hic proponere, & lectorem ad
ejus Historiam tom. 3. lib. xxv. pag. 33. re-
mittere.

JACEA *cyanoïdes altera alato caule. Vall.
H.R.P.*

JACEA *peregrina Napifolia, hirsutis capitulis
alata. Plukn.*

Folia huic inferiora sunt ampla, pediculis cari-
natis longis, pilosis appensa, *napi* vel potius
lampfane foliis accedentia, crassiora tamen & ma-
gis rugosa, parte inferna itidem non nihil pilosa &
hirsuta; horum laciniae per margines sunt crenatae,
superiora seu extrema, palmam lata, obtusa, sub-
rotunda. Superiores, quæ absque pediculis ad-

hærent, & in membranaceas alas diducuntur, minus dissectæ, quæ verò in summo, integræ omnino & angustæ. *Caules* protrudit bicubitales in frequentes ramulos divaricatos, pluribus fimbriis seu alis viridibus, glabris, & laciniatis & variè incrispatis cinctos, quæ quo inferiores eò latiores & magis sinuosæ & undulatæ; superiores rarioribus denticellis exasperantur & nonnunquam in spinulas inermes abeunt. Summos caules & ramulos occupant capitula squamosa, squamarum acumine in pinnatas spinulas innoxias fatiscente, quæ explicantur in flores purpureos amplos, *Cyani* in modum diffusos. Succedunt *semina* turgidiora, brevi villo coronata more congenerum.

Datur & alia species priori simillima, ast *caule* humiliori.

JACEA folio *Cerinthæ* purpurascente flore, è rupe *Victoriæ* Schol. Bot. Paris. Tournef.

A radice prolixam fibrarum comam demittente, oriuntur folia copiosa, humi strata, quæ ab angusto principio in latitudinem sesquiunciam sese laxantia, & in acutum mucronem contrahuntur; longitudine sex uncias implent, glabra, glauca, *Cerinthæ* vel potius *Chondrilla bulbosa* Park.
fo-



IACEA
folio
Corinthis

101

LACTUCA *Sylvestris*
Sanguineis maculis
aspera.



40

foliis accedentia. *Caules* emittit vix pedales, non ramosos, folio uno vel altero parte inferiore donatos, sustinentes capitulum ex parvis squamis in spinulam inermem desinentibus compactum, quod in *flores* sese explicat purpurascens, tubulosos, in quinque partes æquales dissectos, cum staminulo prominente. Delapso flore succedunt *semma* congeneribus similia. Habuimus ex munificentia Clariss. *Tournefortii*.

LACTUCA *Sylvestris Italica, costâ spinosâ, sanguineis maculis aspera. Lactuca maxima Italica, sanguineis maculis aspersa. Flor. Bat.*

Planta, quam sub hoc nomine propono, primò mihi innotuit munere Clariss. Dni. *Johannis Boehmii M. D.* exoticarum plantarum cultoris solertissimi, qui ejus semina Venetiis ad me misit. Hæc autem bimula facta, semina sua perficit, usque sese propagat, & semel in horto sata, absque labore conservatur. Ultra hominis proceritatem assurgit, *caule* pollicem crasso, purpurascens, in plurimos ramos brachiato, pilis rigidis undique obsessio. *Folia* infima humi expansa, in orbem digesta, ampla, spithamo

mo longiora, palmâ latiora, per margines undulata, nonnunquam integra, nonnunquam unâ alterâve laciniâ divisa, supernè, saturatè virentia, quâ terram spectant pallida, spinulisque per costâ & majorum fibrarum longitudinem excurrentibus armata, maculis sanguineis seu purpureis quasi cruore perfuso notata; superiora profundius & frequentius laciniata, inferiorum more aspera & maculata; quæ in summis ramulis integra sunt & glabra, in acutum mucronem terminantia, atque ad margines pilis tantùm brevissimis, quasi spinulis donata. *Flores* ex calycibus squamatis conferti, lutei, in extremis ramulis veluti in spicas dispositi, ad solem circa meridiem expansi, aliàs clausi. Hos excipiunt *semina*, compressa, nigra, villo coronata. Tota planta *lacte* amaro turget, & *odorem* gravem & virosū spirat atque congeneres *Lactucæ sylvestris* species.

Hujus meminisse videtur *Delachampius in Hist. Lugd. tom. 1. lib. 5. pag. 547.* circa finem, ubi de *Lactuca sylvestri*. „Alterius *Lactucæ sylvestris* „historia & pictura extat apud *Penam*, quæ omnibus partibus ad *Lactucam* accedit, vel ad *seri-* „*dem latifoliam*, vulgò *scariolam*, *Lactucæ* similimam. Succo lacteo tota manat, adeò ut præ „ejus copia soporifero sit odore tetro & ingrato, veluti

p

LEUCOIUM

Lusitanicum

purpureum



p. 193.

LEUCOIMUM
Thlas pios facie.



„ veluti opium. *Caulis* bicubitalis glutinosus : *flo-*
 „ *res* Lactucæ : *Semen* aliquanto minus nigricans.
 „ ea , inquit *Lobelius* , in agro Romano *foliis ni-*
 „ *gris maculis variata* , conspicitur.

LEUCOIUM *Lusitanicum purpureum foliis ele-*
gantèr dentatis. Par. Bat. pr.

Ex seminibus è Lusitania missis nata est elegans
 hæc Leucoii species , cuius prima *folia* ad mo-
 dum *Dentis leonis* erant laciniata , quæ caulem am-
 biunt , alterno ordine absque pediculis adnascun-
 tur , biuncialia , profundè dentata , & in cuspidem
 acuminata , *caulis* ad altitudinem pedalem attolli-
 tur , striatus , in ramos , & hi rursus in alios di-
 varicatus , quorum summitates abeunt in *flores*
 spicatos rarius dispositos , tetrapetalos , rubentes ,
 ex perianthio oblongo , hirsuto , prorumpentes.
 His succedunt *siliquæ* parvæ articulatae sapore acri.
 Ex siliquis , & foliis laciniatis videtur potius ad
Erucae species releganda.

LEUCOIUM *Tblaspios facie , flore albo. Flor.*
Bat.

Radice nititur exili fibrosa. *Cauliculi* statim à
 radice sunt ramosi , virides , nunc erecti ,
 B b nunc

nunc procumbentes. *Folia* singularia, *Leucoio marino parvo folio virente crassiusculo* J. B. similia, sed paulò minora, & in obtusiorē ambitum tendentia; *flores* quoque minores tetrapetali, albi, *calyci* quadrasido insedentes. Excipiunt *filiquæ* duriusculæ, teretes biunciales & longiores, bicapsulares, in quibus *semina* fulva, parva, oblonga ex tereti nonnihil depressa *Sapor* subamarus, subacris *Thlaspiis* instar; *Semina* collegi in horto RR. PP. *Ordinis St. Franc.* in vico Sti Honorii Parisiis, ubi planta succrevit ex seminibus, ni fallor è Candiâ transmissis. Annua est planta, & forsân varietas tantum *Leucoii marini parvi, folio virenti crassiusculo* J. B.

LILIUM *Americanum puniceo flore, Bella donna dictum.*

Ex radice bulbacea rotunda, *Tulipa* duplo majore, foris membrana fulvescente tecta & aliquot fibris ad basin donata, prodeunt *folia* viridia, *Narcissinis* forma & substantiæ lentore similia, latitudine unciali & sesquiunciali, quæ elapso flore in longitudinem dodrantalem extenduntur. Inter quæ non medius, sed relictis ad latera foliis, nudus & liber erumpit *scapus* pedalis, glaber, ro-
run-

p. 194.



LILIUM
Polla Donna.



LILIUM *africanum*
Polyanthos.

rundus, calamo scriptorio crassior, sensim gracilescens, è cuius theca membranacea bivalvi prorumpunt *floræ* terni, quaterni aut plures, sex petalis constructi, ex principio angusto fistuloso oblongo oriundi, eleganter punicei, marginibus & umbone pallidulis, *Asphodeli liliacei* floribus similes sed majores, quorum medium occupat stylus nutritivus & sex stamina concoloria incurvata, apicibus lubeis coronata.

Ex insulis Caribæis provenit, unde ad nos delatum, flores protulit, quibus evanidis semine viduum emarcuit. Quod tamen cæteris sui generis proculdubio simile, nobis vero hætenus nondum visum.

LILIUM *Africanum humile longissimis foliis polyanthos, saturato colore purpurascens. H. L. B. in App.*

Pulcherrimum & gratum oculis atque naribus est *Lilium* hoc Africanum, quod à *Narcisso pumilo Indico polyantho Cornuti* non multum differt, quamquam ad *Lili* potius quam ad *Narcissi* familiam pertinere videatur. *Bulbum* fert carnosum, rotundum, amplum, ex quo prodeunt *folia* proluxa, lata, narcissus similia,

flexuosa; *Caulis* spithamo vix altior sustinet quinque & aliquando decem *flores*, quæ in umbella dispositos, è vagina membranacea bivalvi prodeuntes, qui colore saturatè purpurascenti nitent. Datur etiam varietas flore dilutè purpurascente, quæ *Lilium Africanum humile longissimis foliis polyanthos diluto colore purpurascente* H. L. B.

Differt à *Narcisso Indico pumilo polyantho Cornuti*, *foliis* (quæ in illo palmum longa, pollicem lata sunt) latioribus & multò longioribus; *caule* altiori, & *floribus* paucioribus, 19. vel 20. numerat *Cornutus*, cum rariùs dimidia pars in hac specie observetur.

Cùm numerosa admodum sit *Lychnidum* à Botanicis descriptarum familia, antequam novam illi adjungendam describere aggredimur, varietates aliquot adnotare libet, ne pro diversis speciebus habeantur.

LYCHNIS *viscosa*, *floribus foris purpurascen-*
tibus, intus albis CB. Hæc ipsissima mihi vide-
 tur, quam *Clusius* in *Hist.* p. 294. absque ad-
 jecta iconè descripsit, sub nomine *Muscipula se-*
cunda, quamquàm in *staminibus* *florum* de-
 scri-

scribendis diversa sit. Nam idem staminum numerus & apiculorum color, non semper observatur. Iconem hujus in autoribus nondum reperire licuit.

LYCHNIS *viscosa foliis brevi lanugine aspersis*
 CB. Hæc priori similis est sed *folia* sunt paulò majora; *flores* albi petalis omnibus ad umbilicum usque dissectis & in contiguum orbem coactis, albis seu niveis, extus tamen purpurascentibus, nullo interstitio, seu hiatus inter lacinias petalorum conspicuo. Hanc *Clusius* descripsit pag. 293. nomine *Lychnidis sylvestris* è femine natæ, primæ. Ipse vero suæ adscripsit flores prorsus niveos; nobis color intus niveus, extus incarnatus apparuit. Stamina habet numero & colore non semper eadem, nunc terna, quina, & terna cum totidem aut pluribus majoribus & brevioribus priora cingentibus, apiculis diversi coloris ornatis, nunc pendulis, nunc erectis.

LYCHNIS *viscosa floribus foris purpurascentibus intus albis, caulibus & capsula glabris, floribus orbiculatis.* A præcedenti differt glabritie seu levitate, & floribus altera parte incarnatis & orbiculatis, nullo inter petala hiatus.

LYCHNIS *viscosa floribus foris purpurascen-
tibus, intus albis, foliis brevi lanugine aspersis,
& florum petalis angustioribus, hiatu inter laci-
nias & petala apparente seu intercedente.*

Hæ quatuor præcedentes *Lychnides* possunt uno nomine vocari Italica, nempe,

1. **LYCHNIS** *viscosa Italica floribus orbicu-
latis, albis, extus incarnatis, subhirsuta la-
tifolia.*
2. *Eadem glabra. Hæc varietas est prioris
primæ.*
3. **LYCHNIS** *viscosa latifolia subhirsuta pe-
talis invicem nonnihil recurvis.*
4. *Eadem angustifolia, florum petalis angu-
stioribus. Cum tertia omninò convenit,
nisi quod petala & folia sint nonnihil an-
gustiora.*

Flores harum quatuor *Lychnidum* exhalant sua-
vem sed debilem odorem. *Radice* sunt perenni,
florent Junio, & Julio perficiuntur. *Seminibus* de-
lapsis & *caulium* nodis facilè propagantur. Pri-
mam speciem vocat CB. *Lychnidem Visc. Fol. bre-
vi lanugine aspersis.* Secunda primæ varietas est.
Tertiam vocat CB. *Lychnidem visc. fl. foris purpu-
rascent. intus albis.* Quarta varietas est tertiæ. Re-
ctè,

7-105.



Etè, inquit *Raius* *Lychnidem* primam & tertiam inter se parùm differre. Nos addimus inter omnes, esse varietatem, non vero specie esse diversas.

LYCHNIS *Ocymastri folio, flore viridi.*

Radice nititur perenni, crassiuscula, paucis fibris donata. *Caulem* emittit singularem (interdum plures) cubitalem, teretem, geniculatum, hirsutum, ramosum; ad singula genicula, bina è regione oriuntur *folia* mollia, subhirsuta, *Ocymastro* persimilia, absque pediculis cauli adnata; inferiora non nunquam pediculis biuncialibus appensa sunt, sesquiunciam lata, rotundiora plerumque quàm quæ icone expressit sculptor uti & superiora. *Flores* in summis caulibus & ramulis è foliorum alis exeuntes, pentapetali, parvi, petalis angustis in medio bifidis, *coloris* intus ex albo herbacei, extus ex viridi flavescentis, cum quinque staminulis, apicibus concoloribus, coronatis. *Calyx* oblongus, striatus, hirsutus. *Semina* in capsulis turbinatis, coloris cinericei; floris colore ac parvitate à cæteris speciebus facillimè distinguitur. *Semina* in famigeratissimo *Fagelii* horto collecta, & ut memini ex Lusitania transmissa.

MAR-

MARRUBIUM *Dictamni spurii*
foliis & facie. An Pseudodictamnus His-
panicus folio rugosiore Schol. Bot. Par.?

Ex radice simplici plures fibras emittente, oriuntur caules frequentes, pedales, ramosi, quadrati, lanuginosi, quibus ad singula genicula adstant folia amplitudine ad *Pseudo-dictamnium acetabulis moluccæ* C. B. facie vero seu habitu, ad *Marrubium album* accedentia, ast minora, magis crenata & rotundiora. Caulium genicula multiplici serie verticillatim cingunt acetabula densè coacta, brevibus vel nullis pediculis suffulta, *Pseudo-dictamno* minora, expansa, rugosa & per margines crenata. Ex horum singulis oritur flos tubulosus, galeatus & labiatus, intus elegantissimis purpureis lineolis undique inscriptus, extus in rubro pallescens, galeâ constans bifida erecta, apice lanuginoso & labello trilobato. Semina fert angulosa fusca, quaterna (ut plurimum terna) in singulis calyculis.

MAR-



MARRUBIUM
Dictamnifolium
Solus & facie

p. 201



MARRUBIUM *album rotundifolium Hispanicum maximum Schol. Bot. Par.*

O*cymastro Valentino Clusii* adeò similis videtur hæc planta, ut à plurimis pro eâdem habeatur. Ast *caulibus* quadrangulis ex viridi subincanis altius assurgit, *folia* supra saturatius virent & pediculis longulis pendent minus rotunda & in modicum mucronem obtusum terminantur. *Calyculi* è quibus prodeunt flores, in decem strias totidemque apices stellatim expansos explicantur. *Flosculi* pluribus in verticillis ab imo ad summum per interstitia dispositi, quorum pars superior seu galea trifida est & retroflexa, ad extremas oras nonnihil lanuginosa tota alba, intus duabus lineis sanguineis per longitudinem inscripta. Labium bifidum auriculatum, albidum; guttis ac lineolis ex albo & sanguineo variis eleganter insignitum. Galeam in ascensu comitantur stamina aliquot crassiuscula, rigida, rubropallidula, absque apiculis. *Semina* succedunt angulosa, fusca, bina, terna, rariùs quaterna in eodem vasculo.

Quoad verticillorum dispositionem, & utriculos in decem apices aculeatos terminantes, cum *Marrubio vulgari albo C. B.* convenit, cui debet & proximè jungi, *odor & sapor* ut in cæteris Marrubis.

Cc

NA-

NASTURTIIUM *Africanum*
foliis ternis facie Christophoriana Par.
Bat. Pr.

Inima fronte *Christophoriana* dixeris , si
florem & folia inspexeris , sed postquam
filiquas bicaſulares protuleris , *Nasturtium*
 adjungeres , eoque magis quòd ſaporem acrem &
 ſubacidum ad *Nasturtium* nonnihil accedentem ,
 præ ſe ferat , & *filiquas* ad tactum diſſiliant.
Radice eſt fibroſa alba , è cuius capite prodeunt
cauliculi plures ramiſi , dodranteales & longiores ,
 glabri , ex viridi nigricantes , inferius teretes ſu-
 perius anguloſi , vario flexu nunc terram verſus
 reclinari , nunc ſe ruruſ erigentes. Hiſ per lon-
 guſcula intervalla in petiolis ſeſquiuncialibus ad-
 ſtant *folia* tripartita *Chriſtophoriana* ſegmentis non-
 nihil ſimilia , per ambitum dentata & in mucro-
 nem deſinentia. *Flores* obtinet parvos pentapeta-
 los , nutantes , brevi veluti in ſpica diſpoſitos , va-
 ridantes , nunquam expansos , ſed ex petalis qua-
 ſi conniventibus conſtatos , è calyce parvo qua-
 drifido ortos. Sequuntur *filiquas* bicaſulares ſu-
 perdigitales in mucronem deſinentes , valvis per
 maturitatem vel levi tactu cum fragore diſſi-
 lien-

NASTURTIIUM foliis tornis
facie Christophoriana.

p 202.





NASTURTIUM
Pyrenaeicum aquaticum



lientibus, seseque convolvantibus more congenerum. *Semina* succedunt depressa, oblonga, flavescantia.

NASTURTIIUM *montanum Affari folio Bocconi.*

Hoc *Nasturtium* idem est quod *P. Boccone* in descriptione plantarum rariorum Siciliæ, vocat *Nasturtium montanum Affari folio*, & *Jac. Zannoni* in Historia Botanica exhibuit sub nomine *Nasturtii Alpini palustris rotundifolii*. Flores in summis caulibus fert tetrapetalos albos, cum staminibus pallidis. *Calyx* etiam tetraphyllus parvus, pallidè virens.


NASTURTIIUM *Pyrenaicum aquaticum latifolium purpurascente flore. Domini Fagon. Schol. Bot. Paris.*

E radice albente, multis fibris capillata, perenni, proveniunt folia per terram sparsa, elata, pinnis rigidis, cæteris congeneribus amplioribus, subrotundis, per margines quasi crotis, binis ex adverso costæ intermediæ carinatae adherentibus, unica in summo impari amplissima. *Caules* erigunt sphaerico longiores, teretes nonnihil

hirtos & versus summum striatos, ad quorum summitates spicata veluti serie prodeunt *flores* pallidè purpurascens, tetrapetali, ampli, cum staminibus intus flavescentibus, *calyce* tetraphyllo pallidè virente, & petiolis tenuibus viridantibus suffulti; quibus post floris defluxum, elongatis, rigidioribusque & validioribus factis insident *siliquæ* longæ in duas valvas cum membrana intergerina dehiscens, fundentesque *semina* cæteris congenera. Floruit horto nostro, mense Majo, & Junio semina perfecit.

NIGELLA flore simplici pallescente, petalorum basi longissima.


Ex radice recta fibras ad latera emittente, surgit *caulis* striatus, glaber, viridis, in plures ramulos divaricatus, & hi rursus in alios, quorum unicuique insidet *flos* sat amplus è cæruleo pallescens, petalis ex angusto principio & quasi longo petiolo in latitudinem ferè circularem se laxantibus & in mucronem turbinatis, nullo perianthio seu foliorum barbula suffultus. A medio floris exit *vasculum seminale* angustum, quinquifidum, in summo corniculatum, cui adstant octo alia foliola bifida, super ipsis petalis expansa, uti in *nigella*
Cre-



NIGELLA
*Florae simpliciter
pallidiflorae*

p 101

NYMPHÆA Indica
Faba Egyptia



Cretica C.B. quorum unumquodque tribus staminibus apiculatis stipatur. *Folia* sunt tenuia, laeviuscula, viridia, absque pediculis ad ramulorum exortus cauli adnata.

Petalis angusta & longiori basi donatis, longiusque à se invicem remotis, à congeneribus præcipue discriminatur hæc species.

NYMPHÆA *Indica Faba Ægyptia dicta, flore incarnato. Nelumbo Zeylonensium.*

Plantam hanc esse veram *Fabam Ægyptiam veterum*, nullus jam restat dubitandi locus. Tam exactè enim descriptioni *Theophrasti* respondet, ut paucissimæ nobis cognitæ sint plantæ quæ magis ad amussim quadrant cum descriptionibus à veteribus traditis, unde si quis de hac litem movere velit, eodem jure & nullas ab antiquis descriptas nobis cognitæ esse affirmare possit. *Clusius* hanc esse *Fabam Ægyptiam Dioscoridis*, modo *Nymphææ* foliis similem, ex solo fructu asserere non veritus est. Et adeò mirandâ sanè & à cæteris omnibus diversâ conspicitur formâ, ut ex illo tutò satis potuisset judicium ferre. Hunc verò uti notum ac à pluribus descriptum missum facio, ut ostendam folium cæterasque partes non minùs

veterum sententiæ accedere. *Folium galictum* Thessalicum magnitudine æquare tradit *Theophrastus*, nec minus sæpius observavimus, latitudinis scilicet sesquipedalis. Est verò glabrum, crassum, circinatæ rotunditatis, plurimis nervis, instar tot radiorum, è centro exeuntibus, qui versus peripheriam in duas partes finduntur & hi sæpè rursus in duas alias, qui tandem in tres minutissimas divaricantur propè marginem. *Caulis* digitum crassus, secundum aquæ ubi nascitur planta profunditatem, longus, tenuissimis & brevissimis spinulis ubique exasperatus. Videtur insuper folium quasi perforare, & nervorum superiore parte excurrentium centrum constituere. *Flos* ut rectè *Theophrastus*, roseus seu incarnatus, duplex, *papaveris* magnitudine, imò *Nymphææ albae* flori petalorum & staminum dispositione simillimus. In aquis Ceylonæ stagnantibus abundat. De radicis & fructus esu & in medicina usu, nihil ab autore relictum invenio, quamvis omni proculdubio de his & observationes & experimenta fecisset. Cæterùm describitur & depingitur in Horni Malabarici tom. 11. tab. 31. nomine *Tamara*.

O R-

/

.

r

.

p. 27

Orchidi affinis.
EPIDENDRON Confusum
folio crasso Silene.



ORCHIDI AFFINIS *planta parasitica, folio crasso sulcato. Viscum arboreum flore albo specioso Americanum, folius forma siliquarum Mexii. Pluken. Tab. 117. Epidendron Curassavicum folio crasso sulcato vulgò.*

Novam & admirandam hanc plantam visci nomine exhibuit Clariss. *Plukentius*, eò quòd arborum ramis adnascatur. Nobis ejus figuram in Horto *Fageliano*, ubi floruit, ad vivum factam, & descriptionem addere è re esse duximus.

Novam verò huic generi nomen imponere non verum sumus cum & radicibus *Orchidi* spurio dicto, & florum forma à nonnullis *Orchidibus* speciebus non multum abluat. Præcipue verò cum & alias hujusce generis species ex America delatas possideamus, quæ non flore tantum *orchidis* similitudinem, apprimè referant, sed & foliis latis, liliaceis, in aliquibus speciebus maculis purpureis insignitis, iisdem propius accedere videantur. Cæterum radices agit plures ligneas, geniculatas, crassas, quibus arborum ramos amplectitur, ex usque succum haurit nutrimentum. *Folia* profert plura,
ra,

p. 209

ORCHIS
Ambauensis.



prae

ORNITHOGALUM

virgatum



ORCHIS *Amboinensis floribus albis fimbriatis.*
Flos Susannæ Rumphii. Par. Bat. prodr.

Elegantissima hæc *Orchidis* species, testiculatarum tribui censenda est. Folia inferiora sunt breviora & in acumen desinunt, caulesque foliorum *Orchidis rotundi* instar *Delachampii*, amplectuntur. Superiora, longiora, nervosa, viridia, glabra. Caulis dodrantalis & pedalis, tenuis, versus summum in ramulos, seu florum pediculos, ex foliorum sinibus ortos, divisus. Unusquisque autem ramulus seu pediculus coronatur flore albo, constante ex galea integra, lata, subrotunda, cum duabus alis fimbriatis, expansis & angusto labello longius producto. In medio apparet rictus amplius, alia eadem galea circumscriptus. Aversa floris parte prominet calcar tenue, longissimum. In hortis nostris nondum floruit, icon verò ad figuram à Clarissimo Rumphio, Plinio Indico dicto, ex Java missam, facta est.

ORNITHOGALUM *Africanum flore viridi altero alteri innato.* Par. Bat. pr.

Ab *Ornithogalo luteo virescente Indico Cornuti* differt radice minore, magisque rotunda;
Dd fo-

foliis duplo angustioribus, magis flexuosis, & in tenuiorem apicem exeuntibus. *Caulis* etiam erigit graciliores, *floribus* minoribus onustos; *flores* rarius dispositi, pauciores, è petalis minoribus & angustioribus conflati, uti etiam fòliola è quorum cavitatibus emergunt, cæteris colore scilicet & forma conveniunt. Omnium partium parvitate præcipuè à prædicto *Cornutiano* differt.

PALMA *Americana crassis rigidisque foliis.*

Palma hæc inter plurimas ejusdem generis species in horto *Fageliano* nuper culta, fundit gummi album insipidum, unde vulgo *Palma gummifera*, vel *Resinifera* vocabatur. *Caudicem* obtinebat capitis humani crassitie pedem altum, scabrum, fuscum; è cujus summo prominebant quina & postmodum septena & plura *Folia* rachi insidentia, modo bina è regione modo alterna, rigida, dura, splendentia, gratè viridia, transversum digitum lata, palmam longa, per margines crebris dentucellis exasperata. *Pediculus* seu *rachis* brevibus aculeis ex opposito plerumque sitis erat armatus, & sub-

hir-

PALMA Americana
Crassis & rigide foliis.

N. 270.



p. 21.

PENTAPHYLLUM
Cassiacum Maus



721

PENTAPHYLLUM
Callibotrys minus.



hirsutus, seu raro tomento obductus. *Semen* mihi nondum visum est.

PENTAPHYLLUM *Cassubicum foliis viridibus profundè sectis & majus. Pentaphyllum foliis viridibus & majus. Flor. Bat. potius Tormentilla Cassubica major.*

A Tormentilla vulgari differt, primò *radice* tuberosa subrotunda plurimas fibras demittente, nec rectà nec in obliquum in terram acta. 2. Omnium partium magnitudine, *foliorum* præcipuè, quæ vulgari foliis duplo sunt majora & crassiora. Hanc & sequentem communicavit Clariss. Breynius in re Botanica versatissimus.

PENTAPHYLLUM *Cassubicum foliorum segmentis profundè incis, serratis & minus. Flor. Bat.*

Hac etiam ex *radice* tuberosa subrotunda, densam fibrarum demittit comam. *Folia* exeunt plurima humi strata, in septem, octo & novem portiones dissecta, profundè serrata, pediculis semipedalibus insidentia, viridia, molli hirsutic pubescentia, parte inferna magis conspicua. *Caules* tenues, ramosi procumbentes, duobus foliolis un-

cialibus, angustis, acutis, ad ramulorum exortus donati. Flores in summitatibus pentapetali, lutei, pediculis tenuissimis sesquiuncialibus suffulti, calyci è quinque segmentis composito, quem alius ex totidem segmentis angustis conflatus obvallat, insidentes. Forma refert *Quinquefolium erectum foliis profundè sectis, subtus argenteis, flore luteo* J. B. Caules verò tenuiores; folia duplo & triplo majora, nec subtus ut in illo, argentea.

PORTULACA *Corassavica angusto longo lucidoque folio procumbens floribus rubris* Par. Bat. pr.

Ex seminibus Curassavia delatis & horto Fage-
liano terræ commissis, primum orta est nova
hæc & elegans *Portulacæ* species. Caulem emittit
dodrantalem & non rarò longiorem, ramosum,
calamo anserino æqualem, glabrum, subruben-
tem, infirmum & terram versus reclinatum; quem
ad genicula ambiunt folia ex opposito bina, aizoi-
dea, glabra, sesquidigitum longa, ex angusto
principio, quo cauli adnascuntur, paululùm di-
latata, & in mucronem acutum sensim excurren-
tia, per margines æqualia. Ad ramulorum exor-
tus pediculis uncialibus exeunt flores singulares,
cali-

PORTULACA ^{p. 42.} *Corallifera*
Angusto longo
lucidoque folio.



PORTULACA

Cornifolia
Capparis folio.



calici ex quinque angustis segmentis composito infidentes, pentapetali itidem petalis mucronatis, colore elegantè rubro nitentibus. Horum medium occupat thyrsus staminum luteorum cum apicibus concoloribus. Succedunt vascula feminalia subrotunda, quæ per maturitatem transversim seu horizontaliter disrupta, semen effundunt pusillum.

PORTULACA *Corassavica procumbens Capparidis folio flore muscoso, capsula bifurcata.*

E radice fibrosa albente, plurimos fundit cauliculos, humi fusos, cubito longiores, portulacæ sativæ similes, è viridi nonnihil purpurascen-
tes, crebrè geniculatos ea parte qua rami & flores exeunt, depressos, tumidos, & valdè ramosos. Folia ad genicula oriuntur alterna orbiculata nonnihil oblonga, viridia, crassa, Capparidi paria, limbis seu marginibus rubentibus, petiolis semiuncialibus crassis appensa. Quæ quo propius radici adstant majora, quæ ramulos ornant minora & angustiora & in rubentem parvum mucronem desinentia. Flosculi pentapetali parvi rubentes, cum staminibus concoloribus, ex geniculis seu ramulorum sinibus mediantibus sive infidentibus

bus parvis oblongis quasi caliculis , qui facessunt in vascula depressa oblonga , una parte viridia , succosa , summa rubentia & bifurcata , horizontaliter rumpentia. Quorum pars inferior folliculum refert membranaceum tenuem , includentem *semina* depressa fusco nigricantia ; quaterna aut quina : hæc capsulæ pars juncturis seu sinubus ramorum profundius inhæret , ut non nisi disruptis seu expansis ramis exiri possit. Seminibus autem omnino maturis & rupto operculo , folliculus inferior exarescit ut semina in quadam quasi fovea appareant. Superior pars sive operculum est crassum virescens , & ubi folliculo inferiori jungitur nonnihil rubescit , ejus summus bifida & quodammodo bifurcata apparet.

PORTULACA *Corassavica lanuginosa Psyllii*
folio erectior & elatior , flore dilatiùs rubente.
Par. Bat. pr.

Radix numerosis capillata fibris , cauliculos promittit plures , ramosos , rotundos , lanuginosos , pedales & altiores , ex rubro viridantes , quos inconcinno ordine , à summo ad imum vestiunt *folia* angusta , subrotunda , digitalia & sesquidigitalia , in mucronem acutum desinentia , *Psyllii* foliis

PORTULACA *Corymbosa*
lanuginosa erecta.

p. 200



f²

PORTULACA.

Coralliflora
Lanuginosa
procumbens



liis quoad formam respondentia, est aizoïdea seu crassa & succulenta, tenera etiam & propria gravitate sæpe reclinata. Ad horum exortum, præcipuè verò circa ramorum summitates, lanugine copiosa, & quidem in specie minore magis proluxa, pubescit. Summitates in plurima folia expanduntur, è quibus absque pediculis emergunt *flores phænicei* seu coloris in purpura dilutè rubentis, pentapetali, petalis subrotundis in parvum mucronem desinentibus, cum stella lutea ex staminibus conflata instar corollæ medium occupante. Hos excipiunt vascula seminalia parva subrotunda, per medium horizontaliter rumpentia, quæ *semina* fundunt exigua nigricantia.

PORTULACA *Corassavica lanuginosa procumbens.* *Portulaca Corassavica lanuginosa Psyllii folio humilior & supina, flore saturatiùs rubente.*
Par. Bat. pr.

Priori congener est hæc species & ejusdem insulæ incola. Nativo solo vix palmarem excedit magnitudinem, & lanugine seu tomento crasso & villoso tota obducta est. Læto vero & benè subactò solo commissa semina, cauliculos produ-
cunt,

p 217

RIZOPHORA
Zeylanica.




RIZOPHORA *Zeylanica Scammonii folio singulari radice rotunda. Kathuwala, Zeylan. Karu - Kasil. Hort. Mal. Tom 7.*

Radix rotunda est & carnosâ, coloris ex fusco castanei, inultis in superficie tuberculis extantibus inæqualis, (Tubera J. B. non malè exprimens) ex quibus demittuntur longa tenuia filamenta. Ex hac prodeunt viticuli tenues, sarmentosi, convolvulacei, scandentes & vicina quævis amplectentes, pallidè puniceis stris eleganter virgati. *Folia* singularia pediculis binncialibus & longioribus appensa, ad *Scammonii* folia forma accedentia, in mucronem autem desinentia, nervis novem, decem vel pluribus majoribus ex pediculi insertionem, quasi è centro prodeuntibus & inde in marginem ductis, inscriptis, minoribusque transversis eleganter cancellatis. Ad genicula, è regione exortus foliorum, nascuntur tubera pugni magnitudine, superficie iudem granulata, quæ terram attingentio, radices paritèr agunt. Plantæ hujus mentio fit, in *Miscellan. German. Decur. 2. An. 3.* nomine *Kathuwala*, seu *Arachidne Indica* supra

& infra terram glandes proferentis edules gratos
& dulces.

SATUREIA *Virginiana*, floribus in
summitate. Hort. Lugd. Bat. Pulegium
Virginianum, alius, *Serpentaria Virginia-*
na. Rasi. Hist.

 aules profert nova hæc & rara *Satureie*
species, ex fibroso cespite plures, peda-
les, ramosos, virides, (nisi ad genicula
& summitates, ubi ex viridi rubent) fo-
lia angustis, conjugatis, saturatè viridibus, alter-
na parte pallidioribus, *Asparagus Zeylanicus*, feta
Chamepityi Austriacæ Classi similibus, seu angustio-
ribus, glabris. In summis ramulis; qui semper
in tres dividuntur (veluti *Majorana*, *Dictamnus* &
aliis contingit) capitula profert squammata, pal-
lidè virentia, ad quorum basin circumstant foliola
angusta; inter quæ duo majora, qualia in cauli-
bus conspicua sunt. Ex his capitulis emittunt flo-
res galericulati, galea cordiformi, cum labio tri-
fido; in tres æquales partes diviso, ut flos tetra-
petalus videatur, coloris pallidè purpurascens, la-
beo interna parte punctis puniceis asperso.

Qui-



SATUREIA
Virginiana.

—
P. 249.

pt. 19

SCABIOSA *Africana*
Frutescens.



Quilibet flos infidet calyci oblongo, quinquifido, ex quibus capitula sunt conflata. Semina nondum perfecta. Sapor subacris & aromaticus, cui amarities juncta est, ad saporem *Serpentariae Virginianae* accedens, sed languidior. Odor debilis.

Cæterum hæc planta non est illa *Serpentaria Virginiana* in officinis hoc nomine prostant, quæ vera ac legitima *Aristolochia* species est.

SCABIOSA *Africana frutescens rugosis & crenatis foliis, capite rotundo. Par. Pat. pr.*
Scabiosa frutescens Africana maxima.

Fruticosum hoc *Scabiosæ* Africanæ genus, radicem habet amplam in crassiores fibras tanquam brachia diductam, multos annos, si per hyemem in hypocauftis conservatur, perennantem. Caulem facit ultra humanam proceritatem, rotundum, lignosum instar fruticis, qui in ramos aliquot absque ullo ordine divaricatur. Folia quæ ab radice germinant lata sunt, crassa & rugosa, per margines crenata & subinde laciniata, ad *Primulæ* veris folia formâ accedentia. Quæ caulibus & ramis copiose adnascuntur, minora sunt minùs obtusa, nullis pediculis appensa, inferioribus similia. E ramulorum extremitatibus sese erigunt pediculi pal-

mares & sesquipalmares, quorum unusquisque *florem* gestat forma flori *Scabiosa peregrina* similem, ast longè majorem, coloris in pallido cærulei, qui sæpe prolifer est, & alium matre longè minorem ex pediculo unciali patit. *Flores* exteriores (uti omnibus *Scabiosis Africanis*) ampli sunt & quasi galericulati. Constant verò & fundo fistuloso oblongo, qui in tres lacinias majores expanditur, quarum intermedia maxima est & duæ laterales minores; circa tubuli seu basis finem, adstant & duæ alæ exiguæ instar auricularum.


Altera etiam datur species humilior, capitulis, rotundis, *floribus* ejusdem magnitudinis, & formæ, pallidè purpurascens ex cæruleo coloris, ast elegantioris & paulo saturatoris quam in *Africana frutescente*. *Folia* saturatiùs virent, inferiora duos pollices lata sunt & incisa, è basi angusta in obtusum ambitum tendentia, ad radicem copiosissima; quæ ad nodos caulium angustiora sunt, breviora, profundè incisa quasque pinnata, bina semper è regione. *Caulis* plurimos de se spargunt, non verò lignosos, quo, atque floribus saturatiùs purpureis, foliis magis viridibus & profundius dentatis, à majori frutescenti differt.

Tota æstate viget & floret & seminibus, ramulis propaginibusque feliciter multiplicatur.

SCA-

p. 331

SCABIOSA
*Glabra carnegis
folius virentibus.*



*SCABIOSA glabra carnosis foliis virentibus ,
flore ex caeruleo purpureo. J. B.*

Planta , cujus iconem hic exhibemus , proponitur in Par. Bat. prodromo , nomine *Scabiosæ Africane perennis dissectis foliis lucidis glabris*. Cum enim è seminibus Africanis succreverit , nec nobis antea visa fuerit , credidimus esse plantam novam , nec ab ullo auctore descriptam , ideoque illam depingendam curavimus. Postea verò , cum & alias , quamvis paucas , plantas Europæas è seminibus ex Africa delatis natas observaverimus , statim orta est suspicio , illas omnes originem suam semini Europæo in Africam cum frumento transmissis debere & *Scabiosam* etiam hanc ab aliquo autore esse traditam , unde lectis & collatis inter se descriptionibus , invenimus descriptionem *Scabiosæ glabræ carnosis foliis virentibus , flor. ex caeruleo purpureo J. B.* huic respondere , nisi quòd hæc altius multò assurgat , & copiosiora producat folia , quod lætiori hortorum Belgicorum solo tribuendum est. Quo circa synonymum J. B. adjectimus , ut nostrum evitet Lector errorem. Ceterum in lætiori solo folia lucent , in steriliore minus , sed parùm hirsuta sunt , hinc *Scabiosa*

*Africana perennis dissectis foliis subhirsuta flore
purpureo. Par. Bat. prodr. quæ prioris tantum
varietas est.*

SCABIOSA *stellata folio laciniato minor sive
maritima C. B. P. Scabiosa minor Hispanica
Clusii.*

Scabiosa hæc è seminibus ex Lusitania acceptis,
Senata, à figura & descriptione *Scabiosæ cum pul-
cro semine minoris* J. B. plurimum discrepat, li-
cet Clariss. Rains, utramque synonymiam faciat.
Johannes Baubinus enim *scabiosæ* suæ radicem sim-
plicem & lignosam, paucis & iis exiguis quidem
fibris capillatam attribuit, nostra è contrario nec
simplicem nec lignosam, sed ex demissa albarum
fibrarum coma conflata annuam obtinet radicem.
Nec foliis magis conveniunt; tenuiter etenim
dissectis, superiorum *Columbariæ Scabiosæ* modo,
pilis obsitis depinxit & descripsit suam J. B. huic
verò folia conjugata, pallidè virentia, inferiora
non omninò dissecta, sed in margine profundius
dentata & in mucronem abeuntia, superiora altius
incisa seu laciniata; ex horum sinibus conjugato
ordine exurgunt ramuli, quorum summitates co-
ronantur *flosculis* pallidè cæruleis, monopetalis in
quin-



SCABIOSA
Stellata folia
Laciniato minor.

p. 222

p. 227

SCABIOSA *Prolifera*.



quinque æqualia segmenta divisis, congeneribus similibus, in globosum caput collectis, cujus basin cingunt aliquot viridia foliola, quæ dum semina perficiuntur deorsum reflectuntur. Sequuntur *semina* more *scabiosæ stellatæ* umbilico membranaceo rigido; tenui, transparente, amplo, quasi acetabulo coronata, in cujus medio umbilicis alius parvus in quinque aut sex crenas divisis, crenis in cuspidis stellatum expansos terminantibus. *Caulis* palmaris nonnunquam pedalis, rotundus, erectus, pilis obsitus. Planta hæc omnino similis est *Scabiosæ Hispanicæ majori Clusii*, crescendi scilicet modo, foliis, floribus & seminibus; ast humilior est & omnibus partibus minor.

SCABIOSA *stellata humilis integrifolia prolifera*. *Scabiosa Indica prolifera*. *Schol. Bot. Par.*

Eradice pluribus longis fibris capillata, assurgunt caules palmares, ramosi, subhirsuti, foliis integris, conjugatis, pallidulis, parùm aut nihil crenatis vestiti.

Flores obinet albos aut subsulphureos, magnos, summo caule & ramulis, absque pedicellis.

lis adnatos, quorum flosculi exteriores, qui reliquos ambiunt, majores sunt, ut in *Scabiosa Africana frutescente*. E tubo floris sese exerunt stamina brevia, apicibus luteis coronata. Succedunt *semina*, brevia, crassa, circulo membranaceo cincta & in medio stellata, instar seminum *Scabiosæ Hispanicæ Clusii*. Ramus conjugato ordine ad summum caulis exeunt, ubi insidet flos, & quasi è flore nasci videntur, unde & prolifera dicitur.

SCABIOSA *Carduifolia annua Batica minor.*
Carduus Sphærocephalus annuus Baticus minor.
Moris.

C*aulis* cubitalis rarius in ramulos divaricatus, cin viridi pallens, glaber, rotundus, solidus; quem vestiunt *folia* dodrantem longa, brevibus pilis aspera, in lacinias profundas divisa, supra lucida, nigro viridia, subtus argentea. *Flores* profert tubulosos, quinquifidos, purpureoviolaceos, è quorum medio prominet stylus concolor, crassiusculus, in summo bifidus. Capitulum sphaericum, laxius, è vasculis seminalibus oblongis, multis aristis pungentibus ex herbaceo argenteis, circumvallatis, componitur, quibus singulis unicuique continetur *semen* oblongum, quadratum,
 ultra-

SCABIOSA *Cardi folia annua*.

p. 224.



•

•

•

•

p. 225.



SENECIO
Virginianus arborescens.

utraq; extremitate nonnihil villosum , ex quo quotannis renovatur planta. *Radix* subest fibrosa.

SENECIO *Virginianus arborescens Atriplicis folio. Raii Hist. Floribus albis. Par. Bat. pr.*

Caudice assurgit lignoso tibie crassitudine in plurimos patulos ramulos brachiato , cortice rectos cineritio. *Ramuli* flexiles nonnihil striati , crebris vestiuntur *foliis* inconcinno ordine adnatis , quæ ex brevi pediculo in oblongorotundam figuram sese extendunt ; à medio ad summum apicem incisuris majoribus sinuata sunt , coloris subglauco & nonnunquam quasi polline aspersa , crassiuscula , rigida ; è petiolo excurrunt tres nervuli , quorum medius major est & in alios laterales dividitur. Ex alis foliorum in summis virgis oriuntur pediculi sustinentes *flores* parvos , coacervatos , nudos , coloris albidî , qui in pappos evolvant. *Clariff. Raius* flores luteos huic attribuit , in nostro arbusculo semper albidos observavimus , è Virginia primò in Angliam delata est , unde & nos accepimus. Hyemis injuriam faciliè tolerat hybernaculo custodita , & quotannis flores profert.

SENECIO *Africanus altissimus Blattaria vel Hieracii folio. Schol. Bot. Par. Senecio Africanus maximus folio Dipsaci laciniati. Par. Bat. Pr.*

Insigni feracitate & copia è delapso semine pululans luxuriat in hortis nostris hæc *Senecionis* ex America delati species. Radice nititur plurimis fibris capillata, quæ caulem protrudit bipedalem & aliquando proceriorem, rotundum leviter striatum, digitum crassum, nonnunquam glabrum, nonnunquam brevissimis pilis hinc inde præditum. Folia ima *Blattariae* vel primis *Dipsaci laciniati* foliis similia sunt; quæ cauli & ramis hærent digitum longa, pollicem lata, *Sonchi laciniati* in modum crenata & lacinitata, in acumen tendentia. Ramorum summitates exornant capitula plurima oblonga viridia in imo crassa seu ventricosa, ut *Sonchi* capitula, quibus & magnitudine ferè accedunt, quæ in villos summo subsulphureos sese expandunt, absque ullis in ambitu petalis. Semina sequuntur parva pappescentia. Sapor foliorum primò herbaceus est, postea aliquid cuminacei relinquit, similis sapor & magis cuminaceus etiam percipitur in *Senecione Africana folio trinervio*.

SER-



SENECIO-*blattariae*
Blattaria folia

p. 227.

SERRATULA
Virginiana
foliis rigidis.



p 227.



SESELI
Maritimum
Scolium

SERRATULA *Virginiana foliis rigidis. Serratula non laciniata Sutherlandi.*

A *Serratula* J. B. sequentibus differt. 1. *Caubus* affurgit altioribus. 2. *Foliis* latioribus rigidis ad ambitum serratis, vel nullis vel paucissimis laciniis dissectis. 3. *Floribus* ex squamato oblongo capite rubris, quos cingunt *petala* rigida saturato rubore nitentia. 4. *Radice* longa crassa.

SESELI *maritimum* *Scoticum* *humile foliis Imperatoriae Flor. Bat. Imperatoriae* adfinit *umbellifera* *Scotica. Sibald. Prodr. & Sutherl. Hort. Edinb. Apium* *Scoticum* & *Apium* *marinum* quibusdam *Newtoni. Raii Hist. Ligusticum* *humilius* *Scoticum* *maritimum*, seu *Apium* *maritimum* *dulce* *Scoticum. Plukenet.*

Plantæ hujus iconem exhibet *Plukenetius Tab. 95.* Sed cum in ea flores desint, perfectiorem hic proponere placuit, nulla addita descriptione; hæc enim in *Historia Plantarum Raii lib. 9. pag. 447.* inter *Apii* & *Petroselinii* species videre est. Nos ob *feminum* cum *Seselibus* convenientiam, *Seselios*, aut *Siseries* familiæ inferendum duximus. Cæterum dubitat *Clarissimus Plukenetius*, an sit *Ligusticum* in

Ff 2

Alpi-

Alpibus Liguriæ vulgò *Imperatoria* vocatum *Cæsalp.* *Libanotis Apii folio semine aspero C. B. P.* & *Rosmarinus foliis Selino similibus serratis, Belli*, cui in epistola prima ad *Clusium Libanotis legitima Theophr.* videtur, & qui vulgo *exoniægr* & ni fallatur, *siler Creticum* à quibusdam perperam vocari asserit. Verùm supra dictas plantas invicem esse diversas, & *Seseli Scoticum* ab illis etiam differre in multis, illarum descriptionibus cum *Seseli* nostro diligenter collatis evinci posse opinor. *Cæsalpinus lib. 7. cap 46.* inquit, *folia habere figuram herbæ Sanctæ Mariæ*, hoc est, *Mentha corymbifera hortensis C. B.* sed magis in acutum desinentia magisque serrata: *Caulis cubitalem altioreque: Semina nigra.* *Seseli* verò *Scoticum* (ut nihil de foliis dicamus) cubito minor est, nedùm altior; *Semina* sunt citrini fusci coloris, non nigri. A *Libanotide* etiam *Apii folio semine aspero C. B.* seu *Rosmarino foliis selino similibus, Belli*, differre videtur, *radice alba*, cum illa è contrario *radice cortice nigro recta* firmatur. Neque thus maxime olere observatur hujusce *radix*, quod *Bello* plantam suam legitimam *Libanotidem* esse persuasit.

●

•

•

•

•

•

•

225



SESELI *pyrenaeum*
Thapsifolia

SESELI *Pyrænaicum Thapsia facie Dⁿⁱ. Fagon.*
Schol. Bot. Paris.

Ex radice recta, crassa, paucis fibris donata, caules profert cubitales & sesquicubitales, striatos, glabros, medulla fungosa farctos, in ramos subinde divisos. Folia quæ è radice exeunt longis insident pediculis carinatis, concavis. Sunt autem prima viridia, glabra, sequentibus latiora, & in breviores multò costas divisa, cætera angusta, tenuius dissecta, *Thapsia carotæ* folio accedentia, in costas septem vel octo divisa, lobulis seu pinnulis ad pediculum, ubi exeunt costæ, more *Carui* quaquaversum donata. Summitates caulium & ramulorum *umbellis* amplis coronantur, quarum bases seu radiorum exortus, uti & radios partiales angunt *foliola* seu filamenta tenuissima. Flores parvi ex albo flavescentes, quos excipiunt *semina* bina striata, oblonga, pallida, *Apii* seminibus similia ac majora, Saporis fervidi, qui linguam & os diu vellit & adurit. Plantam hanc ex montibus *Pyrænaeis* erutam debemus *Doctissim. Tournefortia*. Eandem etiam (quantum ex semine & prius inde natis foliolis judicare licet) habuimus munere *Clariss. Viri Dni Joh. Bapt. Triumphetti* Professoris Bo-

canuci Dignissimi in Sapiencia Romana nomine *Apiti montani Carui facie.*

SINAPI *Indicum maximum Lactuce folio. Schol. Bot. Paris.*

Caulis erigit bipedales & altiores, ramosos, glabros, alba medullâ fâctos, quibus adhærent *folia* alterna lata, glabra, pingua, ex luteo virentia, *Lactuce* nonnihil similia, per margines levitèr crenata; inferiora pediculis appensa, superiora angustiora & minùs crenata. Versus ramulorum extremitates ad spithami longitudinem prorumpunt *flores* tetrapetali lutei, calycibus quadrifoliis laxis & petiolis semiuuncjalibus suffulti, quos excipiunt *siliquæ* bicapsulares teretes, crassiusculæ, erectæ, semidigitum longæ; in mucronem cum apice fusco terminantes, quæ *seminibus* procuberantibus nodosæ & quasi articulatæ apparent. . Torius plantæ sapor acris, odorque fragrans rapaceus instar *sinapeos*.

Idem *Folius angustioribus. Flor. Bat. Sinapi Indicum Lactuce folio minus, seu angusto profundius crenato.*

Minus angustius & gracilius est præcedenti.
Flo-



p. 231.

Sium
Minimum umbellatum.



Flores pallidiùs flavent, folia profundius & frequentius sunt crenata, & magis glauca; filiquæ breviores & angustiores itidem apiculatæ.

S I U M *minimum umbellatum aquaticum. Aæ*
Sium aquaticum pumilum ferulaceis foliis. Mo-
ris Umbell. ?

Spithamum vix excedit. *Folia fert ferulacea tenuissima & angustissima fere capillacea, pediculis in longum & latum folliculum diductis, qui caulem amplectuntur & ramulos ex illorum nodis exeuntes aliquousque involvunt. Cauliculi in plures ramos teneros, virides, patulos brachiantur, quorum summo insident umbellæ parvæ. Flosculi perexigui propemodum muscosi quinque petalis angustis acutis compositi & multis longis exiguis staminibus donati, quibus succedit semen parvum breve, striatum. Radix turbinata in plura capitula extuberat, & cespitis nodosi instar est, tenuium fibrarum comam demittentis. A Sio minimo Rari in Hist. & Morisoni plantarum umbelliferarum distributione novâ plurimum differt.*

STAPHYLODENDRON *Africanum folio
singulari lucido* Par. Bat. prodr.

Staphylodendri seu Pistachiae sylvestris species duæ ab auctoribus traditæ sunt; Prima Germaniæ & Italiæ udis humidisque gaudet locis, Altera Virginiae est incola. Tertia nobis hic exhibitæ in Promontorio Bonæ spei fruticat ad altitudinem sex septemve pedum, caudice brachium crasso, in plures ramos diviso. Hæc numerosa vestiunt folia, non pinnata nec terna uti cæteris speciebus, sed singularia, eaque rigidiuscula, alternò ordine pediculis brevissimis adhaerentia, unciam lata, vix duas longa, subrotunda, mucronata; parte prona colore obscure viridi splendent, supina brevi lanugine ruffa, ad nervos & margines magis conspicuâ, pubescunt, uti & furculi tenuiores. Flores circa fastigia erumpunt ad foliorum exortus, pediculo unciali aut breviorè suffulti, pentapetali, parvi, albi & ubi contabescere incipiunt obsolete spadicei, petalis retroflexis, ex parvo incano calyculo emergentibus. His succedunt vesiculæ pentagonæ, in quibus capsula rotunda claudens quatuor semina strictè juncta, oblonga, dura, sulco per longitudinem instar Dactyli inscripta. In hybernaculo ab
hy-

7 232



STAPHYLODENDRON
Africana

1967



hyberno frigore subductum lætè viget apud nos
& flores quotannis profert.

STRAMONIA *Corassavica humilior Hyos-*
cyami folio^a *Par. Bat. pr.* *Datura Hyoscyami fo-*
lio vulgò.

Locis aridis & incultis Indiæ occidentalis fre-
quens est hoc *Stramonie* genus, partium om-
nium conformatione congeneribus suis respondens,
humilius tamen & ubi appropriatum solum na-
tum est, multò ramosius. *Caulis* assurgit polli-
cem crasso, cubitum alto, in multos ramos di-
rempto, obscurè purpureo colore tincto. *Folia*,
Hyoscyami seu potius *Solani vesicarii* antiquorum
sunt æmula, latiora tamen & in margine sinuata
quasiq; crispata, pallidè virentia, tactu mollia
& averſa parte incana. [quæ ex semine in Coras-
savia nato creverant, omninò erant incana] Ex ra-
morum sinibus prodeunt *flores* externa facie ob-
soletè purpurascens seu incarnati, interna albido-
colore perfusi, fundo punicante. Medium occu-
pant quinque stamina albicantia candidis farinaceis
apicibus ornata, inter quæ eminet stylus in capi-
tulum subviride rotundum protuberans. *Basi flo-*
ris cohæret *calyx* oblongus viridis, pentagonus,

in quinque cuspides desinens, qui flore defluente & grandescente fructu expanditur & sursum fertur, fructusque basi umbilici seu pilei instar insidet. Cæterum *fructus* rotundus est, & robustis aculeis pungentibus undique armatus, cui subest *calyx* foliaceus retroflexus; in quatuor partes dehiscens, aut in duo tantum loculamenta, quæ *semina* fundunt nigra superficie rugosa. *Sapore*, *odore* & viribus cæteris hujus familiæ speciebus consimilis est.

TITHYMALUS *Corassavicus myrtifolius flore coccineo mellifero.*

Ad *Tithymalorum* familiam referendam esse hanc plantam Americanam testantur, cum *conceptacula seminalia*, è tribus loculis constricta, totidem *granula* includentia, tum *lactens* & *acris succus*, qui ex singulis plagis influxis stillat. Profert autem *caules* plures ramosos, olerinæ pennæ crassitie, glabros, nigro virides, succulentos, quibus per interstitia digitalia alternatim adstant *folia* absque pediculis, myrtiformia, crassa, unciam cum semisse longa, vix unam lata, caulibus concoloria. Ex summitatibus caulium prodeunt *flores* terni, quaterni plures
aut



TITHYMALUS
corassanicus
mortifolius.

TRACHELIUM
*Alpinum Floribus
Conglomeratis*



aut pauciores coloris coccinei, petiolis brevissimis insidentes, florem papilionaceum nondum expansum, vel quodammodo caput aviculæ rostrum aperientis exprimentes; è basi enim crassiori tanquam capite, in oblongum angustum mucronem quasi rostrum terminantur; inferiora segmenta in longum porrecta invicem connivent, & rostellum aviculæ inferius exprimunt. Ex hujus medio se exerunt stamina multa hirsuta, spadicæa, cum stylo longiore coccineo, linguam exertam referente. Pars superior seu segmentum superius, galeam quodammodo referens protendit ad medium usque segmenti inferioris: *Flor* ea parte qua petiolo adhæret, nonnihil virescit, cæteris partibus elegantissimi coccineo colore nitentibus. Succedunt *fructus* parvi, trigoni, tribus *granulis* referti, more congenerum.

TRACHELIUM *Alpinum floribus conglomeratis, foliis Assarinæ rigidis & hirsutis.* Campanula *Alpina sphaerocephalos pratensis flore conglomerato, Assarinæ foliis rigidis & hirsutis.*
Schol. Bot. Par.

Radice firmatur numerosis fibris longis capillata. Folia quæ ab illa exeunt digitalibus insi-
G g 2 dent

dent pediculis hirtis, subrotunda in mucronem desinentia, ad *Viola* folia quoad formam accedentia, circa margines crenata & veluti crispa, hirsuta, aspera. Superiora subrotunda absque pediculis ad interstitia uncialia & biuncialia, situ alternato, cauli apposita. *Caulis* erigit dodrantales & altiores, rotundos, rigidos, hirsutos. In summitate & foliorum alis sedent *flores* plures simul conferti absque pediculis, erecti in cæruleo purpurei, in quinque lacinias acutas, profundas dissecti, stylo intus oblongo trifido. *Calyci* iidem quinquifido longo acuto insident, & *flores Trachelii flore conglomerato* C. B. referunt. *Vasculum seminale* ad floris fundum situm, in tria loculamenta, more congenerum, dividitur.

TRIBULUS *terrestris major Corassavicus. Par.*

Bar. prodr. Tribulus terrestris Americanus Chamaecisti flore, fructu spinoso maximo. Breyn. prodr. 2.

Tribuli hujus Americani iconem proposuisse sufficiet, omnibus enim partibus *Tribulum terrestrum* J. B. adeo refert, ut ab hoc sola partium magnitudine discrepat. Annuus quoque est,
nam

p. 276.
TRIBULUS
Terrestris Moer
Corallarius.



p. 237

VALERIANELLA

Corassica Semine

Aspera D. 1730



nam post florum feminumque defluviū quotannis interit. E confinio superioris *Tithymali* invenitur, siccaneum quippe pariter amat, locisque soli expositis lætatur.

VALERIANELLA *Corassavica semine aspero viscoso. Par. Bat. prodr. Taludama Hort. Mal. tom. 7.*

Novalibus & saccharetis Corassaviæ spontaneo proventu oritur, atque è seminum satū in hortis nostris feliciter adolescit. Reptat *radice* alba fibrosa pallida, ex quā emergunt *cauliculi* multi sesquicubitales, ramosi geniculati, in viridi rufescentes nonnihil pilosi teneri, primū erecti, postmodū ubi increverunt, in terram reclinari. His hærent *folia* mollicella subhirsuta, subtus nervosa, pallida, ad ambitum sinuosa velutque angulosa, & ad singulos aruculos conjugata, quorum alterum suo opposito magnitudine cedit. Inferiora cum *Blita albo* quāpiam similitudinis habentia nituntur pediculis longis, & terminantur in rotundum aut saltem obtusum; superiora inferioribus sensim minora, nullos aut brevissimos habent

petiolos, & in parvum mucronem abeunt. Caeumina ramorum promunt tenues pedicellos ritu congenerum, sustinentes *flosculos* exiguos purpureo-incarnatos pentapetaloidæos. Singulis succedunt *semina* nuda, crassa viscosaque hirsutæ obfita, oblonga hexagona coloris herbacei, quæ è strictiori basi in obtusum crassiusculum caput turbinantur. Q. An semina bina conjuncta post singulos flores proferat, & an non umbelliferis conjungi debeat?


VALERIANELLA *Zeylanica palustris repens, Hederae terrestris folio, ad radicem florida.*
Coeagen Hort. Mal. tom. 10.

E radice fibrosa albente multos spargit viticulos, tenues, longos, humi procumbentes, crebris geniculis interceptos; è geniculis exeunt *folia* plerumque bina ex opposito, pediculis triuncialibus & longioribus insidentia, circinatae ferè rotunditatis, argutè crenata, saporis acris, subdulcis & aromatici. Ibidem pariter erumpunt petioli plures crassiusculi, unciam dimidiam longi sustinentes *flosculos* ternos, parvos, vix conspicuos, ex quinque petalis exiguis purpurascensibus constructos, quorum unicuique subsidet
fructus

VALERIANELLA

p. 238

Zeylanica Palustris
repens Koleria
terrestris
folio.



p. 239

ALTERA

Nymphaea
minoris folio.

177



VALERIANELLA
nudo umbellata
Semine

fructus depressus bifidus, qui in duo *semina* (more umbelliferarum) facile dehiscit; ad fructuum basin adstant duo foliola angusta, quasi essent theca bivalvis seu *Calyx*. Caulium genicula terram attingentia, novas demittunt radices.

Eadem *Corassavica Nymphaeae minoris folio*.

Hæc à priori distinguitur *foliis* longioribus & paulò crassioribus, *flosculisque* herbaceis; cætera conveniunt.

Utraque species in Par. Bat. prodr. *Affarine* nomine proponitur. Floribus, seminibus & crescendo modo, cum *Cotyledone aquatica* f. B. conveniunt, quæ pariter *Valerianella palustris Cotyledonis folio*, denominanda est, ut nos primò monuit Dnus. Sherard.

VALERIANELLA altera nudo umbilicato & levi semine Columnæ.

Hæc plantà à Fabio Columna descripta est, ejus vero cyma seu ramuli pars superior tantum iconè expressa, eadem tabula cum *Valerianella semine scabiosa stellato & hirsuto*, unde nos operæ pretium duximus ejus figuram integram studioso

Bota-

Botanophilo exhibere, illumque ad descriptionem *Columnae* satis exactam relegare.

VERONICÆ SIMILIS *Fruticosa Curasavica Teucrii foliis, flore galericulato. Par. Bat. prodr. Viola surrecta latiore folio species, ex Cod. Bening. Pluk. Tab. 234. An Verbenæ fruticosa Teucrii foliis?*

Radix è numerosis constat fibris. *Caulis* ramosi angulosi, tenues, *foliis* ut plurimum ex opposito binis vestiti, brevibus pediculis suffultis, quæ ex lata basi in mucronem tendunt viridia, lucida, per margines crenata, *foliis Chamedryos* seu *Teucrii vulgaris* figura & magnitudine æqualia. *Flores* in summitatibus caulium quasi in spicam rariorem dispositi, pentapetaloidæ, quodammodo galericulati, ampli, pallidè purpurascetes, cum staminibus nigro puniceis. *Capsula* seminalis oblonga est, angulosa, lineisque albescentibus striata, in quinque inermes spinulas desinens. *Semen* nondum vidi. Prodiit ex seminibus Curacao delatis in Horto *Fageliano*. Icon. *Loquiltic Hernandez pag. 382.* huic non adeò dissimilis.

VER-



VERONICÆ
Similis fruticosa
Cavassiana.

p 240.

104

p. 241.



VERONICA
Americana exalta
Fruticosa.

VERONICA *Americana erecta frutescens & ramosa folio Verbenæ. Par. Bat. prodr.*

In solo lætiori *caulem* profert cubitalem & altiore, lignescentem, angulosum, glabrum, *foliis* ad interstitia duarum triumve unciarum binis, nonnunquam ternis, vestitum. *Folia* autem pediculis brevibus appensa, ab angusto principio in latitudinem sesquunciam expanduntur & in mucronem acutum fastigiantur, digitum ferè longa (inferiora intellige) nervis inscripta, & per margines rarioribus incisuris, à media scilicet folii parte ad mucronem usque denticulata; altera medietas pediculum versus linea ut plurimum terminatur æquali. E foliorum alis exeunt ramuli longi, foliis minoribus donati, è quorum sinu prodeunt *flores* bini vel terni petiolis brevibus, tenuissimis, & *calyci* quadrifido insidentes, tetrapetali, ad ungues juncti, parvi, albentes, cum staminibus in medio. Sequuntur *vascula* seminalia parva, bicapsularia, acuminata, in breve filamentum abeuntia, quæ *semina* claudunt minuta. *Radix* fibrosa est. Ex insula Curacoa delata est.

VERBENA *altissima Americana spica multiplici, Urticæ foliis angustis, floribus cæruleis. Par. Bat. prodr.*

Erestibili multusque fibris conflata *radice* virgas emittit quadrangulas, striatas, geniculatas, sex septemve pedes altas; quorum genicula vestiunt *folia* conjugata, facie & textura foliorum *Urticæ* aut angustiora, quæ palmæ latitudinem, spithami longitudinem interdum excedunt, nunc integra, nunc ad basin una alterave lacinia divisa. Ex horum sinu utrinque profurgunt ramuli, quorum summitates in multiplices florum spicas, seu jubas floridas, quadrangulas, strictè invicem junctas digitum longas, jucundissimo adpectu terminantur. Cæterum *flosculi* sunt purpureo-cærulei, pusilli, in imo tubulosi, in summo in quinque segmenta aequalia secti, quos excipiunt *semina* quaterna oblonga, fusca, in quinquefidis calyculis.

VICIA *Lathyroides purpureo cæruleis floribus. Sutherland.*

E*radice* pluribus fibris capillata, perenni, *viticulos* spargit copiosos infirmos, humi stratos,
an-

VERBENA
altissima Americana

7-242



106

p. 242

VICIA
Lathyrus.





VIRGA

Aurea. Naxos

Anglicata rigida
folio.

angulosos, glabros, in solo lateri dodrantes, crebris geniculis interstinctos. *Folia* quæ primò erumpunt & in caule inferiora, glabra, ex unica tantum pinnarum conjugatione; superiora, ex tribus quatuorve pinnulis ad mediam costam annexis, composita sunt, & in capreolum terminatur. E regione foliorum prodeunt *flores* solitarii, pediculo brevissimo insidentes, parvi, oblongi, dilutè purpurei, quibus succedunt *siliquæ* uncia longiores, erectæ, nigrae, glabrae, septem octo vel decem *semina*, parva, seminum sinapeos magnitudinè, angulosa, fusca; è Scoriamusit *Dnns Sutherlandius*.

VIRGA AUREA *Nova Angliæ lato rigido folio. Flor. Bat. Virga aurea ex Nova York foliis Symphyti majoris hirsutis. Schol. Bot. Paris.*

Quamplurimæ *Virgæ Auræ* species, è Virginia & Nova Anglia transportatæ Belgarum hortos hoc tempore mirè exornant, quarum caulium cacumina, ea florum serie ac copia luxuriant, ut harum ramuli corollæ potius è plurimis contextæ flosculis quàm genuini flores videantur. Hanc quam impræsentiarum describere animus est, *radice* constat multis fibris albicantibus, & in terra

latè se diffundentibus , ex qua prodeunt *folia* plurima , pedalia , palmum lata , in mucronem desinentia , subviridia , tactu aspera , rigida , pluribus nervis inscripta , subinde in margine denticellis incisa , pediculis dodrantalibus insidentia. *Caules* gerit multiplices , firmos , rotundos , striatos , crassos , quos ambiunt *folia* cæteris minora magisque acurfiuata , basi caulem quasi amplectentia ; ex horum alis versus summitates exeunt ramuli frequentes in alios rursus subdivisi , sustentantes *flores* instar herbæ *Doriæ* radiatos , luteos , paniculatos , in pappos evanescentes.

VIRGA AUREA *Canadensis Asterisci folio.*
Virga Aurea Canadensis Scrophulariæ folio. Acad.
Reg. Paris.

Florum , foliorum , cæterarumque partum structura , adeo accedit ad *Asteriscum autumnalem Cornuti* hæc planta , ut nisi solo florum colore aureo ab illo distaret , *Asteriscus* potius quam *Virga Aurea* nominata fuisset. Quamquam inter *Virgas aureas* , *Asteres* & *Asteriscos* , nulla potior intercedat differentia , quam florum color & amplitudo. Assurgit autem ex fibrosa *radice* surculis multis bicubitalibus valdè ramosis , ad quo-

p. 244.

VIRGA Mirta
Canadensis
Asterifolia.



.

.

.

1

p. 248.

VIRGA Auræ
Omniū minima
Floribus maximis.



quorum nodos hærent *folia* alternatim disposita *Asterisco* paria, coloris *Scrophulariæ* instar in fusco viridantis. *Flores* ad foliorum sinus fasciculatim ramulos ornant, lutei, discoidei, radiati; quos *semina* sequuntur floccosa. Culturæ hyemique patientissima est, singulis annis sub veris tempore ex restibili radice repullulans, & tam seminibus quàm propaginibus sese multiplicans. *Odor* herbaceus est, *sapor* ingratus, amaricans, veluti *Scrophulariæ*.

VIRGA AUREA *omnium minima floribus maximis.* Virga Aurca *omnium minima Hort. Reg. Paris.*

Hujus *folia*, ex longis carinatis pediculis ad radicem in orbem congesta, angustiora & breviora sunt quam in vulgari, glabra, minimè rugosa seu corrugata, ad margines serrata, multisque cancellatis venulis, altera præsertim parte conspicuis, insignita. *Cauliculi* inter folia rectè assurgunt & circa summitates in tres quatuorve ramulos divisi, cæteris speciebus multo breviores sunt & palmæ longitudinem vix attingunt. Unusquisque ramulus *florè* luteo magno, ex calyce oblongo viridi squammato prodeunte, coronatur.

H h 3

Plan-

Plantula enim hæc cæteras species congeneres omnes florum amplitudine superat ; adeo ut quod cauliculorum proceritati decessisse , id florum magnitudini accessisse videatur. Ad hortorum areolas exornandas , ob sui humilitatem valdoperè expetitur.

XANTHIUM *Lusitanicum spinosum. Par. Bat. prodr. in Append.*

Hanc plantam *Clar. Dno Turnefortio* debemus , qui primò hoc nomine in Belgium misit. Oritur vero è *radice* simplici pluribus fibris capillata , quæ *caulem* trudit bicubitalem firmum , ramosum , glabrum , viridem. *Folia* glabra , lucida , inferiora ad ramorum exortus , pediculis biuncialibus donantur , supernè viridia , parte prona glauca seu potius incana , nervo per medium excurrente coloris flavescentis ; ex angustò principio in amplitudinem duorum digitorum extenduntur , una alterave ex utroque latere lacina majore ex opposito uncisa , summitate in longum angustum mucronem producta , quæ hastæ cuspidem in nonnullis præ se ferunt scisquidigitum longa. Quæ circa

XANTHIUM

Lusitanicum
Spinosum

p. 2463



ca ramulorum cacumina proveniunt, angustiora sunt & breviora multò, nec adeò crebris laciniis inæqualia, sed maximam partem tantum cuspidata. Ad horum exortus parte terram versus spinis acutissimis armatur *caulis*, ex albo flavescentibus; trifurcatus seu ternis ex eodem centro ortis, subinde brevi petiolo suffultis, tergeminis plerumque ad eundem exortum. Ad foliorum sedes circa summa, ut & in ipsis ramulorum cimis oriuntur parvi muscosi globuli, in flavo viridantibus villis quasi flosculis obducti, qui augeſcentes in oblonga capitula *Xanthii minoris ænula* abeunt; hæc verò rigida & pungentia non sunt, sed spinulis seu villis hamatis tenuioribus & mollioribus obducta. Unaquæque *lappa* in duos loculos totidem grana continentes distinguitur more congenerum.

F I N I S.

CATALOGUS PLANTARUM

Nondum æri Insculptarum:

QUAS

Sequentibus Tomis compo-
nendis depingendas
curaverat

CLARISSIMUS

HERMANNUS.



- A**BUTILON Indicum foliis rugosis.
ALTHÆA Indica purpurea magno flore.
ALTHÆA Africana procumbens humilis rigido folio, flore luteo vix conspicuo.
ALTHÆA Africana frutescens bullata seu vesicaria flore albo.
ALTHÆA vesicaria spinosa Benghalensis, Acetosa sapore.
ALOE *Pitba* dicta.
ANANAS sylvestris non spinosa.
ANANAS *Kerbata* dicta.
ANEMOSPERMOS Africana foliis & floribus Taraxaci incanis.
ANGELICA ad singulos nodos florida.
ANGELICA Canadensis tenuifolia caulibus purpureascentibus. H. R. P.
ANONIS viscosa lutea non spinosa minor Lusitanica.
ANONIS spicata sive *Alopecuroides* Lusitanica non spinosa. Car. Aldorf. Hoffm.

APOCYNUM scandens Zeylanicum radice Asclepiadis. *Manughawel.*

APOCYNUM scandens Vincæ-pervincæ folio subrotundo, fructu villoso.

APOCYNUM Africanum erectum flore obsoletè purpureo.

APOCYNUM Novæ Angliæ subhirsutum, radice tuberosa, flore aurantio.

ARBUSCULA quadam Americana.

ASTER Novæ Angliæ altissimus hirsutior.

ASTER Americanus flore albo, folio Lactuæ purpureæ.

ASTER Americanus albus latifolius, caule ad summum brachiato. Plukenet. Tab. 79.

ASTER Tripoli flore angustissimo folio. *Hor. Bat. Fl.*

ASTER Canadensis procerior Bellidis flore minore. *Sch. Bot. Paris.*

ASTER cæruleus serotinus Americanus, angustissimo folio, caulibus puniceis. an *Aster* tenuifolius Canadensis ramosus, flore minore violacco. *Sch. Bot. Paris.*

ASTER flore Bellidis subcæruleo, folio Conyzzæ cæruleæ acris.

ASTRAGALUS Alpinus Conophorus flore pallido.

ASTRA-

ASTRAGALUS Glycyrrhizæ Germanicæ Sylvestri similis.

BELLIS Africana umbellata frutescens, odore Camphoræ.

BRYONIA Africana flore luteo fructui insidente.

CAMPHORATA Africana umbellata frutescens.

CHAMÆMELUM Africanum aphyllon erectius & pulchrius.

CHAMÆMELUM Africanum inodorum Psylli folio.

CANNABIS minor *Bangue* Indorum.

CARDUUS pineus Lobel. Lusitan. Cardoso. Viridar. Lusit. Grisl. Flos albus est.

CAUCALIS pumila maritima CB.

CEDRUS Africana conifera.

CENTAURIUM majus folio nucis juglandis, flore obsoletè incarnato.

CENTAUROIDES Africanum purpureo croceo flore, crasso folio.

CEREUS erectus altissimus Sicanianensis.

CEREUS scandens minor trigonus articulatus.

CHAMECISTO affinis Africana foliis dissectis.

CHONDRILLA viscosa Lusitanica viminea.

CHRYSTOPHORIANA five Aconitum bacciferum racemosum baccis niveis & rubris. Moris. Hist.

CHRYSANTHEMUM Americanum perenne, flore maximo.

CHRYSANTHEMI flore, planta Americana frutescens, foliis viridibus crassis.

CHRYSANTHEMI flore, planta Africana baccifera ramis in aculeum abeuntibus.

CHRYSANTHEMUM Africanum Erucæ folio?

CISTOIDES Africanum frutescens Ulmi folio, flore luteo.

COLUTEA vesicaria Africana, vesiculis depressis, floribus purpureis spicatis parvis.

COLUTEA Hysiquanensis floribus & seminibus rubris.

CONVOLVULUS Scammonii folio subrotundo, flore albo umbone nigro Curassavicus.

CONVOLVULUS Zeylanicus folio Hepaticæ nobilis.

COR Indum Americanum trilobatum folio crasso lucido.

CYNOGLOSSUM minus Noveboracense, flore albo.

CY.

CYNOGLOSSUM Americanum maritimum
flore albo.

CYTISUS Africanus hirsutus, floribus atropur-
pureis.

CYTISUS Africanus siliquis teretibus, flori-
bus spicatis carneis. *Cytisus* Africanus Rivini.

ELICHRYSUM Africanum Abrotani feminæ
flore & foliis.

ELICHRYSUM Africanum odoratum luteum
Gnaphali folio.

ERUCA siliqua quadrangula flore albo.

ERYNGIUM pumilum Mutoni. Lugd.

EUPATORIUM Virginianum folio angusto, flo-
ribus albis.

EUPATORIUM Africanum arborescens semper-
virens flore Senecionis albo.

FUMARIA Africana, *Vesicaria* scandens.

FICOIDES Africanum folio triangulari bre-
vi crasso glauco.

FICOIDES Africanum crasso triangulari folio
incano.

FICOIDES Africanum folio longissimo non-
nunquam denticulato, flore luteo.

E I-

FICOIDES Africanum repens flore albo par-
vo.

FICOIDES Africanum ceterifolium spino-
sum.

FICUS Indica seu *Opuntia* ex insulis Carib-
baris.

FICUS Indica Scolopendriæ folio, *Epiphyll-
litis*.

HORMINUM Africanum frutescens Sal-
vioides.

HYPERICUM petalis crenatis.

HYACINTHO affinis Africana, radice tu-
berosa.

JACOBÆA Africana Senecionis folio, flore
purpureo.

LACTUCA Canadensis altissima, Sonchi
folio.

LAMIUM flore purpureo, coma purpurea.

LAMIUM flore purpureo, coma alba.

LASERPITIUM folus angustis saturatè virenti-
bus. Moris.

LEONUROS Hyfiquanensis frutescens Nepetæ
folio.

LEU-

LEUCOIUM Africanum hirsutum, Coronopi folio, flore caeruleo, siliqua plana longissima.

LEUCOIUM latifolium foliis ferratis, flore luteo. Fortè ad Hesperides referendum.

LILIUM Javanicum maximum umbellatum, album, foliis erectis & crassioribus.

LINARIA Africana Telephii folio, flore purpureo & luteo.

LINARIA folio Genistæ glauco, flore luteo.

LYCHNIS minima supina, folio viridi angustissimo, flore coloris herbacei. Schol. Bot. Paris.

LYCHNIS viscosa Africana angustifolia, flore amplo albido, interdum se contrahente, & in viridem obsoletum colorem se transmutante.

MARRUBIUM Africanum rotundifolium flore purpureo.

MALUS Granata Zeylanica spinosa flore luteo.

MANGABIBA.

MASSANILIA major.

K k

ME-

MELIANTHOS Hyfiquanensis minor fætidus.

MERCURIALIS Africana dicoccos , folio Violæ tricoloris.

MIMOSA maximè sentiens latifolia spinosa.

MIMOSA filiquis latis hirsutis , articulatis.

MOMORDICA Zeylanica major.

NARCISsus hexagonus Zeylanicus flore odorato albo.

NARDUS Americana procerior foliis cæsius Plukenet. Tab. 101.

NEPETA radice tuberosa Lusitanica , spicata flore purpuro-cæruleo.

ONOBRYCHIS filiqua articulata glabra, flore albo. *Onobrychis* filiqua clypeata lavi. B. prodr.

OROBUS Hyfiquanensis filiqua depressa alba , flore obsoletè purpureo. *Falcata* Rivini.

OXYs Africana folio & flore parvo , radice Asphodeli.

PEN-

PENTAPHYLLOIDES Ulmariae folio.

PEPO Zeylanicus reticulatus & sulcatus, semine nigro.

PHASEOLUS Barbadosis erectior filiqua angustissima, tinctorius.

PHASEOLUS Africanus minor flore luteo, semine nigro.

PHASEOLUS Africanus minor sempervirens, flore rubello.

POLYPODIUM Cambro-Britannicum.

PORTULACA spinosa lanuginosa arborefcens Americana.

PORTULACA Africana procumbens polyanthos flore luteo.

RHUS Africanum trifolium.

RICINUS Cotini folio Americana.

RIZOPHORA caule alato rubente folio singulari.

ROSA Moscheutos Cornuti.

SCABIOSA Eriocéphala foliorum segmen-
tis angustioribus Lusitanica.

SCROPHULARIA Lusitanica magno
flore , foliis dissectis. An Sambuci folio
Park ?

SCUTELLARIA Americana latifolia

SENNA spuria mimosæ folio , flore maximo ,
siliqua singulari.

SERRATULA Noveboracensis maxima , fol.
longis Serratīs.

SIDERITIS Virginiana flore albo angustifo-
lia.

SINAPISTRUM Indicum folio glabro , si-
liqua hirsuta.

SOLANUM Africanum incanum arbore-
scens pomiferum spinosum , folio integro.

SOLANUM tinctorium Zeylanicum minus.
Besella Malabarorum.

SOLANUM Barbadiense racemosum minus
tinctorium , Circeæ foliis mollibus incanis.
Pluk.

SONCHUS maritimus angustifolius. C. B.
prodr.

STA-

STACHYS fibrosa radice; folio Betonicæ
incano.

TITHYMALUS Africanus minor folio
Hyperici.

TITHYMALUS arborefcens spinofus Am-
bounenfis. *Ligularia* Rumphii.

TITHYMALUS arborefcens spinofus Zey-
lanticus foliis laurinis. *Elacalli*.

TITHYMALUS Curaffavicus foliis Attripli-
cis variis.

VALERIANELLÆ cognata, folio Cory-
ledonis. *Colytedon* aquaticus J. B.

VERBENA Scutellariz foliis difpermos Ame-
ricana. Pluken. Tab. 70.

VERONICA Virginiana altiffima spi-
ca multiplici alba.

VERONICA fpicata flore purpureo.
Moris.

VIBURNUM Americanum odoratum,
folio Urticæ, floribus miniatis. H. L. B.

VIRGA aurea floribus albis Americana, folio
Bellidis ramosæ Americanæ.

XERANTHEMUM Africanum latifolium lanuginosum. Rectius forsan *Gnaphalium* &c.

Sciat Lector Benevolus ; Nomina hæc tabulis delineatis memoria tantum gratiâ fuisse adscripta, quæ Auctor celeberrimus pro arbitrio suo mutâisset & emendâisset, nec non descriptarum synonyma adjecisset. Cæterum illorum Catalogum hac de causa subnectendum duxi, ut hujus operis institutum, & quales fecerit progressus, Botanophilis innotesceret ; magna scilicet spe allectus, Celeber-

*berrimam Academiam Lugduno-Bata-
vam aliosve Mæcenates, ad tam egre-
gium opus prosequendum & ad finem
perducendum sumptus necessarios suppe-
ditaturos.*

F I N I S.

